
الأورام الخبيثة في الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق
عند الأطفال

*

الملخص

%

% ()

.%

()

.% ,

.% ,

*

Cancers ORL et Cervico-Faciaux de l'enfant

Mohamed Aboukassem*

Résumé

Les cancers ORL et Cervico-Faciaux de l'enfant siegent principalement dans le tissu cellulo – ganglionnaire du cou, le nasopharynx, les cavités naso – sinusiennes et la cavité buccopharyngée.

Histologiquement. Les lymphomes representent près de la moitié 41.48%. Les lymphomes non – hodgkiniens atteignent surtout l'anneau de waldeyer, et les lymphomes hodgkiniens atteignent le tissu ganglionnaire.

Les sarcomes constituent environ le quart 26.65%, ils sont surtout des rhabdomyosarcomes 17.77%.

Les carcinomes epidermoides sont rares sauf au niveau du cavum, ce sont des cancers indifferenciés qui constituent 14.81%.

Les neuroblastomes constituent 10.37% des cancers ORL de l'enfant.

*Département d'O.R.L.– Faculté de Médecine - Université de Damas.

. - - -



.

.

:

■

■

.

:

■



.



.polypes

.



CT scan

.

MRI

						-
						-
						-

▪
:(Angiofibrome Nasopharyngé)

▪
:(Osteodysplasie Fibreuse)

()

()

▪
(Histiocytose ×

▪
:x)

Fibrosarcome

Osteosarcome

.Liposarcome

Rhabdomyosarcome

■

%

)

.(

- - -

	-
	-
	-

TNM

) MRI

Embryonaire
(Alviolaire

CSF

II I
IV III

/
/

%

■

Lymphosarcomes

%

I

()

Curietherapie ()

I

.II

% ,

% ,

Lymphome Hodgken

CVA

C: Cyclophosphamide V: Vincristine

A: Adriablastine

	-
	-
	-
	-



	-		-
			-
			-

.CSF

Ann

:Arbor

	I
	II
	III
..	IV

A

:

B

% ,		I
% ,		II
%		III
% ,		IV

B) B :
 (II I ■
 III ■
 IV ■
 ■ Mustine MOPP
 T Oncovine Procarbazine Prednisolone

.T B ■ ABVD
 Bleomycine Vincristine Dacarbazine
 Adriamycine

Non- Hodgkin Lymphome

/

:

/ =				-
				-
				-

.% , = /

% ,		I
%		II
% ,		III
%		IV

Carcinome

Indifferencie du Cavum

.Lymphoepitheliome

Cyclophosphamide :CHOP
 Oncovine Adriamycin Pridnisolone

% ,

	-
	-
	-

/ =		

:

		()
		()

(%)

:

	-
	-

Neuroblastome

%

:PF
P: cisplatine F: Floururasil

Esthesioneuroblastome

)

(

VMA

%

.COD

C: Cyclophosphamide O: Oncovine D:
Ducarbarine

%

▪

▪

)

(

- - -



▪

()

▪ Muco- ▪

Epidermoid

▪

المصادر

- 3- Brugere J. Cancers des voies Aero-Digestives superieures, Paris 1996.
- 4- Cachin Y Schwaab G. les tumeurs malignes cervico-faciales de l'enfant.
- 5- Repartition histologique et topographique. etude a l'institut Gustave-Roussy, Paris, 1978.
- 6- Paparella M, Shumrick D. Otolaryngology volume III Head and Neck, Philadelphia, 1991.

. / / :

. / / :

. - - -
