




اسم المقرر: علم المداواة السريرية السنة: الخامسة الفصل الثاني 2024-2023
اسم الطالب: الرقم الامتحاني:
عدد الأسئلة: 100 عدد الصفحات: 5 مدة الامتحان: 90 دقيقة


اختر الإجابة الخاطئة (الأسئلة 1-58):
(تأكد من رقم كل سؤال)

8- تؤثر خافضات سكر الدم التالية عن طريق: A- تنبيه إفراز الأنسولين: repaglinide B- انقاص المقاومة للأنسولين: pioglitazone C- تثبيط الإنتاج الكبدي للغلوكوز: glipizide D- تنبيه مستقبلات GLP1: pramlintide E- تثبيط أنزيم DPP-4: saxagliptin	1- تشمل الأهداف العلاجية في الداء السكري: A-FPG: 130-90 ملغ % B-HbA1c: أقل من 6 % C-Peak PPG: أقل من 180 ملغ % D-TG: أقل من 150 ملغ % E- الضغط الشرياني: أقل من 80/130 ملم زئبقي
9- قد يترافق استعمال خافضات سكر الدم التالية مع زيادة في الوزن: A- afrezza B- repaglinide C- acarbose D- gliclazide E- glyburide	2- تتميز الأدوية التالية بقدرتها على تنبيه إفراز الأنسولين: A- sitagliptin B- glipizide C- exenatide D- carbutamide E- miglitol
10- يمكن استعمال الأدوية التالية للوقاية من نوبات الربو القصبي: A- triamcinolone B- nedocromil C- oxytropium D- formoterol E- ephedrine	3- قد يحدث ارتفاع في سكر دم لدى استعمال الأدوية التالية: A- chlorthalidone B- triamcinolone C- prednisone D- salbutamol E- pindolol
11- من الأدوية المستعملة في قصور القلب الحاد: A- dobutamine B- enoximone C- ivapradine D- furosemide E- digoxine	4- قد يحدث تسرع قلب انعكاسي لدى استعمال: A- fenoldopam B- hydralazine C- carvedilol D- nifedipine E- prazosin
12- تحصر الأدوية التالية المستقبلات الأدرنجية β_1 و β_2 : A- nadolol B- propranolol C- pindolol D- timolol E- nevirbolol	5- تزداد حوادث التسمم بالديجوكسين عند مشاركته مع: A- triamcinolone B- spironolactone C- verapamil D- piretanide E- quinidine
13- يمكن استعمال الأدوية التالية كخط أول في علاج ارتفاع الضغط الشرياني: A- amlodipine B- hydrochlorothiazide C- ramipril D- atenolol E- prozosin	6- يمكن استعمال الأدوية التالية للوقاية من نوبات خناق الصدر: A- metoprolol B- ivapradine C- ranolazine D- minoxidil E- nicardipine
14- قد تحدث زيادة في بوتاسيوم الدم لدى استعمال: A- spironolactone B- ranolazine C- losartan D- enalapril E- amiloride	7- من الاستعمالات السريرية للمدرات البولية: A- قصور القلب الحاد B- عسرات الطمث C- السكري الخفي D- التناذر النفروزي E- تشمع الكبد

15- يمكن استعمال الأدوية التالية لتثبيط الافراز الحمضي المعدي: A- pantoprazole B- ornidazole C- rioprostil D- nizatidine E- dicylomine	26- يمكن استعمال الأدوية التالية في معالجة الاقياء المحرض بالمعالجة الكيميائية: A- metopimazine B- dexamethasone C- dolasetron D- domperidone E- cyclizine
16- من مضادات التخثر الفموية نذكر: A- argatroban B- phenindione C- apixaban D- dabigatran E- warfarin	27- يمكن تثبيط تجمع الصفائح الدموية باستعمال: A- tirofiban B- ivapradine C- aspirin D- dipyridamole E- cangrelor
17- يمكن استعمال الأدوية التالية بطريق الاستنشاق: A- indacaterol B- fenoterol C- nedocromil D- zileuton E- triamcinolone	28- يمكن استعمال الـ acenocoumarole في علاج: A- التهاب الوريد الخثري B- البدائل الدسامية C- الصمة الرئوية D- الرجفان الأذيني E- الخثرة الشريانية
18- يتميز الـ comolyn بأنه: A- مضاد التهاب خفيف B- بطيء التأثير C- يحصر مستقبلات Cys LT1 D- يمكن استعماله في حالات الربو الخفيف E- يستعمل عن طريق الفم	29- تشمل التدابير العلاجية المتبعة في قصور القلب المزمن: A- المدرات الحافظة للبيوتاسيوم B- حاصرات الكلس C- مثبطات الـ ACE D- موسعات الأوعية E- حاصرات β
19- تزداد فعالية مضادات الفيتامين K لدى مشاركتها مع: A- griseofulvine B- posaconazole C- aspirin D- gemfibrozil E- tetracyclin	30- لا يمكن استعمال الأدوية التالية كخط أول في علاج ارتفاع الضغط الشرياني: A- indapamide B- nitroglycerin C- clonidine D- carvedilol E- prazosin
20- تتميز العوامل الطبيعية التالية بتأثيرات مضادة لتجمع الصفائح الدموية أو مضادة للتخثر: A- antithrombine III B- prostacycline C- protein G D- protein C E- protein S	31- من الستيروئيدات القشرية السكرية نذكر: A- androstendione B- prednisone C- triamcinolone D- budesonide E- fluticasone
21- يمكن استعمال الأدوية التالية للوقاية من دوار الحركة: A- granisetron B- dimenhydrinate C- scopolamine D- citirizine E- cyclizine	32- يمكن استعمال الأدوية التالية في تدبير الجزر المعدي المريئي: A- bismuth B- nizatidine C- famotidine D- omeprazole E- lansoprazole
22- تعتمد آلية تأثير مضادات التخثر التالية على تثبيط فعالية الترومبين: A- standard heparin B- desirudine C- fluindione D- argatroban E- ardeparin	33- يمكن تدبير نقص الصفائح المناعي المحدث بالهيبارين باستعمال: A- warfarin B- cilostazole C- desirudine D- danaparoid E- argatroban
23- تشمل الاستعمالات السريرية للـ omeprazole: A- القرحة العفجية B- التهاب المري التسحجي C- تناذر Zollinger-Ellisson D- دوالي المري E- الجزر المعدي المريئي	34- يمكن معاكسة تأثيرات الستيروئيدات القشرية باستعمال: A- ketoconazole B- aminoglutethimide C- dinoprostone D- mifepristone E- trilostane
24- تشمل الاستعمالات السريرية للـ insulin عند مرضى الداء السكري من النمط الثاني ما يلي: A- الحمل B- احتشاء القلب C- خناق الصدر D- التداخلات الجراحية E- الانتانات الشديدة	35- من التأثيرات غير المرغوبة للـ hydrochlorothiazide: A- زيادة سكر الدم B- نقص بوتاسيوم الدم C- نقص HDLc D- زيادة حمض البول E- زيادة الشحوم الثلاثية
25- من الأدوية المستعملة في علاج حالات البدانة: A- liraglutide B- setmelanotide C- metformine D- exenatide E- pramlintide	36- من الأدوية المعاكسة لتأثيرات الأنجيوتنسين: A- ivapradine B- candesartan C- ramipril D- quinapril E- aliskerine




37- يمكن استعمال المضادات الحيوية التالية بأمان أثناء الحمل: A- ceftriaxone B- cotrimoxazole C- azlocillin D- spiramycin E- imipenem	48- تثبط المضادات الحيوية التالية اصطناع البروتينات الجرثومية: A- netilmicin B- clindamycin C- linezolid D- rifabutin E- dalbapristine
38- تثبط المضادات الحيوية التالية اصطناع الجدار الجرثومي: A- cefadroxil B- moxifloxacin C- tazobactam D- fosfomycin E- imipenem	49- تتميز المضادات الحيوية التالية بتأثير مثبط لنمو الجراثيم: A- nafcillin B- spiramycin C- doxycyclin D- lincomycin E- chloramphenicol
39- تتميز المضادات الحيوية التالية باطراح كبدي مسيطر: A- rifampin B- spiramycin C- azlocillin D- clarithromycin E- ceftriaxone	50- يمكن استعمال الأدوية التالية لتدبير ارتفاع الضغط الشرياني عند المرأة الحامل: A- hydralazine B- methyldopa C- nifedipine D- fosinopril E- labetalol
40- من الأدوية المستعملة في معالجة الامساك: A- lactulose B- glycerine C- bisacodyl D- magnesium sulfate E- attapulgit	51- من الأدوية المستعملة في معالجة الاسهال: A- diphenoxylate B- indomethacine C- sorbitol D- caoline E- aspirin
41- يمكن استعمال الأدوية التالية لرفع مستويات HDLc: A- colecevelam B- atorvastatin C- niacin D- gemfibrozil E- pitavastatin	52- يمكن خفض مستويات LDLc في الدم بشكل ملحوظ باستعمال: A- infliximab B- aliocumab C- niacin D- bezafibrate E- simvastatin
42- يتميز الـ fluconazole بأنه: A- يثبط أنزيم lanosterol dimethylase B- الدواء المفضل لعلاج الفطار الكرواني C- يطرح بشكل رئيس في الصفراء D- انتشاره جيد في السائل الدماغي الشوكي E- تتناقض فعاليته عند مشاركته مع الـ rifampicin	53- يتميز الـ evolocumab بأنه: A- يثبط أنزيم PCSK9 B- ينقص سكر الدم C- ينقص مستويات LDLc بشكل كبير D- ينقص مستويات الـ TG في الدم E- يسبب زيادة في عدد مستقبلات الـ LDLc
43- تستعمل مضادات الفطور التالية موضعيا فقط: A- butoconazole B- clotrimazole C- nystatin D- econazole E- terbinafine	54- تستعمل الأدوية التالية في علاج الفطارات الجهازية: A- micafungine B- amphoterecin C- flucytosin E- fluconazole
44- قد يحدث نقص في بوتاسيوم الدم لدى استعمال الأدوية التالية: A- chlorthalidone B- ethacrynic acid C- albuterol D- amiloride E- terbutaline	55- تؤثر المدرات البولية في الجزء الصاعد من عروة هانله: A- furosemide B- ethacrynic acid C- indapamide D- bumetanide E- piretanide
45- من مثبطات البروتياز المستعملة في علاج الايدز: A- ritonavir B- abacavir C- indinavir D- saquinavir E- nelfinavir	56- تثبط الأدوية التالية أنزيم DNA polymerase: A- acyclovir B- foscarnet C- vidarabine D- lamivudine E- remdesivir
46- تثبط الأدوية التالية أنزيم التناسخ المعكوس بشكل مباشر: A- delavirdine B- zalcitabine C- abacavir D- lamivudine E- tenofovir	57- من المضادات الفيروسية المستعملة في علاج التهاب الكبد C: A- sofosbuvir B- elbasvir C- ribavirin D- voxilaprevir E- vidarabine
47- من الأدوية المستعملة في المعالجة الاسعافية لنوبة الربو القصبي: A- epinephrine B- oxytropium C- terbutaline D- formoterol E- theophylline	58- يمكن استعمال الأدوية التالية في علاج الأخماج بالـ CMV: A- raltegravir B- acyclovir C- cidofovir D- foscarnet E- gancyclovir



اختر الاجابة الصحيحة (الأسئلة 59-80):

59- الخيار الأول لتثبيط الافراز الحمضي المعدي: pirozepine - B lansoprazole -A rioprostil -E cimetidine -D roxatidine -C	70- الخيار المفضل لتدبير حالات نقص HDLc : rosuvastatin -C niacin -B simvastatin -A evolocumab -E gemfibrozil -D
60- الخيار المفضل لتدبير نوبة الربو الاسعافية: albuterol -B isoproterenol -A cromolyn -E adrenaline -D salmeterol -C	71- الخيار الأول في المعالجة الوقائية للربو القصبي: zafirlukast -B budesonide -A nedocromil -E tiotropium -D bambuterol -C
61- الخيار المفضل لتدبير المرحلة NYHA II من قصور القلب المترافقة مع تسرع قلب: enalapril + furosemide -A enalapril + atenolol -B enalapril + digoxin -C valsartan + sacobitril -D enalapril + chlorthalidone -E	72- الخيار المفضل لتدبير انتانات الأسنان: sulbactam + ampicillin -A metronidazole + spiramycine -B metronidazole + amoxicillin -C tinidazole + doxycycline -D amoxicillin + clavulanic acid -E
62- الدواء المفضل لتدبير فطارات الأظافر: fluconazole -B griseofulvine -A nystatin -E terbinafine -D miconazole -C	73- الخيار المفضل لتدبير نوبات الزرق الحادة: acetazolamide -B neostigmine -A pilocarpine -E tropicamide -D atropine -C
63- الدواء المفضل لتدبير داء الرشاشيات: micafungine -C flucytosin -B itraconazole -A amphotericin B -E posaconazole -D	74- المدر البولوي المفضل في حالات تشمع الكبد: spironolactone -B chlorthalidone -A furosemide -E indapamide -D amiloride -C
64- المضاد الفيروسي المفضل للوقاية من حالات الانفلونزا A : pencyclovir -B raltegravir -A favipiravir -E nelfinavir -D zanamivir -C	75- يمنع استعمال الـ metoprolol في الحالات التالية: A- قصور القلب المزمن B- احتشاء العضلة القلبية C- الداء السكري D- بطء القلب E- الربو القصبي
65- الدواء المفضل لتدبير ارتفاع مستويات TG في الدم: cholestyramine -B simvastatin -A alirocumab -E gemfibrozil -D niacin -C	76- الخيار المفضل لتسريع نضج الرئتين عند الخدج: fludrocortisone -B hydrocortisone -A dexamethasone -D beclomethasone -C triamcinolone -E
66- الدواء الأكثر فعالية لخفض مستويات LDLc في الدم: alirocumab -B atorvastatin -A ezetimibe -E colestipol -D gemfibrozil -C	77- الخيار المفضل لتدبير قصور قشر الكظر الأولي: hydrocortisone -B dexamethasone -A methylprednisolone -D prednisolone -C triamcinolone -E
67- الدواء المفضل لتدبير ارتفاع الضغط الشرياني عند مريض مصاب بالداء السكري: amlodipine -B lisinopril -A atenolol -E verapamil -D doxazosin -C	78- الدواء المفضل لتدبير ارتفاع الضغط الشرياني عند الحامل: labetolol -B furosemide -A fenoldopam -E fosinopril -D desartan -C
68- الدواء المفضل لتدبير ارتفاع الضغط الشرياني عند مريض مصاب بالداء الرئوي الانسدادي المزمن: hydrochlorothiazide -B amlodipine -A esmolol -E valsartan -D terazosin -C	79- يتم تدبير المرحلة NYHA I من قصور القلب المزمن باستعمال: furosemide -B carvedilol -A metoprolol -E ivabradine -D valsartan -C
69- المضاد الحيوي المفضل لتدبير الأخماج VRE: telavancin -C cefotaxime -B linezolid -A levofloxacin -E doripenem -D	80- الخيار الأول لتدبير الأخماج VZV: cidofovir -C ganciclovir -B acyclovir -A foscarnet -E lamivudine -D



اختر الإجابة المناسبة لكل سؤال (الأسئلة 81-100): (تستعمل كل إجابة مرة واحدة فقط)

- تعتمد آلية تأثير الأدوية المذكورة أدناه على: 91. حصر مستقبلات الـ Ag II 92. حصر مستقبلات الـ Cys Lts 93. تنبيه مستقبلات D1 94. تنبيه مستقبلات $\beta 1$ fenoldopam -C losartan -B zileuton -A dobutamine -E montelukast -D	- تعتمد آلية تأثير الأدوية المذكورة أدناه على: 81. تثبيط اصطناع عوامل التخثر 82. تثبيط الترومبين بشكل مباشر 83. منع ارتباط الـ ADP بمستقبلاته 84. حصر المستقبلات الغليكوبروتينية IIb/IIIa enoxaparin -C tirofiban -B warfarin -A cangrelor -E argatroban -D
- تؤثر خافضات سكر الدم المذكورة أدناه عن طريق: 95. تنبيه مستقبلات PPARγ 96. تثبيط SGLT-2 97. تثبيط DPP-4 sitagliptin -C nateglinide -B miglitol -A dapagliflozin -E pioglitazone -D	- تعتمد آلية تأثير الأدوية المذكورة أدناه على: 85. تثبيط الـ PDE 86. حصر المستقبلات المسكارينية 87. حصر مستقبلات H2 enprostil -C ipratropium -B cromolyn -A pantoprazole -E theophylline -D
- تعتمد آلية تأثير الأدوية المستعملة في علاج البدانة المذكورة أدناه على: 98. زيادة تحرر الـ noradrenaline 99. تنبيه مستقبلات الـ GLP-1 100. تثبيط الليياز المعدي المعوي metformin -C orlistat -B phentermine -A semaglutide -E setmelanotide -D	- تعتمد آلية تأثير مثبطات المناعة المذكورة أدناه على: 88. تثبيط الـ calcineurin 89. تثبيط اصطناع البورينات 90. تثبيط الـ dihydrofolate reductase thalidomide -C tacrolimus -B ritoximab -A methotrexate -E azathioprine -D

انتهت الأسئلة

أستاذ المقرر: د. سفير حبيب

رئيس قسم الصيدلانية والادوية
د. سفير أمين حبيب





ID NUMBER

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

د. فرحان
مقرر المذاكرة لمرشد
سنة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

د. فرحان

الاسم والكنية: _____
الاسم الأب: _____
الاسم الأم: _____
الرقم الامتحاني: _____
السنة الدراسية: _____
الدورة الفصلية: _____
المقرر: _____
التاريخ: _____

هذا السؤال
89

ملاحظات هامة:

1. مراعاة كتابة كافة البيانات المذكورة في المربع أعلاه بشكل صحيح

2. يظل الرقم الامتحاني من اليمين ليسار وبدءاً من يمين المربع المخصص للرقم الامتحاني ووفق المثال التالي:

1766554

58-57-56-46-45
87-80-64

ID NUMBER

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

2

د. فرحان

3. يجب أن يكون التظليل إشارة غامقة وتتمل مربع الإجابة بشكل جيد.

4. إذا كنت مضطراً للمحي فيجب أن يكون المحي جيداً ونظيفاً وخالياً من السواد ولا يجوز ثقب مكان الإجابة بأي حال من الأحوال وعدم وضع إشارة (X) على الإجابة الخاطئة.

5. عدم ثني الورقة أو الكتابة على الحافة اليسارية لها.

6. نوع القلم المستخدم في التظليل قلم رصاص نوع (B2) لتظليل الرقم الامتحاني فقط والتظليل المبدئي للإجابات والقلم الأزرق الناشف يستخدم لتثبيت الإجابات

الخاتم