

أسئلة المهارات الجراحية سنة ثالثة - فصل ثاني

٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

- س ٩ - اختر الاجابة الخاطئة بما يتعلق بخيوط فايكريل :
- تمتص تقريبا خلال ٣ شهور
 - يبقى وظيفيا ومتينا اكثر من شهر ونصف الى شهرين
 - يستخدم البنى المتينة التي تحتاج للتنشيط لوقت اطول
 - لونه اسود
- س ١٠ - اختر الاجابة الخاطئة بما يتعلق بخيوط فايكريل سريع الامتصاص
- يدوم لمدة اسبوعين
 - يستعمل لخيطة الاغشية المخاطية وجلد الاطفال
 - مساوئه انه لايمتص قبل حدوث الارتكاس الالتهابي الشديد
 - باستعمله فقد تم الاستغناء عن خيوط الكروميك
- س ١١ - تنظيف الادوات الجراحية (ماعدا) :
- يتضمن ازالة الاوساخ والمواد العضوية
 - يتم باستعمال الماء والصابون
 - قد نضيف مواد لرفع كفاءة التعقيم
 - يفضل عدم تفكيك الادوات ذات القطع المتعددة
 - يفضل تنظيف الادوات اليدوي على الالي
- س ١٢ - تطهير الجلد باليود (ما عدا) :
- يستخدم في العمليات العظمية عند تركيب الصفائح
 - فعال ضد الجراثيم ايجابية وسلبية الغرام
 - غير فعال ضد الفطور
 - يؤدي لحساسية جلدية وتصبغات
 - قد يؤدي لحروق جلدية
- س ١٣ - التطهير بالكحول (ما عدا) :
- قاتل للجراثيم وضعيف على الفيروسات
 - سريع التبخر
 - قابل للاستعمال
 - يفضل استعماله بالجروح المفتوحة
 - يستخدم ممدد بتركيز ٧٠%
- س ١٤ - لتعقيم الخيوط الجراحية (الاجابة الصحيحة)
- حرارة جافة
 - الصاد الموصد
 - اشعة غاما
 - الماء المغلي
 - الغلوتارالدهيد
- س ١٥ - الحقن الشرجية (ما عدا) :
- اجراء غير عقيم
 - الاجراء الاول للامساك بعد العمليات الجراحية
 - يفضل اجراؤها بعد الطعام ب ٣ ساعات
 - وضعية المريض الاضطجاع الجانبي
 - نحتاج لمادة مزلفة
- س ١٦ - تستعمل الحقن الشرجية تشخيصيا وعلاجيا (اجابة صحيحة)
- اورام الكولون
 - البوليبيات الكولونية
 - انغلاف الامعاء
 - داء التروج
 - التهاب الزائدة الدودية

- س ١ - اختر الاجابة الخاطئة بما يتعلق بحروق الدرجة الثانية العميقة
- إصابة الطبقة المتقرنة ومعظم الأدمة ومعظم الغشاء القاعدي
 - يترك الشفاء تصبغا حسب العمق
 - الشفاء خلال أسبوع
 - يمكن أن يترك ندبات قليلة
- س ٢ - بعد تعرض منزل لحريق ، اختر من يتوجب قبوله بالمشفى وفقاً للمساحة :
- الأب ٤٠ سنة ١٠%
 - الام ٣٥ سنة ١٣%
 - الابن ١٠ سنوات ٥%
 - البنت ٨ اشهر ٦%
- س ٣ - اختر الاجابة الخاطئة بما يتعلق بالآلية المرضية للحروق
- يحدث اضطراب بالسوائل والشوارد
 - تهيمن الاضطراب على اللوحة السريرية خلال الايام العشرة الاولى
 - الارتكاس الاساسي هو زيادة نفوذية الاوعية الشعرية
 - تزداد شدة الوذمة مع زيادة عمق الحرق
- س ٤ - اختر الاجابة الخاطئة بما يتعلق بتعويض السوائل والشوارد عند المريض المحروق :
- الكمية المسربة خلال الساعات الثمانية الاولى معادلة لنصف الكمية المحدودة لليوم الاول
 - تحتسب الساعات بدءا من لحظة حدوث الحرق
 - ننقص الكمية لليوم الثاني لثالث الكمية المحددة لليوم الاول
 - يجب أن يعادل الادرار الساعي ٣٠-٥٠ مل الساعة لدى البالغ
- س ٥ - اختر الاجابة الخاطئة بما يتعلق بقاعدة ايفانس لتعويض السوائل والشوارد :
- سوائل كهربية : ١ مل x وزن الجسم x مساحة السطح المحروق
 - محلول سكري ٥% : ٢ لتر
 - سوائل غروية : ١ مل x وزن الجسم x مساحة السطح المحروق
 - لاتحدث وذمة مهما كان نوع البروتينات المسربة
- س ٦ - اختر الاجابة الخاطئة نستعمل ابرة مدورة عند خياطة :
- الصفاق
 - القرنية
 - الاوعية
 - الكبد
- س ٧ - اختر الاجابة الصحيحة لاحداث الثقوب في الجراحة التنظيرية نستخدم شفرة رقم :
- ١٠
 - ١١
 - ١٢
 - ١٥
- س ٨ - اختر الاجابة الخاطئة بما يتعلق بملقط كوشر :
- يستعمل لمسك الانسجة لشدها بقوة
 - يستعمل لمسك كتلة ورمية او مرارة ملتهبة
 - يستعمل بشكل كبير للارقاء
 - يوجد منه نوع مستقيم وآخر منحني



س ١٧ - في الحين يرتفع مشعر SAAG في مايلي (ماعدا)

- A. سل البريتوان
- B. تشمع الكبد
- C. متلازمة بودكياري
- D. قصور القلب الاحتقاني

س ١٨ - يزل الحين (ماعدا) :

- A. يفضل ان تكون المثانة ممتلئة
- B. وضعية الاستلقاء الظهرى
- C. استعمال كفوف معقمة
- D. تطهير الجلد بالفيدون
- E. مكان البزل في الحفرة الحرقفية وحشي المستقيمة

س ١٩ - ضخامة بالعنق على الخط المتوسط متحركة بعد اللسان)
(اجابة صحيحة)

- A. كيسة غلصمية
- B. كيسة درقية لسانية
- C. رتج بلعومي
- D. عقدة درقية
- E. كيسة نظيرة الادمة

س ٢٠ - في انسداد الامعاء تشتد الاصوات المعوية . اجابة صحيحة)

- A. تناول المسكنات المركزية
- B. قصور الغدة الدرقية
- C. نقص بوتاسيوم الدم
- D. ورم كولون ستاد
- E. بعد العمليات الجراحية تحت التخدير العام

س ٢١ - بالجلس يكون البطن خشبي (اجابة صحيحة)

- A. حصاة اسفل الحالب
- B. حصاة مرارية غير مختلطة
- C. قرحة منقوبة
- D. التهاب معدة وامعاء
- E. احتشاء عضلة قلبية

س ٢٢ - المس الشرجي (ماعدا) :

- A. اجراء غير عقيم
- B. نستعمل مادة مزقة
- C. يمكن تقييم البروستات
- D. يجرى بسبابة اليد
- E. مضاد استطباب عند وجود بواسير خارجية

س ٢٣ - بالقرع طبليّة فوق الكبد (اجابة صحيحة)

- A. تشمع كبد
- B. انصباب جنب
- C. خراج كبدي
- D. انتقاب حشا اجوف
- E. ورم كلية اليمنى

س ٢٤ - الكسر الجهدي في القدم اشيع في المشط

- A. الاول
- B. الثاني
- C. الثالث
- D. الرابع
- E. الخامس

س ٢٥ - يحدث الكسر الانقلاعي بقاعدة المشط الخامس بالقدم بسبب تقلص مفاجئ وعنق للعضلة :

- A. الظنوب الامامية
- B. الظنوبية الخلفية
- C. الشظوية الطويلة
- D. الشظوية القصيرة
- E. وتر اشيل

س ٢٦ - الكسر المنخفض شائع في :

- A. العقب
- B. الحوض
- C. عنق الفخذ
- D. الجمجمة
- E. اسفل الكعبرة

س ٢٧ - اي من الكسور التالية قد يسبب هبوط يد :

- A. كسر عضد
- B. كسر زند
- C. كسر كعبرة
- D. كسر كولس
- E. كسر زورقي

س ٢٨ - الم وايلام وذمة في منشقة المشرحين تالي لسقوط يوجه لكسر في العظم :

- A. الهلالي
- B. الكبير
- C. الزورقي
- D. المربعي
- E. المتأني

س ٢٩ - قد يكون التصوير الطبقي المحوري ضروريا لتقييم الاذيات التالية ماعدا :

- A. كسور الحوض
- B. خلوع الورك الرضية
- C. كسور الاطباق الظنبوبية
- D. كسور اوسط الساق المفتتة
- E. كسور اسفل الساق المفتتة

س ٣٠ - الاختلاط الاخطر لكسر فوق اللقمتين العضديتين عند الاطفال هو اذية :

- A. العصب الناصف
- B. العصب الزندي
- C. الشريان العضدي
- D. الشريان الكعبري
- E. الشريان الزندي

س ٣١ - اي من اختلاطات الكسور التالية يعالج بتنضير حواف الكسر المتصلبة مع تثبيت قوي وتطعيم عظمي :

- A. الانتان
- B. سوء الاندمال
- C. تأخر الاندمال
- D. عدم الاندمال

س ٣٢ - في خلع الورك الرضي اي مما يلي يمكن ان يكون عرضة للاذية


- A. العصب الفخذي
- B. العصب الوركي
- C. الشريان الفخذي
- D. الوريد الفخذي
- E. العصب السدادي

س ٣٣ - الخلع الذي ينجم عادة عن الصدمات الكهربائية ونوب الاختلاج الصرعية هو خلع :

- A. الكتف الامامي
- B. الكتف الخلفي
- C. الورك الامامي
- D. الورك الخلفي
- E. الرضفة

س ٣٤ - كل مايلي من الاماكن الشائعة لانتقالات الاورام الخبيثة الى العظام ماعدا :

- A. الفقرات
- B. الاضلاع
- C. اعلى الظنوب



س ٤٣ - في فحص الجملة الحركية (جواب واحد خطأ)

- A. فحص القوة والمقوية العضلية
- B. الحجم والقوام العضلي
- C. المشية
- D. المنعكسات الوترية

س ٤٤ - أهم استجابات إجراء البزل القطني (جواب واحد خطأ)

- A. التخدير القطني
 - B. تأكيد التهاب سحايا قححي
 - C. تشخيص أورام النخاع الشوكي
 - D. في تدبير بعض حالات كسر قاعدة الجمجمة
- س ٤٥ - أهم أسباب الإسعاف الجراحي الرضي (جواب واحد صحيح)
- A. حوادث السير والطرق 55%
 - B. حوادث العمل 10%
 - C. حوادث الرياضة 20%
 - D. حوادث التعدي والمشاجرة 40%

س ٤٦ - في البزل القطني (جواب واحد صحيح)

- A. يتم بالمسافة القطنية ق-4 ق-5
 - B. يتم بالمسافة القطنية ق-5 ق-٦
 - C. يكون اتجاه المسار بشكل أفقي دوماً
 - D. من أهم اختلاطاتها تطور شلل نصفي رخو
- س ٤٧ - في مواجهة مريض مرضى مكان وقوع الحادث (جواب واحد خطأ)

- A. يمكن البدء بالإنعاش التنفسي (فم - فم)
 - B. يمكن البدء بالتمسيد القلبي خارجي
 - C. تثبيت الكسور المرئية والمتوقعة بأقرب وسيلة متناول اليد
 - D. نبدأ بخزغ الرغامى الإسعافي
- س ٤٨ - المنعكس لقرني (إجابة واحدة صحيحة)

- A. يتبع فحص العصب القحفي 3
 - B. يتبع فحص العصب القحفي 5
 - C. يتبع العصب القحفي 7
 - D. يتبع الفحص القحفي 4
- س ٤٩ - السرطان القنوي الغازي للثدي جواب خطأ :

- A. شائع جداً غزور الحمة
 - B. يشكل 30% مع علامة قشر البرتقال يزيد احتمال الخباثة
 - C. ثنائي الجانب علامة سلامة
 - D. التشخيص يتم بإجراء خزعة اسفينية من الحمة والهالة
- ٥٠ - عوامل خطورة سرطان الثدي جواب خطأ :

- A. قصة عائلية ايجابية
 - B. الحمل المتعددة
 - C. البدانة
 - D. حبوب منع الحمل
 - E. التقدم بالعمر
- س ٥١ - عدم جس الحلقات الرغامية فوق ثلثة القص قد يكون بسبب

- A. ضخامة درقية غاطسة
 - B. ضخامة تيموس
 - C. كلاهما صح
 - D. كلاهما خطأ
- س ٥٢ - وجود حرارة موضعية بالجس فوق الغدة الدرقية قد يكون بسبب

- A. التهاب الدرق الحاد
- B. فرط نشاط غدة درقية داء غريف
- C. كلاهما صح
- D. كلاهما خطأ

D أعلى العضد

E - تحت المدورين

س ٣٥ - تعتبر الحركة الباكرا بعد عمليات استبدال الكسور ضرورية وخاصة عند المسنين وذلك لتفادي الاختلاطات التالية ما عدا :

- A. التهاب الوريد الخثري
- B. الصمة الرئوية
- C. الانتانات التنفسية
- D. سوء اندمال الكسور
- E. الخشخشيات

س ٣٦ - في إصابة الجملة الهرمية (إجابة واحدة خاطئة)

- A. تشتت المنعكسات الوترية
 - B. قد تظهر علامة الرمع
 - C. تغيب المنعكسات الجلدية
 - D. تظهر المنعكسات المرضية
 - E. تغيب المنعكسات الوترية
- س ٣٧ - يعتمد سلم غلاسكو في تقييم درجة الوعي (إجابة واحدة صحيحة)

- A. حركة العينين
 - B. حركة الأطراف
 - C. حركة الأطراف والعينين والكلام
 - D. حركة الأطراف والعينين
- س ٣٨ - مناورات تأمين طريق هوائي حر يشمل (إجابة واحدة خاطئة) :

- A. وضع قنية بالفم
 - B. التنبيب الرغامى
 - C. جر الفك السفلي بقوة للامام
 - D. جر الفك السفلي بقوة للخلف
- س ٣٩ - في مراحل مواجهة المريض المرضوض (جواب واحد خطأ)
- A. يجب تأمين طريق هوائي حر.
 - B. يتم نقل المريض بسرعة شديدة الى المشفى وكيفما كان .
 - C. يجب البدء بالتمسيد القلبي الخارجي إن لم تسمع دقات القلب .
 - E. فتح خط وريدي واكثر

س ٤٠ - في تحري الحدقات عند المريض المسبوت (جواب واحد خطأ)

- A. توسع الحدقة بجهة مع زوال الارتكاس للضياء يشير لاصابة العصب القحفي ق-٣ الموافق

- B. البؤبؤ النقطي يشير لنزف في الجسر
- C. توسع الحدقتين مع تفاعلها ببطء يشير الى موت دماغي
- D. يتوسع الحدقتين وعدم تفاعلها يشير لاذية استقلابية

س ٤١ - حدوث صدمة أو تأثير مضادات تجاه الرأس من زجاج أوسقف السيارة (إجابة واحدة خاطئة)

- A. حدوث أذيات الوجه والعنق
 - B. حدوث نزوف دماغية
 - C. حدوث كسر جمجمة
 - D. حدوث سطم قلبي
 - E. حدوث كسور عمود فقري
- س ٤٢ - تكثر اسباب حوادث السير والطرق بسبب (جواب واحد خطأ)

- A. عدم وضع حزام الامان
- B. عدم وضع خوذة الرأس
- C. التقيد بالمرور لأشخاص على ممر المشاة
- D. عدم التقيد بالشاخصات المرورية



س ٥٣ - اشرح سبب لوجود كتلة في العنق

- A. ضخامة لمفاوية
- B. كمية درقية لسانية
- C. كمية غاصمية
- D. سلعة درقية

س ٥٤ - يحدث تسرع النبض في كل مما يلي عدا :

- A. ارتفاع درجة الحرارة
- B. ارتفاع التوتر داخل القحف
- C. فرط نشاط الغدة الدرقية
- D. الاسهال الحاد

س ٥٥ - ضخامة عقد لمفاوية ابطية عند سيدة مع افة في الثدي الموافق يمكن ان يكون كل ما يلي عدا :

- A. سرطان الثدي
 - B. سل الثدي
 - C. خراج الثدي
 - D. ورم حليمي داخل الاقنية
- س ٥٦ - كل ما يتظاهر في المثلث الامامي للعنق ماعدا :

- A. كمية درقية لسانية
- B. عقدة درقية في برزخ الرق
- C. لييوما
- D. ورم بانكوست في قمة الرئة

س ٥٧ - متلازمة هورنر جواب صح :

- A. تحدث باصابة العصب الوجهي
- B. تحدث باصابة السبيل نظير الودي
- C. يحدث فيها غياب التعابير الوجهية جهة الاصابة
- D. كل ما سبق خطأ

س ٥٨ - يتم تنظيم عملية التنفس من خلال جواب صح :

- A. مركز التنفس في البصلة السيسانية
- B. نسبة اكسجة الهيموغلوبين
- C. درجة PH
- D. كل ماسبق صح

س ٥٩ - بطئ التنفس جواب واحد خطأ :

- A. هو بطئ عدد مرات التنفس عن ١٦ مرة بالدقيقة
- B. يحدث في الانسجام الكحولي
- C. يحدث في الانسمام اليوريمياني
- D. افات جذع الدماغ

س ٦٠ - كل مايلي صحيح فيما يتعلق بالتامور ماعدا واحد :

- A. يتألف من وريقين
- B. الوريقة الحشوية تتعلق بالقلب
- C. الوريقة الجدارية تنفصل عن الحشوية بسائل التامور
- D. يثبت التامور القلب ويمنع حركته
- E. ماهم في حماية القلب

س ٦١ - تقدر كمية السائل التاموري (واحد صح)

- A. ١ مل
- B. ٥ مل
- C. ١٠٠ مل
- D. ٥٠ مل
- E. ١٠٠ مل

س ٦٢ - من اسباب الانصباب التامور (واحد خطأ)

- A. الرض
- B. الانتان
- C. الاورام
- D. بعد جراحة القلب المفتوح
- E. الرض النفسي

س ٦٣ - من أعراض السظام التاموري (واحد خطأ)

- A. زيادة النبض
- B. ارتفاع الضغط
- C. انتباج الوداجين
- D. نقص الفولتاج بالتخطيط
- E. زلة تنفسية

س ٦٤ - من اختلاطات بزل التامور (واحد خطأ)

- A. ریح صدرية
- B. اصابة الشرايين الاكليلية
- C. اصابة الاجواف القلبية
- D. اصابة المعدة
- E. اصابة الابهر

س ٦٥ - من استطباب خزع الرغامى (واحد خطأ)

- A. العمليات الجراحية الطويلة
- B. الاذيات العصبية
- C. جسم اجنبي داخل الرغامى
- D. الكسور الرقبية
- E. بعض التشوهات الولادية في الرغامى

س ٦٦ - من فوائد خزع الرغامى (واحد خطأ)

- A. انقاص مقاومة الطريق الهوائي
- B. راحة اكبر للمريض
- C. تعامل اسهل مع المفرزات الرغامية
- D. امكانية العظام المبكر
- E. امكانية اجراء الجراحات العظمية بسهولة اكثر

س ٦٧ - وضعية تراند لينورغ (واحد صح)

- A. ميلان الراس والجذع للأسفل
- B. ميلان الراس والجذع للأعلى
- C. ميلان الراس والجذع للامين
- D. ميلان الراس والجذع لليسر
- E. الجذع والرأس على مستوى افقي

س ٦٨ - من مضادات استطباب ال Tourniquet (واحد خطأ)

- A. جراحة اليد
- B. انخثار الوريدي
- C. انخثار الشرياني
- D. الكسور العظمية
- E. الانتان

س ٦٩ - يقدر عمر الصفائح (واحد صح)


- A. ٧ ساعات
- B. ٧ ايام
- C. يوم واحد
- D. ١٠ ايام
- E. ٣٠ يوم

س ٧٠ - يقدر عمر الكريات الحمر (واحد صح)

- A. ٧ ساعات
- B. يوم واحد
- C. ٧ ايام
- D. ١٠ ايام
- E. ٣٠ يوم

س ٧١ - سرعة نقل البلازما (واحد صح)

- A. ١ مل / كغ
- B. ٥ مل / كغ
- C. ١٠ مل / كغ
- D. ٥٠ مل / كغ
- E. ١٠٠ مل / كغ



س ٧٢ - كل العلامات السريرية التالية تتماشى مع تشخيص انصباب

جنب ماعدا

- A. نقص اهتزازات صوتية
- B. فرط وضاحة بالقرع
- C. خفوت اصوات تنفسية

D. نقص بحركة نصف الصدر المصاب بالانصباب

س ٧٣ - كل مايلي صحيح فيما يتعلق بجوف الجنب ماعدا

A. ان الضغط داخل جوف الجنب سلبي في كل مراحل الدورة التنفسية

B. في حال حدوث انصباب في احد جوفي الجنب فهو يتحرك بسهولة الى جوف الجنب المقابل

C. تتالف الجنب الجدارية في طبقة واحدة من الخلايا الميزوقليالية بينها مسامات

D. يمكن فصل الجنب الجدارية عن جدار الصدر

س ٧٤ - ممايلي فيما يخص تفجير الصدر صح ماعدا

A. يتحول الضغط داخل الرئة الى ايجابي في مرحلة قصيرة من الدورة التنفسية

B. تفك قطبة الانتظار عند سحب مفجر الصدر

C. يفضل وضع انبوب التفجير الصدر في الورب الرابع او الخامس خط ابطي امامي او متوسط

D. يجب وصل انبوب تفجير الصدر بدسام وحيد الاتجاه

س ٧٥ - المكان المفضل لوضع زجاجة تفجير الصدر في حال استخدام التفجير تحت :

A. اخفض من مستوى دخول المفجر بحوالي ٧٠-٥٠ سم

B. بمستوى دخول مفجر الصدر

C. اعلى مستوى انبوب تفجير الصدر بحوالي ١٥ - ٢٠ سم

D. لا يوجد اي اهمية لمكان وضع زجاجة التفجير بالنسبة لمكان دخول انبوب تفجير الصدر

س ٧٦ - كل مايلي عن الريح الصدرية صح ماعدا :

A. هي وجود هواء داخل جوف الجنب

B. تسببها جروح الصدر النافذة فقط

C. قد يكون العلاج هو بزل الريح الصدرية بشروط خاصة

D. قد تكون الريح الصدرية طبيعة المنشأ

س ٧٧ - عند تشخيص انصباب الجنب متوسط الكمية عند شاب نمر ٢٥ سنة فالاجراء الذي يجب اجراؤه بداية هو :

A. بزل الجنب للتفريق بين انصباب الجنب التحتي والنتعي

B. تفجير الصدر لراحة المريض

C. العلاج بالمدرات والصادات الجيدة

D. فتح الصدر لمعرفة التشخيص الاكيد بسبب الانصباب وتديره

س ٧٨ - قد تترافق كل من الامراض التالية بانصباب الجنب من نموذج النتعي بحسب المعايير لايت ماعدا

A. للسمل الرئوي

B. قصور القلب الاحتقاني

C. تشمع الكبد

D. النفروز

س ٧٩ - التدبير الاسعافي الاولى في الريح الصدرية المؤثرة هي

A. فتح الصدر الاسعافي لحظة التشخيص

B. وضع المريض مباشرة على جهاز التنفس الاصطناعي

C. وضع قنطرة وريدية داخل جوف الجنب بمستوى الورب الثاني خط منتصف الترقوة

D. نقل الدم والسوائل مفرطة التوتر لتحسن الضغط الشرياني

س ٨٠ - كل مايلي صح في انصباب الجنب حسب معايير لايت ماعدا

A. يصنف لايت الانصباب الى نتعي وتعني اعتماد على البروتين الكلي وال LDH

B. يكفي ان يكون البروتين في الانصباب فوق ال ٣٠ غ/ل

C. بين سائل الجنب والمصل اكبر من ٠.٦ ليكون الانصباب نتحيا

D. يجب تحقيق الشرطين معا البروتين الكلي فوق ٣٠ غ/ل ونسبة ال LDH بين السائل الجنب والمصل ٠.٦ ليكون الانصباب نتحيا

E. يعتبر الداء الرثياني من اسباب انصباب الجنب النتحي

س ٨١ - لتامل تناظر البطن يقف الطبيب عن

A. رأس المريض

B. ايسر المريض

C. ايمن المريض

D. عند قدمي المريض

س ٨٢ - قرع البطن (اجابة خاطئة)

A. لكشف عن ضخامة خشونة غير مجسوسة

B. يبا من منطقة طبلية باتجاه اصمية متوقعة

C. اليد اليسرى بتماس جدار البطن مع مبادعة الاصابع

D. القرع على السلامة الوسطى للاصبع الوسطى اليسرى

E. حركة اليد اليمن بالقرع تكون من المرفق

س ٨٣ - اصغاء الحركات الحوية المعوية (اجابة خاطئة)

A. تجري الاصغاء قبل جس البطن

B. يجب ترك السماع في المكان لمدة دقيقة على الاقل

C. عدد الحركات الحوية الطبيعية ٢٠ حركة / بالدقيقة

D. يتم الاصغاء باحدى الحفرتين الحرقفتين

س ٨٤ - قد يكون التشخيص التفريقي في صورة الصدر الخلفية الامامية التي تبدى نصف صدر ظليل (ابيض) كما يلي ماعدا

A. انصباب جنب شامل لنصف الصدر المصاب

B. انخماص الرئة تام

C. كتلة كبيرة تملأ اجوف الجنب الموافق

D. كيسة هوائية كبيرة تشغل معظم الرئة الموافقة

س ٨٥ - يتصف الألم الكلوي مع كل ما يلي ما عدا:

A. الانتشار : للناحية الختالية

B. يتغير بوضعية المريض

C. يعطي ألماً مرئداً للشفر الكبير

D. يترافق مع أعراض بولية سفلية

E. يستجيب على المسكنات

س ٨٦ - كل مما يلي بشأن فحص الحالب صحيح ما عدا:

A. الألم يشمل الربع النصف من البطن

B. النهز القطني سلبي

C. يفيد المس الشرجي

D. يفيد المس المهبل

E. تقع النقطة الحالية العلوية جانب السرة

س ٨٧ - يدخل في التشخيص التفريقي للبيئة الدموية كل ما يلي ما عدا:

A. بوليب مثنائي

B. القيلة الحالية

A. حصاة مثانة

B. التهاب المثانة الجرثومي

C. سل المثانة

س ٨٨ - يطلب كل مما يلي في التقييم الأولي للبيئة الدموية ما عدا:


A. تحليل البول والراسب

B. تحري الخلايا الورمية

C. التصوير الومضاني للكلىتين

D. التصوير الطبقي للجهاز البولي مع الحقن

E. التنظير البولي السفلي



٨٩ - يطلب كل مما يلي في التفريق الأولي للبيئة اندموية ما عدا:

- A. تحليل البول والراسب
- B. تحري الخلايا الورمية
- C. التصوير الومضاني للكليتين
- D. التصوير الطبقي للجهاز البولي مع الحقن
- E. التنظير البولي السفلي

س ٩٠ - يدخل في التشخيص التفريقي للألم الصفني الحاد كل مما يلي ما عدا:

- A. التهاب بربخ حاد
- B. حصاة مثانة
- C. انقتال زائدة خصوية
- D. انقتال حبل منوي
- E. حصاة حالب

س ٩١ - تتضمن الوقاية من الإنتان لحاملي القنطرة كل مما يلي ما عدا:

- A. غسيل المثانة
- B. تبديل القنطرة عند حدوث الإنتان المقترن بالحرارة
- C. تناول السوائل بغزارة
- D. استخدام قنطرة السيليكون
- E. إعطاء المضادات الحيوية

س ٩٢ - كل مما يلي يشخص بوساطة التصوير بالأشعة فوق الصوتية ما عدا:

- A. ورم كلية
- B. ورم مثانة
- C. حصاة كلية
- D. ورم خصية

E. حصاة في الحالب الحرقفي

س ٩٣ - ما هي العلامة الفارقة للإنتان البولي في اختبار البول والراسب:

- A. ظهور الجراثيم
- B. ايجابية النيتريت
- C. ايجابية الاسطوانيات
- D. ايجابية البييلة البروتينية
- E. اللون العكر

س ٩٤ - كل مما يلي يدخل بالتشخيص التفريقي للعقدة الموثية ما عدا:

- A. سرطان المثة
- B. سل المثة
- C. كيسة بالقريبة الموثية
- D. حصاة المثة
- E. التهاب المثة المزمن

س ٩٥ - كل مما يلي يؤدي لعسر التبول ما عدا:

- A. ضخامة البروستات السليمة
- B. تضيق الاحليل
- C. التهاب المثانة
- D. تليف عنق المثانة
- E. المبال التحتاني

س ٩٦ - كل مما يلي يؤدي للزحير البولي ما عدا:

- A. التهاب المثانة الجرثومي
- B. التهاب المثانة السلي
- C. حصاة المثانة
- D. انقلاب المثانة الخارجي
- E. ورم المثانة

س ٩٧ - كل مما يلي يؤدي لتعدد البيلات ما عدا:

- A. البييلة التفهة
- B. الداء السكري
- C. التهاب مثانة
- D. المبال فوقاني

E - حصاة المثانة

س ٩٨ - إن أول استقصاء يجرى عند الشك بالإنتان البولي هو :

- A. ايكو جهاز بولي
- B. ايكو الصفن
- C. الصورة الظليلة للجهاز البولي
- D. تحليل البول والراسب
- E. زرع بول

س ٩٩ - إن كل الاستقصاءات الآتية تفارب المثانة ما عدا:

- A. ايكو البطن
- B. الصورة الظليلة للجهاز البولي
- C. تصوير الاحليل الراجع الظليل
- D. تنظير المثانة

س ١٠٠ - يعبر قياس القنطرة البولية عن جواب واحد صح

- A. محيط دائرة المقطع
- B. قطر دائرة المقطع
- C. نصف قطر دائرة المقطع
- D. طول القنطرة

