جامعة دمشق
كلية العلوم

المرجع كتاب نظرية الأعداد - الدكتورة دعد الحسيني و الدكتور محمد بشير قابيل

محاضرات نظرية الأعداد 2020

الفهرس

مقدمة

تمهيد

الباب الأول

الفصل الأول قابلية القسمة في Z وتطبيقاتها

- قابلية القسمة في Z وتطبيقاتها
- خواص قابلية القسمة
- مبرهنة اقليدس

الفصل الثاني القواسم المشتركة والمضاعفات المشتركة

- القاسم المشترك الأعظم
- خواص القاسم المشترك الأعظم
- خوارزمية اقليدس
- القاسم المشترك الأعظم لمجموعة أعداد صحيحة
- المضاعف المشترك الأصغر
- تمارين

الفصل الثالث الأعداد الأولية

- بعض خواص الأعداد الأولية
- المبرهنة الأساسية في الحساب
- مبرهنة الأعداد الأولية
- التحليل إلى عوامل بطريقة فيرما

الفصل الرابع معادلات ديوفانتس

- معادلات ديوفانتس الخطية بمجهولين
- ثلاثيات فيثاغورث
- تمارين

الباب الثاني

الفصل الأول التطابقات

- تعريف التطابق
- صفوف البواقي
- مجموعة البواقي التامة
- خواص التطابقات

الفصل الثاني التطابقات الخطية

- تعريف التطابق الخطي
- الكسور البسيطة المستمرة المنتهية
- النظرير الصغرى
- حل جملة تطابقات خطية
- مبرهنة الباقي الصينية
- مبرهنة فيرما الصغرى
- مبرهنة ويلسون
- عكس مبرهنة ويلسون
- تمارين

الفصل الثالث الدوال العددية وبعض الدوال الخاصة

- تعريف الدوال العددية
- الدالة العددية الضربية
- دالة الجزء الصحيح
- مجموعة البواقي المختزلة
- دالة أولر
- مبرهنة أولر
- الدالتان $\sigma(n)$, $\tau(n)$
- الأعداد التامة أو الأعداد الكاملة
- دالة موبياس
- صيغة موبياس للتعاكس
- الدالة ليوفيل $\lambda(n)$
- الدالة مانجولد $\wedge(n)$
- تمارين

الفصل الرابع المراتب والجنور الأولية والأدلة

- تعريف المرتبة
- الجنور الأولية والأدلة
- تعريف الجنر الأولي
- تعريف الدليل
- خواص الأدلة
- حل التطابقات غير الخطية باستخدام الأدلة
- تمارين

تمهيد

مبدأ الاستقراء الرياضي :

لا بد قبل البدء بموضوعات المقرر من عرض مبدئين هامين يكثر استخدامهما في إثبات مبرهنات هذا المقرر، الأول هو مبدأ الترتيب الحسن أو (الجيد) *Well-ordering Principle* والثاني هو مبدأ الاستقراء الرياضي المنتهي *Mathematical Induction Principle*.

1 - مبدأ الترتيب الحسن :

إذا كانت A مجموعة جزئية غير خالية من مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة Z^+ فإنه يوجد في A عنصر أصغر أي يوجد $a_0 \in A$ بحيث : $a_0 \leq a$ ، $\forall a \in A$ » وهذا العنصر الأصغر وحيد « .

2 - مبدأ الاستقراء الرياضي المنتهي :

وهو وسيلة سهلة لإثبات الكثير من المبرهنات الرياضية ، وخاصة في نظرية الأعداد ، ولنشرح هذا المبدأ بالتمرين الممهّد الآتي:

تمرين مُمهّد :

إذا أشرنا بالرمز S_n للقضية الرياضية :

$$S_n : 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1+2+\dots+n)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

فيمكن أن نتحقق بسهولة أن S_1 صحيحة ذلك أن

$$1^3 = (1)^2 = \left(\frac{1 \times 2}{2}\right)^2$$

مساواة صحيحة

كذلك يمكن أن نتوثق من أن S_2 صحيحة ذلك أن القول هل المساواة الآتية صحيحة

$$1^3 + 2^3 \stackrel{?}{=} (1+2)^2 = \left(\frac{2 \times 3}{2}\right)^2$$

$$1+8 \stackrel{?}{=} 9 \stackrel{?}{=} 9$$

أي هل صحيح أن

والجواب نعم إذن تم المطلوب .

ويمكن أن نتحقق أن S_3 صحيحة أيضاً ، ولكن هل S_n صحيحة أياً كانت n ؟. وإذا ظننا ذلك فكيف نثبت ذلك ، علماً بأننا لا نستطيع أن نقوم بعمل ما لا نهاية له من التحقيقات ؟ أليس ثمة مخرج ؟ ... بلى ثمة مخرج هو مبدأ الاستقراء الرياضي الذي ينطلق من الفكرة البسيطة الآتية:

نحن نعلم أنه إذا أمكن أن نقف على درجة من درجات سلم متتالية وإذا كان بالإمكان بعد ذلك المرور من درجة إلى الدرجة التي تليها فعندئذ يمكن أن نصل إلى الدرجة الثالثة فالرابعة ... وبالتالي يمكن أن نتسلق السلم حتى نهايته بل لنقل لأية درجة شئنا.

يمكن أن ينص مبدأ الاستقراء الرياضي أو كما يسمى أحياناً مبدأ البرهان بالتدرج أو بالاستقراء على ما يلي:

إذا أردت إثبات صحة قضية رياضية S_n تتعلق بالمتغير الطبيعي n من أجل أي عدد $n \geq 1$ ما عليك إلا أن تقوم بالخطوتين التاليتين:

- تتوثق بدايةً من صحة القضية من أجل $n = 1$ (خطوة البداية أو الخطوة الأساسية) .
- ثم نفترض أنها (صحيحة من أجل $n = k$) و تبرهن بعد ذلك صحتها من أجل $(n = k + 1)$ ، (خطوة الاستقراء)

لنستخدم ذلك الآن لإثبات القضية S_n التي وردت في بداية هذه الفقرة:

الخطوة الأولى (الخطوة الأساسية) نتوثق من أنها صحيحة من أجل $n=1$ وقد فعلنا ذلك.

الخطوة الثانية (خطوة الاستقراء) لنفترض أن S_k صحيحة ، أي لنفترض أن :

$$S_k : (1^3 + 2^3 + \dots + k^3) = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 \quad *$$

مساواة صحيحة ولنبرهن أن

$$S_{k+1} : (1^3 + 2^3 + \dots + k^3) + (k+1)^3 = \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$

صحيحة مستفيدين من * ذلك أن الطرف الأيسر يساوي :

$$\begin{aligned} (1^3 + 2^3 + \dots + k^3) + (k+1)^3 &= \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 + (k+1)^3 = \\ &= \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 + (k+1)^3 \stackrel{?}{=} \frac{((k+1)(k+2))^2}{4} \end{aligned}$$

ويكفي للتحقق من ذلك أن تفك الأقواس وتصلح لتجد المراد أو أن تكتب هل :

$$k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3 \stackrel{?}{=} (k+1)^2(k+2)^2$$

$$(k+1)^2 \text{ اختصرنا على } k^2 + 4(k+1) \stackrel{?}{=} (k+2)^2 \quad \text{أو هل :}$$

$$k^2 + 4k + 4 \stackrel{?}{=} k^2 + 4k + 4 \quad \text{أو هل :}$$

والجواب نعم وتم المطلوب .

ثلاث ملاحظات هامة

ملاحظة (1) :

هنالك صيغ أخرى لمبدأ الاستقراء السابق مكافئة له منها :

❖ تكون القضية S_n المتعلقة بالمتغير الطبيعي n صحيحة لأجل $n \geq n_0$ إذا استطعنا فعل ما يلي :

(1) خطوة البداية : التوثق من أن S_{n_0} صحيحة (تعديل في خطوة البداية)

(2) خطوة الإستقراء : إثبات أن (كون S_k صحيحة من أجل $k \geq n_0$) و نبرهن بعدها أن S_{k+1} صحيحة.

مثال (1) : أثبت أن العبارة $S_n: 2^n \leq n!$ صحيحة لكل $n \geq 4$.

(لاحظ أنها صحيحة من أجل $n = 4$)

الحل : الخطوة الأولى : $s_4: 2^4 \leq 4!$ (الرمز $\leq$ يقرأ هل هو أصغر أو يساوي)

$$\text{نجد أن } 2^4 = 16 \leq 24 \text{ محققة.}$$

والجواب نعم والخطوة الأولى قد أنجزت . لننتقل إلى الخطوة الثانية.

خطوة الاستقراء : لنفترض أن المتراجحة $2^k \leq k!$ صحيحة من أجل $k \geq 4$.

والطلب إثبات أن : $2^{k+1} \leq (k+1)!$

$$\text{نقول إن : } 2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \leq (k!) \cdot 2 \leq (k+1)!$$

$$\text{أي } 2(k!) \leq (k+1)(k!)$$

$$\text{أو هل } 2 \leq k+1$$

علماً بأن $k \geq 4$ والجواب نعم وتم المطلوب .

ملاحظة (2) :

مبدأ الاستقراء الثاني و يبرهن أنه مكافئ للأول:

❖ لإثبات صحة قضية S_n من أجل جميع قيم n المحققة للشرط $n \geq n_0$ حيث n_0 معلومة. مثلاً قد نحتاج إلى :

(1) التوثق من أنها صحيحة من أجل $n = n_0$

(2) افتراض صحتها من أجل جميع قيم $n = k$ المحققة للشرط $n_0 \leq k$

ثم إثبات صحتها من أجل $n = k + 1$.

مثال (2) : لتكن لدينا المتتالية العددية الصحيحة المعرفة كما يلي :

$$a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3, a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3}, \forall n \geq 3$$

والمطلوب إثبات أن $a_n \leq 3^n$ من أجل جميع القيم $n \in N$

الإثبات : الخطوة الأساسية : نلاحظ أن :

$$\text{محققة } a_3 = a_2 + a_1 + a_0 = 3 + 2 + 1 = 6 \leq 3^3 = 27$$

$$\text{كذلك } a_4 = a_3 + a_2 + a_1 = 6 + 3 + 2 = 11 \leq 3^4 = 81 \text{ محققة}$$

فالعلاقة صحيحة .

خطوة الاستقراء :

لنفترض أن $a_n \leq 3^n$ من أجل كل $k \geq n \geq 3$ (حيث $k \geq n \geq 3$)

ولنبرهن صحتها من أجل $n = k + 1$

$$\text{لدينا } a_{k+1} = a_k + a_{k-1} + a_{k-2}$$

$$a_{k+1} \leq 3^k + 3^{k-1} + 3^{k-2} \leq 3^k + 3^k + 3^k = 3 \cdot (3^k) = 3^{k+1} \quad \text{أي}$$

وتم المطلوب . أي أن العلاقة $a_n \leq 3^n$ صحيحة مهما تكن $n \in \mathbb{N}$.

مثال (3) أثبت أن

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ \quad S_n : \quad \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

الحل : الخطوة الأساسية : $s_1 = 1 = \frac{1(2)}{2} = 1$ والعلاقة صحيحة

خطوة الاستقراء : نفترض S_k صحيحة $k \geq 1$ ولنثبت أن S_{k+1} صحيحة

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = 1 + 2 + 3 + \dots + k + (k+1) = s(k) + (k+1) \quad \text{لذا نكتب :}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{k(k+1)}{2} + k + 1 \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = 1 + 2 + 3 + \dots + k + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

والعلاقة S_{k+1} صحيحة أي أن S_n محققة $\forall n \in \mathbb{Z}^+$.

ملاحظة (3) :

إن إثبات خطوة الاستقراء فقط لا يكفي لإثبات صحة علاقة رياضية كما أن إثبات الخطوة الأساسية من

أجل قيمة معينة n_0 لا يكفي لإثبات صحة علاقة رياضية $\forall n \geq n_0$.

مثال هادف (4) : أثبت أنه إذا كانت العبارة $S_k : \sum_{i=1}^k i = 1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{(k^2+k+2)}{2}$

صحيحة فإن S_{k+1} صحيحة أي أن : $S_{k+1} = \frac{(k+1)^2 + (k+1) + 2}{2}$ صحيحة

وهل يمكن أن تستنتج أن S_n صحيحة $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ ؟ ؟ .

الحل : لنكتب :

$$S_{k+1} : \quad \sum_{i=1}^{k+1} i = \sum_{i=1}^k i + (k+1) = \frac{k^2+k+2}{2} + (k+1)$$

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k^2+k+2+2k+2}{2} = \frac{k^2+3k+4}{2}$$

أي أنه من أجل $k \in \mathbb{Z}^+$ فإن $S_k \Rightarrow S_{k+1}$

لنحسب الآن S_1 فنجد عندما $n = 1$

$$\sum_{i=1}^1 1 = 1 \quad \text{و} \quad \frac{(n^2+n+2)}{2} = \frac{1+1+2}{2} = 2$$

ولما كان $1 \neq 2$ فإن S_1 غير صحيحة

لنتساءل هل يمكن إيجاد قيمة ابتدائية n_0 بحيث أن s_{n_0} محققة فنثبت صحة S_n ، $\forall n \geq n_0$ ؟

من أجل ذلك و بالاستفادة من المثال (3) نكتب

$$\sum_{i=1}^{n_0} i = \frac{n_0(n_0 + 1)}{2} = \frac{n_0^2 + n_0 + 2}{2} \Rightarrow n_0^2 + n_0 = n_0^2 + n_0 + 2 \Rightarrow 0 = 2$$

وهذا غير صحيح مما يدل على أنه لا توجد أي قيمة n_0 ابتدائية تصح من أجلها العلاقة S_n .

مثال (3) : أثبت أن

$$S_n \forall n \in \mathbb{Z}^+ : \sum_{i=1}^n (2i - 1) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

الحل : الخطوة الأساسية : نلاحظ أن

$$S_1: 1 = 1 = 1^2$$

$$S_2: 1 + 3 = 4 = 2^2$$

$$S_3: 1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$$

خطوة الاستقراء : لنفترض أن S_k محققة ولنثبت صحة S_{k+1}

لنكتب :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} (2i - 1) &= \sum_{i=1}^k (2i - 1) + [2(k + 1) - 1] \\ &= k^2 + [2(k + 1) - 1] = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2 \end{aligned}$$

فالعلاقة S_{k+1} محققة .

أي : S_n محققة $\forall n \in \mathbb{Z}^+$

تمارين

9) $\sum_n i^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ أولاً : لنفترض أن

حيث n عدد طبيعي احسب

$\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3, \Sigma_4$ (a)

$\sum_n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ برهن بالاستقراء أن (b)

ثانياً: أثبت ما يلي بطريقة الاستقراء الرياضي :

1) $1^2 + 3^2 + \dots + (2n - 1)^2 = n(2n - 1)(2n + 1)/3$

2) $1.3 + 2.4 + 3.5 + \dots + n(n + 2) = (n)(n + 1)(2n + 7)/6$

3) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$

ثم استند من ذلك في حساب مجموع السلسلة $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

4) $\sum_{i=1}^n 2^{i-1} = 2^n - 1$

5) $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

6) $\sum_{i=1}^n (i)(i!) = (n + 1)! - 1$

7) $\sum_{k=1}^n (2k + 1)^3 = n(2n^3 + 8n^2 + 11n + 6)$

8) $\sum_{k=1}^n k(k + 1)(k + 2) = \frac{n(n + 1)(n + 2)(n + 3)}{4}$

الباب الأول

الفصل الأول

قابلية القسمة في Z وتطبيقاتها

1-1 تعريف قابلية القسمة :

نقول إن العدد الصحيح $a \neq 0$ يقسم العدد الصحيح b ونكتب $a|b$ إذا وجد عدد صحيح c يحقق المساواة $b = ca$. ونسمي a قاسماً لـ b و نسمي b مضاعفاً له أو نقول إن b يقبل القسمة على a .

وإذا كان a لا يقسم b نكتب $a \nmid b$ وعلى سبيل المثال نكتب : $3|15$ ، $5 \nmid 12$

2-1 خواص قابلية القسمة :

(1) أن العدد 1 هو قاسم لأي عدد صحيح ، وأن الصفر هو مضاعف لأي عدد صحيح .

(2) إذا كان $a|b$ فإن $-a|b$

(3) $a|a$ ، $\forall a \neq 0$ لأن $a = 1.a$

(4) $a|c \Rightarrow a|kc$ ، $\forall k \in Z$

(5) $c = ab_1 \wedge d = cb_2 \Rightarrow d = ab_1b_2 = a(b_1b_2)$ لأن $a|c \wedge c|d \Rightarrow a|d$

(6) $a|c \wedge a|d \Rightarrow a|(mc + nd) \forall m, n \in Z$

لأن $c = ab_1 \wedge d = ab_2 \Rightarrow mc + nd = mab_1 + nab_2 = a(mb_1 + nb_2)$

2- ملاحظة :

يمكن تعميم هذه الخاصة كما يلي : إذا كان $a|b_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$) ،

فإن $a|b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_kx_k$ حيث $x_i \in Z$

(7) $a|c \wedge c \neq 0 \Rightarrow |a| \leq |c|$ لأن $c = ab \neq 0 \Rightarrow |c| = |a|.|b| \Rightarrow |c| \geq |a|$

(8) $a|c \wedge c|a \Leftrightarrow |a| = |c|$ لأن حسب الخاصة (7) $|a| \leq |c| \wedge |c| \leq |a| \Leftrightarrow |a| = |c|$

نتيجة:

إن مجموعة القواسم الموجبة لأي عدد صحيح $a \neq 0$ تحوي عدداً منتهياً من العناصر كلها $|a| \geq$

3-1 المبرهنة الأساسية في الحساب (مبرهنة اقليدس) :

إذا كان $a, b \in \mathbb{Z}$ و $a \neq 0$ فإنه يوجد عدنان صحيحان r, q وحيدان يحققان المساواة

$$b = aq + r \quad \text{حيث} \quad 0 \leq r < |a|$$

الإثبات : لتكن مجموعة الأعداد الصحيحة التالية : $S = \{x \geq 0 : x = b - ta; t \in \mathbb{Z}\}$

من الواضح أن هذه المجموعة غير خالية ومرتبطة فحسب مبدأ الترتيب الحسن يوجد فيها عنصر أصغر

نسميه r . ولتكن قيمة t الموافقة لهذا العنصر هي q وعندها يمكن أن نكتب :

$$r = b - qa \in S \Rightarrow r \geq 0$$

ولنثبت أن $r < |a|$

من أجل ذلك نفترض جدلاً أن $r \geq |a|$ أي $r - |a| \geq 0$

فإذا كانت a موجبة فإن $r - |a| = r - a = b - qa - a$

$$r - |a| = b - a(q + 1) \in S \quad \text{ومنه}$$

لأن $x = r - |a| \geq 0$ وهو من الشكل $x = b - ta$

وإذا كانت a سالبة فإن : $r - |a| = r + a = b - qa + a = b - a(q - 1) \in S$

ولكن $r - |a|$ عدد أصغر من r وينتمي إلى S وهذا تناقض لأن r هو العنصر الأصغر في S أي أن

الافتراض الجدلي خاطيء و $r < |a|$.

لنثبت الآن أن العددين r, q وحيدان .

من أجل ذلك نفترض جدلاً أن r_1, q_1 عدنان مختلفان عن r, q ويحققان العلاقة

$$b = q_1 a + r_1, \quad 0 \leq r_1 \leq |a|$$

$$b = qa + r, \quad 0 \leq r \leq |a| \quad \text{ولدينا}$$

$$q_1 a + r_1 = qa + r \Rightarrow (q - q_1)a = r_1 - r \quad \text{أي أن}$$

ومنه فإن العدد $r_1 - r$ مضاعف لـ a ولكن قيمته العددية أصغر من $|a|$ وهذا لا يصح إلا إذا كان

$$r_1 - r = 0 \quad \text{و} \quad r_1 = r \quad \text{وبالتالي فإن} \quad q_1 = q \quad \text{وهو المطلوب .}$$

أمثلة :

$2 = 7(0) + 2$	نجد	$a = 7, b = 2$	من أجل
$23 = 3(7) + 2$	نجد	$a = 3, b = 23$	"
$7 = (-3)(-2) + 1$	نجد	$a = -3, b = 7$	"
$-3 = (79)(-1) + 76$	نجد	$a = 79, b = -3$	"
$0 = (-6)(0) + 0$	نجد	$a = -6, b = 0$	"
$-2 = -7(1) + 5$	نجد	$a = -7, b = -2$	من أجل
$1 = (-7)0 + 1$	نجد	$a = -7, b = 1$	"
$56 = (-7)(-8) + 0$	نجد	$a = -7, b = 56$	"

4-1 تطبيق هام :

إن مربع أي عدد فردي يزيد بالعدد 1 عن مضاعف للعدد 8 أي إذا كان b عدداً صحيحاً فردياً فإن $b^2 = 8M + 1$.

الإثبات : إن باقي قسمة أي عدد فردي على العدد 2 يساوي الواحد لذا يمكن دوماً كتابة العلاقة

$$b = 2q + 1 \quad \text{وبتربيع الطرفين نجد :} \quad b^2 = 4q^2 + 4q + 1$$

$$b^2 = 4q(q + 1) + 1 \quad \text{ومنه}$$

ولما كان q و $q + 1$ عدداً متتاليين فإن أحدهما زوجي والآخر فردي فجداءهما عدد زوجي ومنه $b^2 = 8M + 1$.

تمرين (1) : أثبت أن $6|f(m) = 5m^3 + 7m$ حيث $m \in N$

الحل : نكتب $f(m) = m(5m^2 + 7)$ ولنثبت أن $6|f(m)$ بطريقة الاستقراء

الخطوة الأساسية :

$6|0 \rightarrow f(0) = 0$ والعلاقة صحيحة ، وكذلك $6|12 \rightarrow f(1) = 12$ والعلاقة صحيحة .

خطوة الاستقراء : لنفترض صحة العلاقة من أجل $m = k > 1$ ولنثبت صحتها من أجل $m = k + 1$

$$f(k) = 5k^3 + 7k, f(k + 1) = 5(k + 1)^3 + 7(k + 1) \quad \text{لذا نكتب :}$$

$$f(k + 1) - f(k) = 15k(k + 1) + 12 \quad \text{ولنحسب}$$

نلاحظ أن $6|12$ وأن $15 = 3(5)$ و $k(k + 1)$ عدد زوجي لأن أحد العددين المتتاليين عدد زوجي

أي $k(k + 1) = 2n$ ومنه

$$15k(k + 1) = 3(5)(2)n = 6(5)n \Rightarrow 6|15k(k + 1)$$

وحسب الخاصة (6) فإن 6 تقسم المجموع $15k(k + 1) + 12$

أي أن $6|[f(k + 1) - f(k)]$ وحسب الفرض $6|f(k)$ و منه نجد

$6|f(k + 1)$ وخطوة الاستقراء صحيحة أي أن $6|f(m)$ مهما تكن $m \geq 0$.

تمرين (2) : أثبت أن $14|5^{2n+1} + 3^{4n+2}$ حيث $n \geq 0$
 نسمي $f(n) = 5^{2n+1} + 3^{4n+2}$ ولنثبت صحة العلاقة $14|f(n)$ $n \geq 0$

بطريقة الاستقراء :

1- الخطوة الأساسية : نلاحظ أن $14|14$, $f(0) = 14$, والعلاقة صحيحة.

2- خطوة الاستقراء : إذا كانت $k > 0$ لنثبت أن $f(k) \Rightarrow f(k+1)$

لذا نحسب المقدار :

$$f(k+1) - 11f(k) = 5^{2k+3} + 3^{4k+6} - 11(5^{2k+1} + 3^{4k+2})$$

نصلح العلاقة الأخيرة فنجد :

$$f(k+1) - 11f(k) = 5^{2k}[125 - 11 \times 5] + 3^{4k}(3^6 - 11 \times 9)$$

$$= 5^{2k} \cdot 5(25 - 11) + 3^{4k+2}(3^4 - 11), 3^4 - 11 = 70 = 5 \times 14$$

$$f(k+1) - 11f(k) = 14[5^{2k+1} + (5)3^{4k+2}] \Rightarrow 14|[f(k+1) - 11f(k)]$$

$$14|11f(k) \Leftarrow 14|f(k) \quad \text{ولما كانت}$$

ينتج أن $14|f(k+1)$ وخطوة الاستقراء صحيحة أي أن : $14|f(n)$ عندما $n \geq 0$.

الفصل الثاني

القواسم المشتركة والمضاعفات المشتركة

1-2 القواسم المشتركة

1-2-1 تعريف : نقول إن العدد الصحيح d_1 هو قاسم مشترك للعددين الصحيحين a, b غير

الصفرين معاً إذا تحقق ما يلي : $d_1|b \wedge d_1|a$

مثلاً : $3|12, 3|30$

1-2-2 ملاحظات :

(1) يلاحظ أنه إذا كان d_1 قاسماً مشتركاً لـ a, b فإن $(-d_1)$ يكون قاسماً مشتركاً لهما أيضاً

(2) نعلم من خواص قابلية القسمة أن $|d_1| \leq |a|, |d_1| \leq |b|$ فإذا كان $a, b \neq 0$

فإن $|d_1|$ لا يتجاوز العدد الأصغر بين العددين $|a|$ و $|b|$

(3) إن مجموعة القواسم المشتركة الموجبة لعددين صحيحين غير صفرين a, b هي تقاطع مجموعة

القواسم الموجبة للعدد a مع مجموعة القواسم الموجبة للعدد b فهي مجموعة منتهية .

1-2-3 القاسم المشترك الأعظم :

تعريف: نقول إن d هو القاسم المشترك الأعظم للعددين الصحيحين a, b غير المعدومين معاً

ونكتب $d = (a, b)$ أو $d = g.c.d(a, b)$

إذا تحقق ما يلي : (1) $d > 0$

(2) $d|b \wedge d|a$

(3) إذا كان العدد الصحيح $c > 0$ و $c|b \wedge c|a$ فإن $c \leq d$.

على سبيل المثال :

$$(21, 15) = 3, (0, 6) = 6, (15, 28) = 1, (-3, -9) = 3$$

نتيجة : إن القاسم المشترك الأعظم لعددين a, b غير معدومين معاً دوماً موجود وهو وحيد

الإثبات : قلنا إن مجموعة القواسم المشتركة لعددين a, b غير معدومين معاً هي مجموعة منتهية

وعناصرها لا تتجاوز العدد الأصغر بين العددين $|a|, |b|$ فهي مجموعة محدودة من الأعلى فلها بالتالي

عنصر أكبر هو القاسم المشترك الأعظم للعددين a, b . وهذا القاسم وحيد إذ لو افترضنا جديلاً

أن d_1 و d_2 كل منهما قاسم مشترك أعظم فحسب الشرط (3) يمكن أن تكتب أن :

$$d_1 = d_2 \Leftrightarrow d_2 \leq d_1, d_1 \leq d_2 \text{ وهو المطلوب .}$$

ملاحظة : إن مجموعة القواسم المشتركة للعديدين المعدومين $a = 0, b = 0$ هي مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة، فهي مجموعة غير منتهية، وليس لها عنصر أكبر ولا يوجد قاسم مشترك أعظم لهما.

4-2-1 مبرهنة : إذا كان a, b عددين صحيحين غير معدومين فإن القاسم المشترك الأعظم لهما

$d = (a, b)$ هو تركيب خطي للعديدين a, b . أي يوجد دوماً عدنان صحيحان x_0, y_0 بحيث :

$$d = (a, b) = x_0a + y_0b$$

الإثبات : لنعرف مجموعة التراكيب الخطية لـ a, b كما يلي :

$$S = \{n = ax + by; x, y \in Z\}$$

إن المجموعة S غير خالية فهي تحوي :

$$n = \pm a \text{ عندما } x = \pm 1, y = 0$$

$n = \pm b$ عندما $x = 0, y = \pm 1$ أي أنها تحوي أعداداً موجبة وأعداداً سالبة.

لنعرف المجموعة الجزئية S_1 كما يلي : $S_1 = \{n > 0, n \in S\}$.

إن المجموعة S_1 غير خالية وضوحاً وحسب مبدأ الترتيب الحسن لها عنصر أصغر نسميه n_0 ونكتب

$$n_0 = x_0a + y_0b \text{ وحسب المبرهنة الأساسية في الحساب يمكن أن تكتب :}$$

$$n = n_0q + r; 0 \leq r < n_0 \quad (1)$$

$$\text{أي } ax + by = (ax_0 + by_0)q + r \Rightarrow r = a(x - x_0q) + b(y - y_0q)$$

ولما كان $r \geq 0$ وهو تركيب خطي لـ a, b فإن $r \in S$.

فإذا كان $r = 0$ فإن n_0 يقسم n .

وإذا كان $r > 0$ فإن $r \in S_1$ ولكن n_0 هو العنصر الأصغر في S_1

ولدينا من (1) وهذا تناقض إذ لا بد وأن تكون $r = 0$ و $n_0 | n$ أي أن n_0 تقسم جميع

عناصر S أي : $n_0 | a$ و $n_0 | b$ قاسم مشترك للعديدين a, b أي أن :

$$n_0 \leq d = (a, b)$$

ومن جهة أخرى فإن العلاقة $n_0 = x_0a + y_0b$ تدل على أن كل قاسم لـ a, b يجب أن يقسم n_0

أي أن d يقسم n_0 وبالتالي $d \leq n_0$ مما يثبت أن $d = n_0$ أي $d = x_0a + y_0b$.

ملاحظة (1) : يلاحظ مما سبق أن القاسم المشترك الأعظم لعديدين غير معدومين معاً هو العنصر

الأصغر في مجموعة التراكيب الخطية الموجبة للعديدين a, b .

ملاحظة (2) : إن تمثيل القاسم المشترك الأعظم لعديدين كتركيب خطي ليس وحيداً.

فعلى سبيل المثال إن : $d = (15,24) = 3$

$$3 = 15(-27) + 24(17) \quad \text{أو} \quad 3 = 15(-3) + 24(2) \quad \text{نكتب}$$

$$\dots\dots\dots \quad 3 = 15(5) + 24(-3) \quad \text{أو}$$

نتيجة : إذا كان $d = (a, b)$ وكان c قاسماً مشتركاً لـ a, b فإن $c|d$

الإثبات : حسب المبرهنة السابقة نكتب $d = x_0a + y_0b$

فإذا كان $c|a \wedge c|b$ فإن $c|d$

5-2-1 تعريف : إذا كان القاسم المشترك الأعظم لعددين صحيحين a, b يساوي الواحد فإننا

نسمي العددين عددين أوليين نسبياً (*relatively prime*)

مثال : نلاحظ أن $(32,15) = 1$ فالعددان 32,15 أوليان نسبياً (أوليان معاً)

6-2-1 مبرهنة : يكون العددان a, b غير الصفريين معاً أوليين نسبياً فيما بينهما إذا وفقط إذا وجد

عددان صحيحان x, y بحيث يكون : $ax + by = 1$

الإثبات : إذا كان $(a, b) = 1$ فحسب المبرهنة (4-2-1) نجد أن $1 = ax + by, x, y \in Z$

ومن ناحية أخرى إذا كان $ax + by = 1$ حيث $x, y \in Z$ وكان $(a, b) = d$

فإن $d|a \wedge d|b$ بالتالي $d|ax + by$ أي $d|1$ ومنه $d = 1$

نتيجة : إذا كان $d = (a, b)$ وكان $b = b_0d$ و $a = a_0d$ فإن $(a_0, b_0) = 1$.

الإثبات : بما أن $(a, b) = d$ فيمكن كتابة العلاقة $ax + by = d$ وبتقسيم طرفي العلاقة على d

$$\text{نجد:} \quad \frac{a}{d}x + \frac{b}{d}y = 1$$

وحسب المبرهنة (6-2-1) يكون $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = 1$ أي $(a_0, b_0) = 1$

7-2-1 بعض خواص القاسم المشترك الأعظم :

$$(1) \quad (|a|, |b|) = (a, b) = (-a, b) = (a, -b) = (-a, -b) \quad \text{وضوحاً}$$

$$(2) \quad (1, a) = (a, 1) = |a| \quad \text{وضوحاً}$$

$$(3) \quad (a, m) = 1 \wedge (b, m) = 1 \Rightarrow (ab, m) = 1$$

الإثبات : بما أن $(a, m) = 1$ يمكن إيجاد عددين صحيحين x, y بحيث $ax + my = 1$

نضرب طرفي العلاقة بـ b فنجد : $abx + mby = b$

لذا فإن أي قاسم d_1 لـ ab و m يجب أن يقسم b أي $d_1|b \Leftrightarrow d_1|m \wedge d_1|ab$

أصبح لدينا $d_1|(b, m)$ أي $d_1|1$ ومنه $d_1 = 1$.

(4) إذا كان $(k, b) = 1$ و $k|ab$ فإن $k|a$.

الإثبات : يمكن أن تكتب $1 = kx + by$ نضرب الطرفين بـ a فنجد : $a = ak.x + aby$

لما كان k قاسماً لـ ab وقاسماً لـ akx فهو يقسم مجموعهما a .

ملاحظة: إذا كان $k|ab$ و $(k, b) \neq 1$ فإن k قد لا تقسم أيّاً من a , b .

مثال : $4|2 \times 6 = 12$ في حين أن $4 \nmid 2$, $4 \nmid 6$.

(5) إذا كان $(a, b) = 1$ و $a|n$ و $b|n$ فإن $a.b|n$.

الإثبات : نكتب $n = an_0$ ولدينا $b|n$ أي $b|an_0$ ولكن $(a, b) = 1$ ومنه $b|n_0$

بالتالي يمكن أن نكتب $n_0 = bm$ أي $n = abm$ ومنه $ab|n$

(6) إذا كان m عدد صحيح موجب وكان $(a, b) = d$ فإن $D = (ma, mb) = md$.

الإثبات : بما أن $(a, b) = d$ نكتب $d = ax + by$ نضرب الطرفين بـ m

فنجد : $md = max + mby$ ولدينا $D|md$ ومنه نجد $D|mb \wedge D|ma$ *

ومن جهة أخرى يمكن أن نكتب $D = max_1 + mby_1$

ولدينا $d|(ax_1 + by_1) \Leftrightarrow d|a \wedge d|b$

ومنه $md|m(ax_1, by_1)$ و $md|D$ **

ومن * و ** نجد أن $md = D$.

تمهيدية : إذا كان $b = qa + r$, $0 \leq r < a$ فإن $(a, b) = (a, r)$

الإثبات : ليكن $(a, b) = d$ أي $d|a \wedge d|b$ ومنه $d|b - qa$ أي $d|r$

فهو قاسم مشترك لـ a, r . ليكن c قاسماً للعددين a, r من الواضح أن $c|qa + r$ أي

$c|b$, $c|a$, $c|d \Leftrightarrow c \leq d \Leftrightarrow d = (a, r)$.

خوارزمية اقليدس (Euclidean algorithm) :

هي وسيلة لإيجاد القاسم المشترك الأعظم لعددين صحيحين.

نعلم أن $(b, a) = (|a|, |b|)$ لذا نفترض أن $b \geq a > 0$ ونشرح الخوارزمية كما يلي :

نجري عمليات القسمة المتتالية : $b = q_1a + r_1$, $0 \leq r_1 < a$

فإذا كانت $r_1 = 0$ فإن $(b, a) = (a, 0) = a$

وإذا كان $r_1 \neq 0$ نتابع القسمة : $a = q_2r_1 + r_2$, $0 \leq r_2 < r_1$

فإذا كانت $r_2 = 0$ فإن $(a, b) = (a, r_1) = (r_1, 0) = r_1$

$$r_1 = q_3 r_2 + r_3 \quad \text{وإذا كان } r_2 \neq 0 \text{ نكتب :}$$

.....

ونتابع حتى نحصل على باقي صفري ونكتب

$$r_{t-1} = q_{t+1} r_t + 0$$

عندئذ يكون

$$(a, b) = (a, r_1) = (r_1, r_2) = \dots = (r_t, r_{t+1}) = (r_t, 0) = r_t$$

$$b > r_1 > r_2 > \dots > r_t > 0 \quad \text{حيث}$$

أي للبحث عن القاسم المشترك الأعظم لعددتين موجبتين نطبق خوارزمية القسمة بشكل متتال حتى نصل إلى باق صفري ويكون الباقي الأخير قبل الباقي الصفري هو القاسم المشترك الأعظم الذي نبحث عنه .

مثال : لنبحث عن القاسم المشترك الأعظم للعددتين (12378 , 3054)

$$12378 = 4.(3054) + 162$$

$$3054 = 18.(162) + 138$$

$$162 = 1.(138) + 24$$

$$138 = 5.(24) + 18$$

$$24 = 1.(18) + 6$$

$$18 = 3.(6) + 0$$

$$g c d (12378 , 3054) = 6 \quad \text{أي}$$

ملاحظة: يلاحظ من خوارزمية اقليدس أن البواقي المتتالية يمكن أن تكتب كتركيب خطي للعددتين a , b

حيث نجد :

$$r_1 = a - q_1 b$$

$$r_2 = b - r_1 q_2 = -q_2 a + (1 + q_1 q_2) b$$

$$r_3 = (1 + q_1 q_2) a - (q_1 + q_3 + q_1 q_2 q_3) b$$

.....

وبالتالي يمكن استخدام هذه الخوارزمية لتعيين أمثال التركيب الخطي للقاسم المشترك الأعظم لعددتين

وذلك بأن نبدأ من الخطوة الأخيرة في الخوارزمية ونوضح ذلك في المثال السابق فنكتب :

$$6 = 24 - 18$$

$$= 24 - (138 - (5).(24))$$

$$= (6).(24) - 138 = 6(162 - 138) - 138$$

$$= (6).(162) - (7).(138) = (6).(162) - 7(3054 - (18).162)$$

$$= 9132).(162) - (7).(3054)$$

$$= 132(12378 - (4).(3054)) - (7).(3054)$$

$$= 132(12378) + (-535)(3054)$$

$$6 = gcd (12378 , 3054) = x . 12378 + y . 3054 , x = 132 , y = -535 \text{ ومنه:}$$

ملاحظة (2) :

يمكن الاستفادة من خواص القاسم المشترك الأعظم بتبسيط خطوات خوارزمية اقليدس وعلى سبيل المثال يمكن أن نكتب :

$$gcd(12, 30) = 3 \times gcd(4, 10) = (3) \times (2) \times gcd(2, 5) = 6$$

8-2-1 القاسم المشترك الأعظم لمجموعة أعداد صحيحة

- تعريف : لتكن $a_i, i = 1, 2, 3, \dots, n$ أعداداً صحيحة ليست جميعها أصفاراً .

نقول إن d هو القاسم المشترك الأعظم لها ونكتب :

$$d = gcd(a_1, \dots, a_n) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

إذا فقط إذا كان : (1) $d > 0$

$$1 \leq i \leq n, d | a_i \quad (2)$$

(3) إذا كان $c > 0$ و $1 \leq i \leq n, c | a_i$ فإن $c \leq d$

مبرهنة : إذا كان $d = (a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n)$

$$d = d_1 \quad \text{و} \quad d_1 = (a_1, a_2, \dots, a_{n-2}, (a_{n-1}, a_n)) \quad \text{فإن} \quad d = d_1$$

الإثبات : من الفرض نلاحظ أن $d | a_i, i = 1, 2, \dots, n$ أي $d | (a_{n-1}, a_n)$

ومنه $d | d_1$ ومن جهة أخرى $d_1 | a_i, i = 1, 2, \dots, n-2$ و $d_1 | (a_{n-1}, a_n)$

أي $d_1 | a_n \wedge d_1 | a_{n-1}$ ومنه $d_1 | a_i, i = 1, 2, \dots, n$ ومنه $d = d_1 \Leftrightarrow d_1 | d$

مثال : لإيجاد $gcd(256, 112, 72)$ نكتب :

$$(256, 112, 72) = (256, (112, 72)) = (256, 8) = 8$$

تعريف : إذا كان القاسم المشترك الأعظم للأعداد غير الصفريّة معاً $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ يساوي الواحد نقول إن الأعداد a_i أولية نسبياً فيما بينها .

تعريف : إذا كان $(a_i, a_j) = 1, \forall i, j = \langle 1, n \rangle$ فإننا نقول إن

الأعداد $a_i, i = 1, 2, \dots, n$ أولية نسبياً متنى متنى .

نتيجة : إذا كانت الأعداد غير الصفريّة معاً $a_i, i = 1, 2, \dots, n$, أولية نسبياً متنى متنى فإنها أولية نسبياً والعكس غير صحيح .

مثال (1) : إن الأعداد 6, 14, 21 أولية نسبياً لأن : $(6, 14, 21) = 1$ ولكنها ليست أولية

نسبياً متنى متنى لأن : $(6, 21) = 3, (6, 14) = 2, (14, 21) = 7$

مثال (2) : إن الأعداد 6, 25, 77 أولية نسبياً متنى حيث وهي أولية نسبياً لأن :

$$(6, 25, 77) = (6, (25, 77)) = (6, 1) = 1$$

9-2-1 المضاعف المشترك الأصغر (least common multiple)

تعريف : لتكن a_i , $i = 1, \dots, n$ أعداد صحيحة غير صفرية نقول إن m مضاعف لهذه الأعداد إذا كان $a_i | m \quad \forall i = 1, \dots, n$.

ونقول إن L هو المضاعف المشترك الأصغر لها ونكتب $lcm(a_1, \dots, a_n) = L$ إذا فقط إذا كان :

$$(1) \quad L > 0$$

$$(2) \quad \forall i = 1, 2, \dots, n, \quad a_i | L$$

$$(3) \quad \text{إذا كان } m > 0 \text{ و } a_i | m \text{ فإن } L \leq m$$

في الحقيقة إذا كانت S مجموعة الأعداد الموجبة التي هي مضاعفات لكل من الأعداد غير الصفرية a_i فإن هذه المجموعة غير خالية وحسب مبدأ الترتيب الحسن فيها عنصر أصغر يسمى هذا العنصر المضاعف المشترك الأصغر للأعداد a_i .

$$\text{مثال : } l.c.m(9, 8) = 72, \quad l.c.m(6, 15) = 30$$

نتيجة : المضاعف المشترك الأصغر للأعداد غير الصفرية a_i يقسم أي مضاعف مشترك لها

الإثبات : ليكن $L = l.c.m(a_i)$ وليكن m مضاعف مشترك للأعداد a_i حسب خوارزمية القسمة

$$\text{نكتب : } m = qL + r \quad : 0 \leq r < L$$

$$\text{ومنه } r = m - qL \text{ ، لدينا } a_i | L, a_i | m \quad \forall i = 1, 2, \dots, n \text{ و منه نجد}$$

$a_i | r$ و $r < L$ وهذا تناقض لأن L هو العنصر الأصغر لمجموعة المضاعفات المشتركة الموجبة

$$\text{مما يدل على أن } r = 0 \text{ حصراً و } L | m$$

مبرهنة : إذا كان a, b عدنان صحيحان موجبان وكان $d = gcd(a, b)$

$$\text{و } L = l.c.m(a, b) \text{ فإن } L = \frac{a.b}{d}$$

الإثبات : بما أن $d = (a, b)$ فيمكن أن نكتب $a = a_0.d, b = b_0.d$

حيث $(a_0, b_0) = 1$ ومنه $a_0 b = b_0 a$ هو مضاعف مشترك للعددين

a, b ، ليكن m مضاعفاً مشتركاً لـ a, b فيمكن أن نكتب

$$m = a_1 a = a_1 a_0 d, b | m \Rightarrow b | a_1 a_0 d$$

ومنه

$$b_0 d | a_1 a_0 d \Rightarrow b_0 | a_1 a_0$$

ولما كان $(a_0, b_0) = 1$ فإن $b_0 | a_1$ $b_0 a | a_1 a = m \Leftarrow b_0 | a_1$

أي $L | m$ و $L \leq m$ ومنه L هو المضاعف المشترك الأصغر

نتيجة: إذا كان $\gcd(a, b) = 1$ فإن $L = a \cdot b$

مثال: المضاعف المشترك الأصغر للعددين 6, 21 هو $L = \frac{6 \cdot 21}{d}$

$$L = 42 \quad \text{ومنه} \quad d = (6, 21) = 3$$

تمارين

- 1- استخدم طريقة الاستقراء الرياضي لإثبات ما يلي :
- $$15|2^{4n} - 1n \geq 0, \quad 7|2^{3n} - 1n \geq 1$$
- $$8|3^{2n} + 7n \geq 0, \quad 8|3^{2n} + 7n \geq 1$$
- $$2304|7^{2n+2} - 48n - 49n \geq 0, \quad 3|2^n + (-1)^{n+1}n \geq 1$$

2- أثبت أنه إذا كان $3x + 2$ مضاعفاً للعدد 7 فإن

$$14|15x^2 - 11x + 14$$

$$49|24x^2 + 4x + 41$$

3- إذا كان $(a, b) = 1$ أوجد القيم الممكنة لكل من :

$$(a + b, a - b), (a + b, a^2 + b^2), (2a + b, a + 2b)$$

4- إذا كان $a \in Z$ فهل يقبل العدد $a^2 + 2$ القسمة على 4 أم لا ؟

5- هل العبارات التالية صحيحة أم خاطئة إن كانت صحيحة فأثبت صحتها وإن كانت خاطئة فأعط مثلاً يبين ذلك :

$$(1) \text{ إذا كان } a|b \text{ و } a^2|bc \Leftrightarrow a|c$$

$$(2) \text{ حيث } c \neq 0 \quad ac|bc \Leftrightarrow a|b$$

$$(3) \text{ إذا كان } a|b + c \text{ فإن إما } a|b \text{ أو } a|c$$

$$(4) \text{ إذا كان } a|b^2 + 1 \text{ فإن } a|b^4 + 1$$

$$(5) \text{ إذا كان } a^2|b^3 \text{ فإن } a|b$$

$$(6) \text{ إذا كان } a^2 \leq b^2 \wedge b^2|n \wedge a^2|n \quad a|b$$

6- عين القاسم المشترك الأعظم :

$$(227,659), \quad (143,227), \quad (306,657), \quad (272,1479)$$

$$(25,72,175,168), \quad (227,659,454), \quad (272,24,306)$$

7- أوجد قيمياً لـ x, y تحقق ما يلي : $g.c.d(56,72) = 56x + 72y$

$$g.c.d(119,272) = 119x + 272y$$

$$g.c.d(1769,2378) = 1769x + 2378y$$

$$8- \text{ أوجد } l.c.m(272, 1479) \quad l.c.m(143, 227)$$

9- أوجد أعداداً صحيحة x, y, z تحقق العلاقة :

$$g.c.d(198,288,512) = 198x + 288y + 512z$$

الفصل الثالث

الأعداد الأولية

1-3-1 الأعداد الأولية (Prime number)

1-3-1 تعريف: نقول إن العدد الصحيح p عدد أولي إذا تحقق ما يلي :

$$p > 1 \quad -1$$

$$p \text{ لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى } 1 \quad -2$$

ونسمي العدد الصحيح الموجب غير الأولي عدداً مؤلفاً (composite number)

- نتيجة : إذا كان n عدداً مؤلفاً فيمكن أن يكتب كما يلي $n = a \cdot b$

$$\text{حيث } 1 < b < n, 1 < a < n .$$

مثال : العدد 35 عدد مؤلف ويمكن أن يكتب $35 = 5 \times 7$

1-3-2 بعض خواص الأعداد الأولية :

(1) الأعداد الأولية هي أعداد أولية نسبياً متنى متنى .

(2) إذا كان العدد الأولي p يقسم العدد الصحيح n فإن $(p, n) = p$ فيما عدا ذلك

$$\text{فإن } (p, n) = 1 .$$

(3) إذا كان p عدداً أولياً وكان $p|ab$ فإن p يقسم أحدهما على الأقل أو بعبارة أخرى

$$\text{إذا كان } p \nmid a \text{ و } p|ab \text{ فإن } p|b .$$

(4) إذا كان $p|a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$ فإن p يقسم أحد الأعداد a_i على الأقل (تبرهن بطريقة الاستقراء) .

(5) إذا كانت $p, p_1, p_2, \dots, p_n$ أعداد أولية وكان $p|p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n$ فإن p يساوي أحد الأعداد

$$\text{الأولية } p_i .$$

الإثبات : بما أن p يقسم جداً الأعداد p_i فهو يقسم أحدهما على الأقل ولنقتض أن $p|p_k$ ولكن

$$p_k \text{ عدد أولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى الواحد فيجب أن يكون } p_k = p$$

المبرهنة الأساسية في الحساب (Fundamental Theorem of Arithmetic)

إن أي عدد صحيح $n > 1$ هو إما عدد أولي أو هو جداء عدد منته من الأعداد الأولية وهذا

التمثيل كجداء عوامل أولية تمثيل وحيد بغض النظر عن ترتيب الأوليات .

البرهان : لنستخدم طريقة الاستقراء الرياضي

الخطوة الأساسية : لدينا $n = 2$ هو عدد أولي ، $n = 3$ هو عدد أولي

$$n = 4 = 2 \times 2 , n = 5 \text{ عدد أولي} , n = 6 = 2 \times 3$$

خطوة الاستقراء : لنفترض أن المبرهنة صحيحة من أجل الأعداد حتى

$$\text{العدد } k \text{ ولنثبت صحتها من أجل } n = k + 1$$

- إن كان العدد $k + 1$ أولياً فقد تم البرهان .

وإن كان $k + 1$ عدداً مؤلفاً لأمكن كتابته على النحو : $a . b = k + 1$ حيث

$$1 < b < k + 1, \quad 1 < a < k + 1$$

ولما كان كلٌّ من a و b أصغر من $k + 1$ فهو يكتب كجداء عدد منته من العوامل الأولية أي أن $k + 1$ هو جداء عدد منته من العوامل الأولية والقضية صحيحة من أجل أي عدد صحيح $n > 1$. لنثبت الآن أن تمثيل العدد كجداء عوامل أولية هو تمثيل وحيد . ونستخدم أيضاً طريقة الاستقراء الرياضي في البرهان .

الخطوة الأساسية : نلاحظ أن $2 = 2$ ، $6 = 2 . 3$ ، والعلاقة صحيحة

خطوة الاستقراء : لنفترض صحة العلاقة من أجل $n = k$ ولنثبت صحتها من أجل $n = k + 1$

ولنفترض جديلاً أنه يمكن كتابة $k + 1$ كجداء عوامل أولية بشكلين مختلفين ونكتب

$$k + 1 = p_1 . p_2 p_s = q_1 . q_2 q_t$$

$$p_1 | q_1 . q_2 q_t$$

أي أن p_1 تساوي أحد الأعداد الأولية q_i وليكن $p_1 = q_j$. نغير ترتيب العوامل q_i بحيث

$$q_j = q_1 = p_1$$

$$k + 1 = p_1 (p_2 . p_3 p_s) = p_1 (q_2 . q_3 q_t)$$

$$n_1 < k + 1, \quad n_1 = p_2 . p_3 p_s = q_2 . q_3 q_t \quad \text{نلاحظ أن}$$

أي أن تمثيل n_1 كجداء عوامل أولية تمثيل وحيد مما يدل على أن $s = t$ وأن تمثيل $k + 1$ كجداء عوامل أولية هو أيضاً تمثيل وحيد .

ملاحظة : يمكن أن تكون بعض العوامل الأولية لعدد صحيح $n > 1$ متساوية فإذا جمعنا معاً العوامل المتساوية أمكننا كتابة العدد n كجداء عوامل أولية بالشكل القانوني كما يلي :

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} p_s^{\alpha_s}$$

حيث p_i عوامل أولية مختلفة مرتبة $p_1 < p_2 < < p_s$ و α_i أعداد صحيحة موجبة . وتدعى عملية إيجاد هذه العوامل عملية تحليل العدد الصحيح $n > 1$.

$$360 = 2^3 . 3^2 . 5 \quad \text{مثال :}$$

$$17640 = 2^3 . 3^2 . 5 . 7^2$$

نتيجة (1) : كل عدد صحيح $n > 1$ له عامل أولي أي يوجد $p | n$ (p عدد أولي)

نتيجة (2) : إذا كان $n > 1$ عدداً مؤلفاً فله عامل أولي p بحيث يكون $p \leq \sqrt{n}$.

الإثبات : بما أن n عدد مؤلف فيمكن أن تكتب $n = a . b$

$$n = a . b \geq a^2 \quad \text{ومنه} \quad 1 < a \leq b < n$$

أي أن $a \leq \sqrt{n}$ ولما كان $a > 1$ فله عامل أولي وليكن p

$$\text{أي} \quad p \leq \sqrt{n} \Leftrightarrow p \leq a, p | n \Leftrightarrow p | a \quad \text{وهو المطلوب.}$$

نتيجة (3) : إذا كان $n > 1$ وليس له عامل أولي $\sqrt{n} \geq$ فإن n عدد أولي .
الإثبات : ذلك أنه إذا لم يكن n أولياً كان عدداً مؤلفاً و إذا كان n عدداً مؤلفاً فله عامل أولي $\sqrt{n} \geq$
وهذا تناقض . أي إذا كان $n > 1$ فهو إما عدد أولي أو له عامل أولي $p \leq \sqrt{n}$.
- كم هو عدد الأعداد الأولية ؟

شغلت هذه المسألة أذهان علماء الرياضيات منذ القدم وقد وضعت براهين كثيرة تثبت أن عدد الأعداد الأولية غير منته ومن أقدم هذه البراهين وأبسطها البرهان الذي وضعه اقليدس وسنورد هذا البرهان فيما يلي :

لنفترض أن عدد الأوليات (الأعداد الأولية) منته ولنرتب هذه الأعداد كما يلي :

$$p_1 < p_2 < p_3 < \dots < p_n$$

$$N = p_1 p_2 p_3 \dots p_n + 1 \quad \text{ولنكتب}$$

من الواضح أن $N > 1$ فله عامل أولي وليكن p أي أن $p|N$

فإذا كان p يساوي أحد الأوليات p_i $i = 1, 2, \dots, n$ لوجدنا

$$p|1 \Leftrightarrow p|N - p_1 p_2 \dots p_n \Leftrightarrow p|N, p|p_1 p_2 \dots p_n$$

وهذا تناقض أي أن p عدد أولي مختلف عن الأوليات p_i وهكذا فإن عدد الأوليات غير منته

يلاحظ أن الأعداد ذات الصيغة $p_1 p_2 \dots p_k + 1$ تعطي

$N_5 = 2311$ ، $N_4 = 211$ ، $N_3 = 31$ ، $N_2 = 7$ ، $N_1 = 3$
 $N_6 = 59 \times 509$ عدد مؤلف وتسمى هذه الأعداد أعداد اقليدس .

- هل يوجد صيغة معينة تعطي جميع الأوليات ؟

سؤال آخر حير علماء الرياضيات ، فوضعوا صيغاً ظن بعضهم أنها تعطي جميع الأوليات ثم ثبت أن حدسهم خاطيء ، من هذه الصيغ

1- الصيغة $x^2 - x + 41$ وجد أنها تعطي أعداداً أولية من أجل

$$x = 0, 1, 2, \dots, 40$$

2- الصيغة $x^2 - 79x + 1601$ تعطي أعداداً أولية من أجل

$$x = 0, 1, 2, \dots, 79$$

ثم أثبت **غولدياخ (1752)** أنه لا يوجد أي حدودية صحيحة من أي درجة كانت تعطي أعداداً أولية من أجل جميع قيم x

و أثبت **دير خلية (1837)** أن الحدودية $ax + b$ حيث $(a, b) = 1$ تعطي عدداً غير منته من الأوليات عندما تأخذ x قيماً صحيحة موجبة .

3- وضع **فيرما (1601-1665)** الصيغة : $F_n = 2^{2^n} + 1$ وظن أنها تعطي

أوليات من أجل جميع قيم $n = 0, 1, 2, \dots$ وأثبت **اولر (1732)** أن

F_5 عدد مؤلف يقبل القسمة على 641 .

- كيف نعين الأعداد الأولية التي لا تتجاوز قيمة معينة N ؟

لما كان توزيع الأعداد الأولية غير منتظم وليس هناك صيغة رياضية تعطي فقط أعداداً أولية كان تعيين الأعداد الأولية عملية غير سهلة وخاصة إذا كان العدد N كبيراً ، ومن أبسط الطرق لتعيين الأعداد الأولية هي طريقة وضعها الرياضي اليوناني ايراتوستين تسمى مرشحة ايراتوستين (*The sieve of Eratosthenes*) في القرن الثالث قبل الميلاد وسنشرح هذه الطريقة فيما يلي :

تكتب جميع الأعداد من 1 إلى N ثم نبدأ بالعدد الأولي الأول وهو 2 يترك وتشطب جميع مضاعفاته ثم يترك أول عدد لم يتم شطبه وسيكون العدد 3 وتشطب جميع مضاعفات العدد 3 وهكذا ، وفي كل مرة يكون أول عدد لم يتم شطبه عدداً أولياً حتى تصل إلى العدد $p \leq \sqrt{N}$ وتكون الأعداد التي لم يتم شطبها هي الأعداد الأولية المطلوبة . وهذا تمثيل لمرشحة ايراتوستين من أجل $N = 101$:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101									

سنذكر أخيراً نص المبرهنة التي تحدد عدد الأعداد الأولية التي لا تتجاوز العدد الحقيقي الموجب x هذه المبرهنة التي كانت حدساً من قبل كل من ليجاندر و غاوس عام 1793 ولم يتم إثباتها بشكل كامل ومبسط حتى عام 1949 من قبل سيليرغ (*A. Selberg*) و ايردوس (*P. Erdos*)

مبرهنة الأعداد الأولية :

إذا كان $\pi(x)$ هو عدد الأعداد الأولية p التي تحقق العلاقة $2 \leq p \leq x$ حيث x عدد حقيقي موجب ، فإن نسبة $\pi(x)$ إلى الدالة $x / \log x$ تنتهي إلى اللانهاية .

1-3-3 التحليل إلى عوامل بطريقة فيرما :

لقد أثبتنا أن أي عدد صحيح $n > 1$ يمكن أن يحلل إلى عوامل أولية ولكن طريقة التحليل تصبح شاقة عندما تكون الأعداد كبيرة . وقد شرح فيرما برسالة إلى صديقه العالم الرياضي ميرس في 1643 طريقة لتحليل أي عدد فردي إلى جداء عددين فرديين ولما كان حذف قوى العدد 2 من أي عدد زوجي عمل سهل فإن لتحليل الأعداد الفردية أهمية كبرى وقبل شرح طريقة التحليل سنثبت التمهيدية التالية :

تمهيدية : إذا كان n عدداً صحيحاً فردياً موجباً فيمكن كتابة n كحاصل ضرب عددين صحيحين موجبين a و b إذا فقط إذا أمكن كتابة n كفرق بين مربعين .

البرهان : إذا كان $n = ab$ حيث a, b عددان صحيحان موجبان فرديان حتماً فيمكن كتابة العلاقة :

$$n = ab = \frac{(a+b)^2}{2} - \frac{(a-b)^2}{2}$$

وبالعكس إذا كان $n = x^2 - y^2$ فإن من الممكن كتابة n على النحو :

$$n = (x - y)(x + y) = a.b$$

طريقة فيرما لتحليل العدد الفردي n إلى جداء عاملين تكمن في البحث عن عددين x, y يحققان

$$x^2 - n = y^2 \quad \text{أو المعادلة} \quad x^2 - n = y^2$$

لذا نبدأ بالبحث عن أصغر عدد صحيح k يحقق العلاقة : $k^2 \geq n$ ثم نبحث بين الأعداد $k^2 - n, (k+1)^2 - n, \dots$ حتى نصل إلى قيمة m حيث $m \geq \sqrt{n}$ تجعل المقدار $m^2 - n$ مربعاً لعدد صحيح .

إن خطوات العمل من دون شك منتهية لأنه لا بد وأن نصل إلى الخطوة الأخيرة

$$\left(\frac{n+1}{2}\right)^2 - n = \left(\frac{n-1}{2}\right)^2$$

وعندها نجد $n = n \cdot 1$ مما يدل على أن n عدد أولي وذلك إذا لم نحصل على $m^2 - n$ مربعاً لعدد صحيح في خطوة سابقة.

لقد استخدم فيرما هذه الطريقة لتحليل العدد $n = 2027651281$ ووجد أن

$n = 46061 \times 440201$ بعد 11 خطوة فقط . وإذا قورنت هذه الطريقة بطريقة التحليل العادية

فإننا نجد أننا بحاجة لـ 2850 عملية قسمة على أعداد أولية متتالية لنحصل على العدد 44021 ..

كما نلاحظ هنا أننا لسنا بحاجة لمعرفة جميع الأعداد الأولية التي هي أصغر من $\sqrt{n}$ لإيجاد عوامل n الأولية .

مثال (1) : لتحليل العدد $n = 23449$ نجد أن $153^2 < n < 154^2$

لذا نكتب :

$$154^2 - 23449 = 267$$

$$155^2 - 23449 = 576 = 24^2$$

$$n = 23449 = (155 - 24)(155 + 24) = 131 \times 179$$

وهما عددان أوليان .

مثال (2) : لنحلل العدد $n = 315$ بطريقة فيرما

نلاحظ $17^2 < 315 < 18^2$ ونكتب

$$18^2 - n = 9 = 3^2$$

$$n = (18 - 3)(18 + 3) = 15 \times 21$$

ومنه

$$n = 315 = 3^2 \cdot 5 \cdot 7$$

ونحلل كلاً من 15 و 21 فنجد

مثال (3) : لنحلل العدد $n = 119143$
نلاحظ أن $345^2 < 119143 < 346^2$

ونكتب :

$$346^2 - 119143 = 573 = 119716 - n$$

$$347^2 - n = 1266 = 120409 - n$$

$$348^2 - n = 1961 = 121104 - n$$

$$349^2 - n = 2658 = 121801 - n$$

$$350^2 - n = 3357 = 122500 - n$$

$$351^2 - n = 4058 = 123201 - n$$

$$352^2 - n = 4761 = 69^2 = 123904 - n$$

$$n = (352 - 69)(352 + 69) = 283 \times 421 \quad \text{ومنه}$$

وكلاهما عددان أوليان واحتجنا لسبع خطوات فقط .

تمارين

- 1- أثبت أن العدد الأولي الوحيد من الصيغة $n^3 - 1$ هو 7 .
- 2- أثبت أن الأولي الوحيد p الذي يحقق العلاقة $3p + 1 = n^2$ هو $p = 5$.
- 3- لدينا p عدد أولي و $p|a^n$ أثبت أن $p^n|a^n$ وأن $p|a$.
- 4- إذا كان p عدداً أولياً فردياً و $p \neq 5$ أثبت أنه إما $p^2 - 1$ أو $p^2 + 1$ يقبل القسمة على 10 .
- 5- أوجد جميع الأعداد الأولية التي هي ≥ 30 .
- 6- أوجد جميع الأعداد الأولية في المجال 150 , 250 .
- 7- إذا كان p عدداً أولياً و $p \geq 5$ أثبت أن $p^2 + 2$ عدد مؤلف .
- 8- أثبت أنه إذا كان $n > 0$ فإن $2^{4n+2} + 1$ عدد مؤلف .
- 9- حل الأعداد التالية إلى عواملها الأولية بطريقة فيرما :
31623, 10541, 493, 2931, 977, 945, 430663, 2279, 38025, 81518057
- 10- استخدم طريقة فيرما لتحليل العدد $2^{11} - 1$

الفصل الرابع معادلات ديوفانتس

1-4 معادلات ديوفانتس *Diophantus Equations*

1-4-1 تمهيد : هي المعادلات التي سماها العرب المعادلات السيالة أي له عدد لانتهائي من الحلول وهي معادلات بعدة متحولات تخرج بصوابات كثيرة . تنسب هذه المعادلات إلى العالم اليوناني ديوفانتس الذي عاش في حوالي 250 بعد الميلاد في الإسكندرية . وكان أثر المصريين والبابليين و الصومريون بارزاً جداً في أعماله . لم يضع ديوفانتس حلاً عاماً لهذه المعادلات بل كان يحل كل مسألة حلاً مستقلاً لا يستند إلى قاعدة عامة ، ويوجد الحلول الصحيحة لها .

سنقتصر في هذا الفصل على دراسة معادلات ديوفانتس الخطية بمجهولين ومعادلات ديوفانتس من الدرجة الثانية التي تعين ثلاثيات فيثاغورث .

1-4-2 معادلات ديوفانتس الخطية بمجهولين :

نكتب هذه المعادلات على النحو : $ax + by = n$ حيث $a, b, n \in Z$ ونبحث عن الحلول

الصحيحة لهذه المعادلات أي عن القيم الصحيحة للمتحولين x, y التي تحقق هذه المعادلات نلاحظ أولاً أنه قد يكون لمعادلة خطية من هذا النوع أكثر من حل وعلى سبيل المثال نلاحظ أن الثنائيات $(14,1), (-6,6), (10,-2)$ تحقق المعادلة $3x + 6y = 18$

وقد لا يكون لمثل هذه المعادلات أي حل ، فعلى سبيل المثال المعادلة

$2x + 10y = 17$ ليس لها أي حل لأن الطرف الأول من المعادلة عدد زوجي والطرف الثاني عدد

فردى ولا يمكن تحقيق المساواة بين الطرفين مهما تكن قيم x و y .

1-4-3 مبرهنة : إذا كان لدينا المعادلة (1) $ax + by = c$ حيث $a, b, c \in Z$ و

a, b غير صفرين معاً فإنه يكون لهذه المعادلة حل إذا وفقط إذا كان d القاسم المشترك الأعظم للعددين a, b يقسم الطرف الثاني c . وإذا كان (x_0, y_0) حلاً خاصاً لهذه المعادلة فإن جميع الحلول تعطى بالعلاقات :

$$\begin{aligned}x &= x_0 + \frac{b}{a}t \\y &= y_0 - \frac{a}{d}t\end{aligned}$$

حيث t عدد صحيح ما .

البرهان : تعلم أنه إذا كان $d = (a, b)$ فيمكن إيجاد عددين صحيحين r, s بحيث يكون:
 $b = sd, a = rd, (r, s) = 1$. فإذا وجد للمعادلة (1) حل وليكن x_0, y_0 فإن :
 $ax_0 + by_0 = c = rdx_0 + sdy_0 = d(rx_0 + sy_0)$
أي أن $d|c$.

ومن جهة ثانية إذا كان $d|c$ فيمكن أن نكتب $t \neq 0, c = td$
ولما كان $d = (a, b)$ فيوجد عددين صحيحين m, n بحيث $d = am + bn$ وبضرب طرفي هذه
العلاقة بـ t نجد : $td = a(tm) + b(tn) = c$

أي يوجد عدداً $x_0 = tm, y_0 = tn$ يحققان المعادلة : $ax + by = c$ لنثبت الآن أنه إذا عرفنا
الحل الخاص x_0, y_0 للمعادلة (1) فإن أي حل (x, y) لها يكتب على النحو :

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{d}\right)t, y = y_0 - \left(\frac{a}{d}\right)t$$

$$ax_0 + by_0 = c = ax + by \quad \text{لذا تكتب}$$

$$a(x - x_0) = b(y - y_0) \quad (2)$$

ولما كان $d = (a, b)$ فإن $d = a_0d, b = b_0d, (a_0, b_0) = 1$ نعوض في (2) فنجد :

$$a_0(x - x_0) = b_0(y_0 - y) \quad (3)$$

ومنه $a_0|b_0(y_0 - y)$ ولكن

$$a_0|(y_0 - y) \Leftrightarrow (a_0, b_0) = 1$$

$$y_0 - y = a_0t, t \in \mathbb{Z} \quad \text{أي}$$

$$y = y_0 - a_0t = y_0 - \frac{a}{d}t \quad \text{أو}$$

وبالتعويض في (3) نجد :

$$a_0(x - x_0) = b_0a_0t \Rightarrow x - x_0 = b_0t$$

$$x = x_0 + b_0t = x_0 + \frac{b}{d}t$$

وهو المطلوب ،

وللمعادلة عدد غير منته من الحلول .

ملاحظة (1) : إذا كان $d = 1$ فإن $x = x_0 + bt, y = y_0 - at$

هي جميع حلول المعادلة (والمعادلة لها حل دوماً) .

ملاحظة (2) : إن المبرهنة السابقة مع خوارزمية اقليدس تزودنا بطريقة عملية لإيجاد حلول معادلة

ديوفانتس الخطية (1) ومن أجل ذلك نبدأ بتعيين القاسم المشترك الأعظم للعددين a, b ثم كتابة هذا

القاسم المشترك الأعظم كتركيب خطي لهما ومن ثم نعين حلول المعادلة (1) .

مثال (1) : لنوجد جميع حلول المعادلة $172x + 20y = 1000$ إن وجدت
لنثبت أولاً أن للمعادلة حل فنبدأ بتعيين القاسم المشترك الأعظم للعددين (20 , 172) ، نطبق
من أجل ذلك خوارزمية اقليدس فنجد :

$$172 = 8 \times 20 + 12$$

$$20 = 1 \times 12 + 8$$

$$12 = 1 \times 8 + 4$$

$$8 = 2 \times 4 + 0 \Rightarrow 4 = (172, 20)$$

تلاحظ أن $4 \mid 1000$ فللمعادلة حل ، لإيجاد الحل نكتب :

$$4 = 12 - 8 = 12 - (20 - 12)$$

$$= 2 \times 12 - 20 = 2(172 - 8 \times 20) - 20$$

$$4 = 2(172) + (-17)20$$

$$1000 = 4 \times 250 = 250[2 \times 172 + (-17)20] \quad \text{ومنه}$$

$$= (500) \times 172 + (-4250) \times 20$$

$$y_0 = -4250, x_0 = 500 \quad \text{أي}$$

والحل الكامل للمعادلة :

$$x = 500 + \frac{20}{4}t = 500 + 5t$$

$$y = -4250 - \frac{172}{4}t = -4250 - 43t$$

ملاحظة : قد يطلب منا تعيين الحلول الموجبة لمعادلة ما . من أجل ذلك نعين قيم t التي

تحقق الشرط $x > 0$ ، $y > 0$ في المثال السابق نكتب :

$$5t + 500 > 0$$

$$-43t - 4250 > 0$$

$$-98 \frac{36}{43} > t > -100$$

ومنه

ولما كان t عدد صحيح فإن $t = -99$ ويكون الحل الوحيد الموجب للمعادلة السابقة هو :

$$x = 5, \quad y = 7$$

مثال (2) : لنوجد حلول المعادلة $6x + 51y = 22$ إن وجدت

نلاحظ أنّ : $(6, 51) = 3$ ولكن $3 \nmid 22$ وليس للمعادلة أي حل .

مثال (3) : لنوجد حلول المعادلة : $7x + 9y = 5$ إن وجدت

نلاحظ أنّ $d = (7, 9) = 1$ وللمعادلة حل

$$9 = 1 \times 7 + 2 \quad \text{نكتب :}$$

$$7 = 3 \times 2 + 1$$

$$2 = 1 \times 2 + 0$$

$$d = 1 = 7 - (2 \times 3) = 7 - (9 - 7) \times 3 = 7(4) + 9(-3)$$

نضرب الطرفين بـ 5 :

$$5 = 7(20) + 9(-15) \Rightarrow x_0 = 20, y_0 = -15$$

$$x = 20 + 9t, \quad y = -15 - 7t \quad \text{والحل الكامل}$$

1-4-3 ثلاثيات فيثاغورث (Pythagorean triple)

اكتشف البابليون (حوالي 2000 ق.م) العلاقة التي تربط بين أضلاع المثلث القائم أي العلاقة

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad \text{وعينوا أطوال أضلاع عدد من هذه المثلثات منها}$$

$$(4961, 6480, 8161), (169, 120, 119)$$

ولم يعثر على برهان ذلك ولا على شرح لطريقة الوصول إلى هذه الأرقام الكبيرة . وقد قدم برهان لوجود

حلول صحيحة للمعادلة $x^2 + y^2 = z^2$ الرياضي اليوناني فيثاغورث حوالي 500 ق.م وهذه

المعادلة هي صنف من المعادلات ديوفانتس التربيعية . وتسمى الأعداد الصحيحة (x, y, z) التي

تحقق هذه المعادلة ثلاثيات فيثاغورث ولنبحث في إيجاد حلول هذه المعادلة .

تعريف : الثلاثي x, y, z الذي يحقق معادلة فيثاغورث ويحقق العلاقة $(x, y, z) = 1$ يدعى

ثلاثي فيثاغورث الأولي .

مثال $(3, 4, 5)$ هو ثلاثي فيثاغورث أولي وكذا الثلاثي $(5, 12, 13)$. في حين الثلاثي

$(6, 8, 10)$ هو ثلاثي فيثاغورث غير أولي .

تمهيدية (1) : لنفترض أن (x, y, z) ثلاثي فيثاغورث أولي أي $(x, y, z) = 1$ ولنثبت أن

الأعداد x, y, z هي أولية نسبياً متنى متنى .

البرهان : إذا كان $(x, y) = d > 1$ فإنه يوجد عدد أولي مثل $p|d$ ولما

$$\text{كان } d|x \wedge d|y \text{ ينتج أن } p|x \wedge p|y$$

$$\text{ومنه } p|x^2 \wedge p|y^2 \text{ ومنه } p|x^2 + y^2 = z^2 \text{ وهذا يقتضي :}$$

$$p|z^2 \text{ وهذا يناقض كون } (x, y, z) = 1 \text{ أي أن : } (x, y) = 1 \text{ وبالطريقة ذاتها نثبت أن :}$$

$$(x, z) = (z, y) = 1$$

تمهيدية (2) : إذا كان (x, y, z) ثلاثي فيثاغورث وكان $(x, y, z) = d$

فإن (x_0, y_0, z_0) هو ثلاثي فيثاغورث أولي حيث $x = x_0d, y = y_0d, z = z_0d$

الإثبات : لما كان $d|x, d|y, d|z$ يمكن إيجاد x_0, y_0, z_0 بحيث

$$x = x_0d, y = y_0d, z = z_0d \text{ ولما كان } d \neq 0 \text{ و } x^2 + y^2 = z^2 \text{ فإن}$$

$$(x_0^2 + y_0^2)d^2 = z_0^2d \Rightarrow x_0^2 + y_0^2 = z_0^2$$

و $(x_0, y_0, z_0) = 1$ هو ثلاثي فيثاغورث ولنثبت

لذلك نكتب :

$$(x_0d, y_0d, z_0d) = ((x_0d, y_0d), z_0d) = (d(x_0, y_0), z_0d)$$

ومنه :

$$(x, y, z) = d(x_0, y_0, z_0) \Rightarrow (x_0, y_0, z_0) = 1 = d$$

ملاحظة : إذا كان ثلاثي فيثاغورث (x_0, y_0, z_0) أولياً وإذا كان k عدداً صحيحاً أكبر من الصفر فإن (kx_0, ky_0, kz_0) هو ثلاثي فيثاغورث.

ينتج مما سبق أنه لإيجاد جميع ثلاثيات فيثاغورث يكفي البحث عن ثلاثيات فيثاغورث الأولية .

تمهيدية (3): إذا كان ثلاثي فيثاغورث (x, y, z) أولياً فإن العددين x, y أحدهما فردي والآخر زوجي .

البرهان : لقد أثبتنا أن $(x, y) = 1$ مما يدل على أن x, y لا يمكن أن

يكونا زوجيين معاً ، لنفترض جدلاً أنهما فرديان ، عندها يمكن أن نكتب

$$x^2 = 8M_1 + 1, y^2 = 8M_2 + 1 \text{ وبالتالي } z^2 = x^2 + y^2 = 8M + 2 \text{ وهذا غير ممكن}$$

لأنه لو كان z عدداً فردياً لكان $z^2 = 8n + 1$ ولو كان z عدداً زوجياً لكان $z^2 = 4n^2$.

تمهيدية (4) : إذا كان $a.b = c^n$ حيث $(a, b) = 1$ فإنه يوجد b_1, a_1

$$\text{بحيث } b = b_1^n, a = a_1^n$$

البرهان : لنفترض أن $a > 1, b > 1$ ونحلل كلاً منها إلى عوامله الأولية فنكتب

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_{k_1}^{\alpha_{k_1}}, b = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \dots q_{k_2}^{\beta_{k_2}}$$

ولما كان a, b أوليان نسبياً فإن جميع الأوليات $p_i^{\alpha_i}, q_j^{\beta_j}$ مختلفة (فهي أولية نسبياً متنى فيما بينها

) وبالتالي فإن تحليل $a.b$ إلى عوامله الأولية يكتب على النحو :

$$a.b = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_{k_1}^{\alpha_{k_1}} q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \dots q_{k_2}^{\beta_{k_2}}$$

ومن جهة ثانية لنحلل العدد c إلى عوامله الأولية فنكتب

$$c = u_1^{\gamma_1} u_2^{\gamma_2} \dots u_t^{\gamma_t}$$

$$c^n = u_1^{n\gamma_1} u_2^{n\gamma_2} \dots u_t^{n\gamma_t}$$

فيكون

ولما كان $a.b = c^n$ ولما كان التحليل إلى العوامل يتم بشكل وحيد فقط فإن المساواة

$$p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_{k_1}^{\alpha_{k_1}} q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \dots q_{k_2}^{\beta_{k_2}} = u_1^{n\gamma_1} u_2^{n\gamma_2} \dots u_t^{n\gamma_t}$$

تدل على أن كل عامل $u_k^{n\gamma_k}$ يقابل عاملاً واحداً فقط من الطرف الثاني مما يعني أن $k_1 + k_2 = t$

(عدد العوامل المختلفة في الطرف الأول يساوي عدد العوامل المختلفة في الطرف الثاني) وقوة أي

عامل أي β_j أو α_i تساوي $n\gamma_k$ أي يمكن كتابة المقدار $a.b$ بعد إعادة ترتيب العوامل على النحو

$$a.b = p_1^{ny_1} \dots p_{k_1}^{ny_{k_1}} q_1^{ny_{k_1+1}} \dots q_{k_2}^{ny_t} = a_1^n . b_1^n$$

$$a_1 = p_1^{y_1} \dots p_{k_1}^{y_{k_1}}, b_1 = q_1^{y_{k_1+1}} \dots q_{k_2}^{y_t} \text{ و } k_1 + k_2 = t \text{ حيث}$$

مبرهنة : إن جميع الحلول الصحيحة غير الصفرية لمعادلة فيثاغورث $x^2 + y^2 = z^2$

حيث y عدد زوجي و $(x, y, z) = 1$ تعطى بالعلاقات

$$x = (r^2 - s^2), \quad y = 2rs, \quad z = (r^2 + s^2)$$

حيث s, r أعداد صحيحة غير صفرية و $(s, r) = 1$, s, r أحدهما فردي والآخر زوجي .

البرهان : بما أن y عدد زوجي فإن x عدد فردي وبالتالي z عدد فردي .

$$y = 2y_1 \text{ لنكتب}$$

$$y^2 = 4y_1^2 = z^2 - x^2 \text{ ومن معادلة فيثاغورث نكتب}$$

$$y_1^2 = \frac{z+x}{2} \cdot \frac{z-x}{2} \text{ أي}$$

إن $\frac{z+x}{2}, \frac{z-x}{2}$ أوليان نسبياً إذ لو فرضنا أن

$$\left(\frac{z+x}{2}, \frac{z-x}{2}\right) = d > 1$$

فإن d سيقسم مجموعهما وفرقهما أي يقسم z, x وهذا غير ممكن لأن $(x, z) = 1$ فإذا افترضنا أن

x, y, z غير سالبة ولاحظنا أن جداء العددين الصحيحين $\frac{z+x}{2}, \frac{z-x}{2}$ يساوي y_1^2 وطبقنا التمهيدية

(4) أمكننا أن نكتب :

$$\frac{z+x}{2} = r^2, \frac{z-x}{2} = s^2$$

ومنه نجد أن :

$$x = r^2 - s^2, y = 2y_1 = 2rs, z = r^2 + s^2$$

وأخيراً ولما كان كل من z, x فردياً فإن s, r الأوليان نسبياً أحدهما فردي والآخر زوجي حتماً .

أي أمكن إيجاد ثلاثي فيثاغورث أولي بين الأعداد الصحيحة غير السالبة يحقق معادلة فيثاغورث بشرط

$r^2 > s^2$ ومن جهة ثانية إذا عوضنا قيم x, y, z في المعادلة (1) نجد :

$$x^2 + y^2 = (r^2 - s^2)^2 + 4r^2s^2 = (r^2 + s^2)^2 = z^2$$

أي أنها محققة من أجل جميع الأعداد الصحيحة s, r

وأخيراً إذا ضربنا قيم x, y, z بالعدد الصحيح $k \neq 0$ فإننا نحصل على جميع ثلاثيات فيثاغورث وهو

المطلوب .

مثال (1) : لنوجد جميع ثلاثيات فيثاغورث الأولية علماً أن $x = 15$

$$\text{الحل: لدينا } x = r^2 - s^2 = 15 \text{ أي } (r - s)(r + s) = 15$$

وقيم r, s الممكنة التي تحقق الطلب هي التي تحقق ما يلي :

$$r + s = 5 \text{ و } r - s = 3 \text{ أو } r - s = 1 \text{ و } r + s = 15$$

بجمل المجموعتين نجد :

$$s = 1 \text{ و } r = 4 \text{ أو } s = 7 \text{ و } r = 8$$

وثلاثيات فيثاغورث المطلوبة هي : (15 , 8 , 17) و (15 , 112 , 113)

مثال (2): أثبت أنه إذا كان (x, y, z) ثلاثي فيثاغورث أولي فإن أحد الأعداد x, y, z يقبل القسمة على 3 .

الحل: بما أن الأعداد x, y, z هي ثلاثي فيثاغورث أولي فيمكن أن نكتب

$$x = r^2 - s^2, \quad y = 2rs, \quad z = r^2 + s^2$$

حيث r, s عدنان أوليان نسبياً أحدهما زوجي والثاني فردي فإننا نلاحظ أنه إذا كان $3|y$ تم المطلوب وإذا كان $3 \nmid y$ فإن 3 لا تقسم أيّاً من r أو s أي يمكن أن نكتب حسب خوارزمية القسمة :

$$r = 3q + 2 \text{ أو } r = 3q + 1$$

$$\text{و } s = 3q_1 + 2 \text{ أو } s = 3q_1 + 1$$

ومنه فإن :

$$3|x \text{ و } x = r^2 - s^2 = (9q^2 + 12q + 4) - (9q_1^2 + 6q_1 + 1) = 3M + 3$$

$$\text{أو } 3|x \text{ و } x = r^2 - s^2 = (9q^2 + 6q + 6) - (9q_1^2 + 6q_1 + 1) = 3M$$

مثال (3): أثبت أن نصف قطر الدائرة الماسة داخلاً لأضلاع مثلث فيثاغورث هو عدد صحيح دوماً .

الحل: ليكن R نصف قطر الدائرة ، x, y, z طولاً الضلعين القائمين في المثلث و z طول الوتر . نحسب مساحة المثلث بطريقتين ونكتب :

$$S = \frac{1}{2}xy = \frac{1}{2}R(x + y + z) \quad (1)$$

نعوض قيم x, y, z التالية :

$$x = k(r^2 - s^2), y = 2krs, z = k(r^2 + s^2)$$

في العلاقة (1) ثم نحسب R فنجد :

$$R = \frac{xy}{x+y+z} = \frac{2k^2rs(r^2-s^2)}{2kz^2+2krs} = \frac{krs(r^2-s^2)}{r^2+rs}$$

$$R = \frac{krs(r-s)(r+s)}{r(r+s)} = ks(r-s)$$

وهو عدد صحيح دوماً .

تمارين

(1) أوجد حلول المعادلات :

$$56x + 72y = 40$$

$$24x + 138y = 18$$

$$221x + 91y = 117$$

$$84x - 438y = 165$$

(2) أوجد الحلول الموجبة للمعادلات

$$30x + 17y = 300$$

$$158x - 57y = 7$$

$$54x + 21y = 906$$

$$123x + 360y = 99$$

(3) أوجد الحل الكامل للمعادلات

$$2x + 11y = 5$$

$$18x - 21y = 15$$

$$2x + 12y = 6$$

(4) أوجد جميع ثلاثيات فيثاغورث التي فيها $y = 28$.

(5) أثبت أنه إذا كان (x, y, z) ثلاثي فيثاغورث أولي فإن $12|x.y.z$

(6) أوجد جميع الحلول الأولية الموجبة للمعادلة $x^2 + y^2 = z^2$ إذا كان y عدد زوجي و $0 < z < 90$.

(7) أوجد دستور لتعيين ثلاثيات فيثاغورث الأولية التي تحقق ما يلي : y عدد زوجي و :

$$z - y = 1 \quad \text{أو} \quad z - x = 1 \quad (a)$$

$$z - y = 2 \quad \text{أو} \quad z - x = 2 \quad (b)$$

$$\text{حيث } p \text{ عدد أولي فردي} \quad z - x = p \quad (c)$$

(8) أوجد ثلاثيات فيثاغورث الأولية في الحالات :

$$x = 21 \quad (b) \quad y = 24 \quad (a)$$

$$y = 16 \quad (d) \quad z = 125 \quad (c)$$

الباب الثاني

الفصل الأول : التطابقات

الفصل الثاني : التطابقات الخطية

الفصل الثالث : التطابقات العددية وبعض الدوال الخاصة

الفصل الرابع : المراتب الجذور الأولية والأدلة

محاضرات د. د. يحيى

الفصل الأول

التطابقات

1-2 التطابقات (Congruence)

إن أول من تعرض لفكرة التطابق ووضع رمزها هو الرياضي الألماني فريدريك غاوس (*F. gauss*) (1855 - 1771 م) في كتاب الحساب .

وكان يقول : الرياضيات ملكة العلوم ونظرية الأعداد ملكة الرياضيات .

1-1-2 تعريف التطابق : ليكن $M, a, b \in Z$ و $m \in Z^+$ نقول إن العدد a يطابق العدد b

بالمقاس m ونكتب $a \equiv b \pmod{m}$ إذا كان $m|a - b$ أو $a - b = M.m$.

أما إذا كان $m \nmid a - b$ فإننا نقول إن a لا يطابق b بالمقاس m ونكتب $a \not\equiv b \pmod{m}$.

2-1-2 صفوف البواقي :

رأينا أنه إذا كان m عدداً صحيحاً أكبر من الواحد و $n \in Z$ فإنه يوجد عدنان وحيدان q, r بحيث يكون $n = mq + r, 0 \leq r < m$ إن الباقي r يمكن أن يأخذ أيًا من القيم $r_i = 0, 1, 2, \dots, m - 1$ لنضع جميع الأعداد الصحيحة التي باقي قسمها على m يساوي أحد الأعداد r_i في صف واحد نسميه صف الباقي r_i ، فنحصل بالتالي على m من هذه الصفوف ، ونلاحظ أنه إذا كان الفرق بين عددين صحيحين مضاعفاً لـ m فإنهما يقعان في صف واحد وأن الفرق بين أي عددين من صف واحد هو مضاعف لـ m . نسمي هذه الصفوف صفوف البواقي للعدد m .

مثال : ليكن $m = 6$ إن مجموعة بواقي القسمة على العدد 6 هي

$$\{r = 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

وصف الباقي $r = 0$ يحوي العناصر

$$\{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, 18, \dots\}$$

وصف الباقي $r = 1$ هو :

$$\{\dots, -11, -5, 1, 7, 13, 19, \dots\}$$

وهكذا ...

ونلاحظ أن كل عدد صحيح يمكن أن ينتمي إلى باقي واحد فقط من هذه الصفوف .

فالعدد 31 مثلاً ينتمي إلى صف الباقي ($r = 1$) .

والعدد -500 ينتمي إلى صف الباقي $r = 4$ لأن $-500 = 6(-84) + 4$.

2-1-3 مجموعة البواقي التامة :

تعريف: نسمي مجموعة الأعداد الصحيحة A التي عدد عناصرها يساوي

m والتي ينتمي كل عنصر منها إلى صف واحد فقط من صفوف بواقي العدد m مجموعة البواقي التامة بالمقاس m ، فالمجموعة $A = \{0,1,2,3,4\}$ هي مجموعة بواقي تامة بالمقاس 5 وكذا المجموعة $A_1 = \{0,6,-8,8,4\}$ حيث نلاحظ أن الصفر ينتمي إلى مجموعة البواقي $r = 0$ و 6 إلى مجموعة البواقي $r = 1$ و -8 إلى مجموعة البواقي $r = 2$ و 8 إلى مجموعة البواقي $r = 3$ و 4 إلى مجموعة البواقي $r = 4$.

ويلاحظ أن مجموعة البواقي التامة بالمقاس m التي عناصرها $\{0,1,2,\dots,m-1\}$ هي أبسط مجموعات البواقي التامة بالمقاس m ويطلق عليها أحياناً مجموعة البواقي التامة الصغرى .

نتيجة : من تعريف التطابق ينتج أنه إذا كان $a \equiv b \pmod{m}$ فهذا يعني أن a, b ينتميان إلى صف واحد من صفوف البواقي بالمقاس m في حين $a \not\equiv b \pmod{m}$ تعني أن a, b ينتميان إلى صفين مختلفين من صفوف بواقي m .

نتيجة : إن أي عدد صحيح n يطابق باقي قسمته على العدد m لأن :

$$n = mq + r \Rightarrow n - r = mq \Rightarrow m|n - r \Rightarrow n \equiv r \pmod{m}$$

2-1-4 خواص التطابقات :

نفترض الأعداد $a_i, b_i, c, d, \dots \in \mathbb{Z}$ و $m \in \mathbb{Z}^+$

(1) إن علاقة التطابق هي علاقة تكافؤ على مجموعة الأعداد الصحيحة .

البرهان :

- إذا كان $a, b, c \in \mathbb{Z}$ و $m \in \mathbb{Z}^+$ فإن $a \equiv a \pmod{m}$ لأن $m|a - a$.

- و $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$ لأنه إذا كان $m|a - b \Rightarrow m|b - a$

- و $a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$

لأنه إذا كان $a - b = k_1 m \wedge b - c = k_2 m \Rightarrow a - c = (k_1 + k_2)m$

(2) إذا كان $a \equiv b \pmod{m}$ و $k \in \mathbb{Z}$ فإن $ka \equiv kb \pmod{m}$

لأن $a - b = Mm$ فإذا ضربنا الطرفين بالعدد k نجد $ka - kb = (kM)m$

(3) إذا كان $c \equiv d \pmod{m} \wedge a \equiv b \pmod{m}$

فإن $(\text{mod } m)a \pm c \equiv b \pm d$

البرهان : لما كان $c - d = M_1m, a - b = M_2m$

$$(a - b) \pm (c - d) = (M_2 \pm M_1)m \quad \text{فإن}$$

$$(a \pm c) - (b \pm d) = Mm, M = M_1 \pm M_2 \quad \text{أي}$$

ويمكن تعميم هذه الخاصة فنكتب : إذا كان $a_i \equiv b_i \pmod{m}$ من أجل جميع القيم

$i = 1, 2, \dots, n$ فإن $\sum_{i=1}^n a_i \equiv \sum_{i=1}^n b_i \pmod{m}$ ويمكن إثبات ذلك بطريقة الاستقراء الرياضي .

(4) مبرهنة: إذا كان $c \equiv d \pmod{m} \wedge a \equiv b \pmod{m}$ فإن $ac \equiv bd \pmod{m}$

$$a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow ac \equiv bc \pmod{m} \quad \text{البرهان : لدينا}$$

$$c \equiv d \pmod{m} \Rightarrow bc \equiv bd \pmod{m} \quad \text{و}$$

$$ac \equiv bd \pmod{m} \quad \text{أي وهو المطلوب .}$$

(5) إذا كان $a \equiv b \pmod{m}$ فإن $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ حيث $n \geq 0$.

البرهان : الخطوة الأساسية في الاستقراء : من أجل $n = 0$ و $n = 1$ العلاقة محققة

خطوة الاستقراء : لنفترض صحتها من أجل $n = k$ ولنثبت صحتها من أجل $n = k+1$

$$a^k \equiv b^k \pmod{m} \quad \text{لذا نكتب :}$$

$$a \cdot a^k \equiv b \cdot b^k \pmod{m} \quad \text{وحسب الخاصة (4) نكتب :}$$

$$a^{k+1} \equiv b^{k+1} \pmod{m} \quad \text{الأمر الذي يثبت صحة العلاقة المطلوبة.}$$

أي أن العلاقة صحيحة $\forall n \geq 0$.

(6) إذا كان $a \equiv b \pmod{m}$ وإذا كان $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ حيث $0 \leq i \leq n, a_i \in Z$

$$f(a) \equiv f(b) \pmod{m} \quad \text{فإن :}$$

البرهان :

بما أن $a \equiv b \pmod{m}$ فإن $a^i \equiv b^i \pmod{m}$ حسب الخاصة (5) وكذا $a_i a^i \equiv a_i b^i \pmod{m}$

$$f(a) \equiv f(b) \pmod{m} \quad \text{أي } \sum_{i=0}^n a_i a^i \equiv \sum_{i=0}^n a_i b^i \pmod{m}$$

مثال : لدينا $2 \equiv -4 \pmod{6}$ فإذا كان $f(x) = x^2 - x + 5$ فإن

$$f(2) = 7, f(-4) = 25, 7 \equiv 25 \pmod{6} \Rightarrow f(2) \equiv f(-4) \pmod{6}$$

(7) مبرهنة : إذا كان $ka \equiv kb \pmod{m}$ وإذا كان $d = (k, m)$ فإن $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$.

البرهان : بما أن $d = (k, m)$ فيمكن أن نكتب : $k = k_0d, m = m_0d$

$$ka \equiv kb \pmod{m} \quad \text{وبما أن } (k_0, m_0) = 1 \quad \text{فإن}$$

$$k_0 d(a - b) = M m_0 d \Leftrightarrow k(a - b) = M m$$

ومنه $k_0(a - b) = M m_0$ أي أن $m_0 | k_0(a - b)$ ولما كان $(k_0, m_0) = 1$

ينتج أن : $m_0 | a - b$ أي $a \equiv b \pmod{m_0}$ حيث $m_0 = \frac{m}{d}$

نتيجة (1) : ينتج من الخاصة السابقة أنه إذا كان $ka \equiv kb \pmod{m}$ وكان $(k, m) = 1$

فإن $a \equiv b \pmod{m}$ أي يمكن اختصار العامل المشترك بين طرفي تطابق إذا كان هذا العامل أولياً نسبياً مع المقاس .

مثال : $10 \equiv 6 \pmod{4}$ ولكن $5 \not\equiv 3 \pmod{4}$ لأن $(10, 6) = 2 \wedge (2, 4) \neq 1$

في حين $77 \equiv -28 \pmod{15}$ $\Leftrightarrow 11 \equiv -4 \pmod{15}$ لأن :

$$(-77, -28) = 7 \wedge (7, 15) = 1$$

نتيجة (2) : إذا كان $ca \equiv cb \pmod{p}$ حيث p عدد أولي لا يقسم c فإن $a \equiv b \pmod{p}$ وذلك لأن $(a, p) = 1$ في هذه الحالة .

ملاحظة (1) : إذا كان العامل المشترك $k \equiv 0 \pmod{m}$ فإن $(k, m) = m$

والاختصار يؤدي إلى النتيجة $a \equiv b \pmod{1}$ وهي علاقة صحيحة مهما تكن الأعداد a, b .

ملاحظة (2) : إذا كان $ab \equiv a \cdot 0 \pmod{m}$ و $(a, m) = 1$ فإن المبرهنة السابقة تعطي

$b \equiv 0 \pmod{m}$. وإذا كان $ab \equiv a \cdot 0 \pmod{p}$ حيث p عدد أولي فإما أن يكون

$$a \equiv 0 \pmod{p} \text{ أو } b \equiv 0 \pmod{p} .$$

(8) إذا كان $a \equiv b \pmod{m}$ وكان $n | m$ فإن $a \equiv b \pmod{n}$.

البرهان : لدينا $m | a - b$ و $n | m$ ومنه $a \equiv b \pmod{n}$.

(9) مبرهنة : إذا كان $a, b \in Z$ و $m_i \in Z^+$ حيث $i = 1, 2, \dots, k$

وإذا $a \equiv b \pmod{m_i}$ فإن $a \equiv b \pmod{m}$ حيث $m = \text{lcm}(m_1, m_2, \dots, m_k)$

البرهان : لدينا $m_i | a - b$ ولما كان $m_i | m$ من أجل $1 \leq i \leq k$

فإن $a - b$ مضاعف مشترك للأعداد m_i فهو مضاعف للمضاعف المشترك الأصغر m

أي $a - b | m$ و $a \equiv b \pmod{m}$.

نتيجة : إذا كانت m_i أولية نسبياً مثلى مثلى فإنها أولية نسبياً و $m = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k$ و

$a \equiv b \pmod{m_i}$ من أجل $i = 1, 2, \dots, k$ $\Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k}$.

وبحالة خاصة إذا كان $m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ هو الشكل القانوني لـ m فإن :

$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{p_i^{\alpha_i}}$ حيث $i = 1, 2, \dots, k$

10 مبرهنة : إذا كان $r \geq 1$ و $a \equiv b \pmod{p^r}$ ، a, b, r أعداد صحيحة و $r \geq 1$ و p عدد أولي ، فإن : $a^{p^s} \equiv b^{p^s} \pmod{p^{r+s}}$ حيث $s \geq 0$.

البرهان : بطريقة الاستقراء الرياضي على s :

الخطوة الأساسية : من أجل $s = 0$ نجد أن العلاقة صحيحة

خطوة الاستقراء : لنفترض أن العلاقة صحيحة من أجل $s = k > 0$ ولنثبت صحتها من أجل

$$s = k+1 \quad \text{فنكتب} \quad a^{p^k} \equiv b^{p^k} \pmod{p^{r+k}} \Rightarrow a^{p^k} = b^{p^k} + Mp^{r+k}$$

نرفع الطرفين إلى القوة p فنجد :

$$\begin{aligned} (a^{p^k})^p &\equiv a^{p^{k+1}} = (b^{p^k} + Mp^{r+k})^p \\ &= b^{p^{k+1}} + \frac{p}{1}(b^{p^k})^{p-1}(Mp^{r+k}) + \frac{p(p-1)}{2!}(b^{p^k})^{p-2}(Mp^{r+k})^2 + \\ &\quad + \dots + M^p(p^{r+k})^p \end{aligned}$$

ولما كانت قوى p بدءاً من الحد الثاني هي $1, r+k+1, 2r+2k+1, \dots$

وكلها أكبر أو تساوي $r+k+1$ فإن جميع الحدود تطابق الصفر بالمقاس p^{r+k+1} أي :

$$a^{p^{k+1}} \equiv b^{p^{k+1}} \pmod{p^{r+k+1}} \quad \text{أي أن المبرهنة صحيحة من أجل } s \geq 0 .$$

مثال (1) : لنثبت أن الفرق بين أي عدد صحيح N بالنظام العشري ومجموع أرقامه يقبل القسمة على 9

الإثبات : إن العدد N يكتب بالنظام العشري كما نعلم على النحو :

$$N = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \dots + a_1 10 + a_0$$

ولما كان $10 \equiv 1 \pmod{9}$ فإن $10^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{9}$ من أجل $k \geq 0$

$$\sum_{k=0}^n a_k 10^k \equiv \sum_{k=0}^n a_k \cdot 1 \pmod{9} \quad \text{وبالتالي} :$$

$$N \equiv a_n + a_{n-1} + \dots + a_2 + a_1 + a_0 \pmod{9} \quad \text{أي}$$

$$N - (\sum_{k=0}^n a_k) \equiv 0 \pmod{9} \Rightarrow 9 | N - \sum_{k=0}^n a_k \quad \text{ومنه}$$

$$3741 - (3+7+4+1) = 3726 = 9 \cdot (414) \quad \text{وعلى سبيل المثال} :$$

تمرين (2) : من أجل $n \in \mathbb{Z}^+$ أثبت أن $15 | 2^{4n} - 1$

$$(2^4)^n \equiv 1 \pmod{15} \Leftrightarrow 2^4 \equiv 16 \equiv 1 \pmod{15} \quad \text{الحل: لدينا}$$

$$15 | 2^{4n} - 1 \quad \text{أي}$$

تمرين (3) : من أجل $n \geq 0$ أثبت أن $8 | 3^{2n} + 7$

$$3^{2n} + 7 \equiv 1 + 7 \pmod{8} \Leftrightarrow 3^{2n} \equiv 1 \pmod{8} \Leftrightarrow 3^2 \equiv 9 \equiv 1 \pmod{8} \quad \text{الحل: إن}$$

$$8 | 3^{2n} + 7 \quad \text{أي} \quad 3^{2n} + 7 \equiv 0 \pmod{8}$$

تمرين (4) : أوجد أصغر عدد صحيح موجب k يحقق العلاقة :

$$31 | 33(26)^2 - k$$

الحل: العدد المطلوب هو k باقي قسمة $33(26)^2$ على 31 لذا نكتب :

$$33(26)^2 \equiv k \pmod{31}$$

ولما كان $26 \equiv -5 \pmod{31}$ و $33 \equiv 2 \pmod{31}$

$$(26)^2 \equiv 25 \pmod{31} \quad \text{فإن}$$

$$33(26)^2 \equiv 50 \pmod{31} \quad \text{أي أن}$$

$$k = 19 \quad \text{و} \quad 33(26)^2 \equiv 19 \pmod{31} \quad \text{وأخيراً}$$

تمرين (5) : أوجد باقي قسمة $\sum_1^{1000} k!$ على 24

الحل: نعلم أن $4! = 24$ و $5! = (4!) \cdot 5$ لذا نكتب

$$\sum_1^{1000} k! = 1 + 2! + 3! + 4! + 5! + \dots + 1000!$$

ولما كانت الحدود بدءاً من $4!$ تطابق الصفر بالمقاس 24 نجد :

$$\sum_1^{1000} k! = 1 + 2 + 6 \equiv 9 \pmod{24}$$

وباقى القسمة هو 9 .

الفصل الثاني التطابقات الخطية

2-2 التطابقات الخطية *Linear congruences*

2-2-1 تعريف : التطابق الخطي هو معادلة من الشكل :

$$(1) \quad ax \equiv b(\text{mod}m)$$

حيث a, b أعداد صحيحة معلومة x عدد صحيح مجهول و m عدد صحيح أكبر من الواحد وحل التطابق الخطي هو إيجاد قيمة العدد الصحيح x_0 الذي يحقق المعادلة $ax_0 \equiv b(\text{mod}m)$ ومن تعريف التطابق نعلم أن هذا التطابق يتحقق إذا وفقط إذا كان $m|ax_0 - b$ أي إذا وفقط إذا وجد عدد y_0 بحيث $ax_0 - b = my_0$ أي أن مسألة حل تطابق خطي تؤول إلى مسألة إيجاد الحلول الكاملة لمعادلة ديوفانتس الخطية $ax - my = b$.

ملاحظة : نعد الحلول المتطابقة بالمقاس m للتطابق الخطي حلاً واحداً

فعلى سبيل المثال : إن $x = 3$ و $x = -9$ كل منهما يحقق التطابق $3x \equiv 9(\text{mod}12)$ و $3x \equiv -9(\text{mod}12)$ لذا نعدهما حلاً واحداً ونعني بعدد حلول تطابق عدد الحلول غير المتطابقة بالمقاس m .

2-2-2 مبرهنة : يكون للتطابق الخطي $ax \equiv b(\text{mod}m)$ حلاً إذا وفقط إذا كان $d|b$ حيث

$$d = \text{gcd}(a, m) \text{ ، وإذا كان } d|b \text{ فإن للتطابق } d \text{ من الحلول غير المتطابقة بالمقاس } m.$$

البرهان : لقد بينا أن حل التطابق الخطي يكافئ حل معادلة ديوفانتس الخطية

وقد أثبتنا أن الشرط اللازم والكافي كي يكون للمعادلة حل هو أن يكون $d|b$ كما أثبتنا أنه إن كان

x_0, y_0 هو حل خاص لمعادلة ديوفانتس فإن الحل الكامل لها هو :

$$x = x_0 + \frac{m}{d}t \quad y = y_0 - \frac{m}{d}t \quad t \in Z$$

لنأخذ الحلول المقابلة لقيم t التالية : $t = 0, 1, 2, \dots, d-1$

$$\text{أي لنكتب : } x_0, x_0 + \frac{m}{d}, x_0 + \frac{2m}{d}, \dots, x_0 + \frac{(d-1)m}{d}$$

ولنثبت أن هذه الحلول كلها غير متطابقة بالمقاس m إذ لو تطابق حلان موافقان للقيمتين t_1, t_2 لأمكن

$$\text{أن نكتب : } x_0 + \frac{m}{d}t_1 \equiv x_0 + \frac{m}{d}t_2(\text{mod}m) \quad 0 \leq t_1 < t_2 \leq d-1$$

$$\frac{m}{d}t_1 \equiv \frac{m}{d}t_2(\text{mod}m) \quad \text{ومنه}$$

ولدينا $(\frac{m}{d}, m) = \frac{m}{d}$ وحسب خواص التطابقات يمكن اختصار العامل المشترك لنحصل على $t_1 \equiv t_2 \pmod{d}$ وهذا تناقض لأن قيم t أي الأعداد $t = 0, 1, 2, \dots, d - 1$ كلها غير متطابقة بالمقاس d .

لنثبت أخيراً أن أي حل من الحلول $(x_0 + \frac{m}{d}t)$ حيث t أكبر أو تساوي d يطابق بالمقاس m واحداً من الحلول السابقة والتي عددها يساوي d .

في الحقيقة بما أن $t \geq d$ فهي تكتب على النحو $t = qd + r$ حيث $0 \leq r < d$ أي $0 \leq r \leq d - 1$ ، نعوض في عبارة الحل فنجد :

$$x_0 + \frac{m}{d}t = x_0 + \frac{m}{d}(qd + r) = x_0 + mq + \frac{m}{d}r$$

$$x_0 + \frac{m}{d}t \equiv (x_0 + \frac{m}{d}r) \pmod{m} \quad \text{ومنه}$$

و $x_0 + \frac{m}{d}r$ هو أحد الحلول المذكورة ، وهو المطلوب .

نتيجة : إذا كان $(a, m) = 1$ فإن للتطابق الخطي $ax \equiv b \pmod{m}$ حل وحيد .
وإذا كان المقاس عدداً أولياً p وكان $p \nmid a$ فإن للتطابق $ax \equiv b \pmod{p}$ حل وحيد أيضاً .

تمرين (1) : أوجد حلول التطابق $6x \equiv 2 \pmod{9}$

الحل : نلاحظ أن $(6, 9) = 3$ و $3 \nmid 2$ وليس للتطابق أي حل .

تمرين (2) : أوجد حلول التطابق $6x \equiv 21 \pmod{30}$

الحل : لدينا: $(9, 30) = 3$ و $3 \mid 21$ أي أن للتطابق ثلاثة حلول غير

متطابقة بالمقاس 30

طريقة أولى : نختصر طرفي التطابق على 3 فنجد : $3x \equiv 7 \pmod{10}$

ولما كان $(3, 10) = 1$ فلهذا التطابق حل وحيد بالمقاس 10 ، وبتعويض x بأحد الأعداد من 0

إلى 9 نجد أن : $x = 9$ يحقق التطابق أي

$$9x \equiv 21 \pmod{30} \quad \text{وهو يحقق التطابق الأصلي} \quad x_0 \equiv 9 \pmod{10}$$

ونحصل على الحلول الثلاثة بكتابة $x \equiv x_0 + 10t$ حيث $t = 0, 1, 2$

وتكون الحلول : $x \equiv 9 \pmod{30}$ و $x \equiv 19 \pmod{30}$ و $x \equiv 29 \pmod{30}$

طريقة ثانية : يمكن إيجاد الحل بالعودة إلى حل معادلة ديوفانتس المكافئة

للتطابق فنبحث عن حلول المعادلة : $9x - 30y = 21$ بتطبيق خوارزمية القسمة فنجد :

$$30 = 9 \times 3 + 3$$

$$9 = 3 \times 3 + 0$$

وبالتالي

$$3 = 30 - 9 \times 3$$

$$21 = 9(-21) - 30(-7)$$

أي $x_0 = -21$ هو حل خاص والحلول الكاملة هي :

$$x = -21 + \frac{30}{3}t = -21 + 10t, t = 0,1,2$$

أي الحلول غير المتطابقة بالمقاس 30 هي :

$$x \equiv -21 \pmod{30} \text{ و } x \equiv -11 \pmod{30} \text{ و } x \equiv -1 \pmod{30}$$

وهي تطابق الحلول الموجبة (9,19,29) حيث $9 \equiv -21$ و $19 \equiv -11$ و $29 \equiv -1$ بالمقاس 30.

3-2-2 الكسور البسيطة المستمرة المنتهية :

إن إيجاد حلول التطابقات الخطية باستخدام خوارزمية اقليدس أو بالتجريب تصبح طويلة أو

متعذرة حين يكون المقاس عدداً كبيراً لذا تستخدم طريقة الكسور البسيطة المستمرة التي ستشرحها في هذه

الفقرة لحل التطابقات الخطية وحل معادلات ديوفانتس الخطية .

- تعريف : الكسور البسيطة المستمرة المنتهية هي كسور تكتب كما يلي :

$$\frac{A}{B} = a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_4 + \dots + \frac{1}{a_{n-2} + \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n}}}}}}$$

حيث $a_2, a_3, \dots, a_n \in \mathbb{Z}^+, a_1 \in \mathbb{Z}$

ويرمز : $\frac{A}{B} = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$

$$\text{مثال (1) : } -2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}} = -2 + \frac{1}{\frac{4}{3}} = -2 + \frac{3}{4} = -\frac{5}{4} = \langle -2, 1, 3 \rangle$$

مثال (2) :

$$\begin{aligned} \frac{32}{19} &= 1 + \frac{13}{19} = 1 + \frac{1}{\frac{19}{13}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{6}{13}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{13}{6}}} \\ &= 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{6}}} = \langle 1, 1, 2, 6 \rangle \end{aligned}$$

يسمى العدد a_k النسبة الجزئية من المرتبة k وإذا توقفنا بالكسر عند النسبة الجزئية فإننا نحصل على التقريب من المرتبة k : c_k ونكتب :

$$c_1 = a_1, c_2 = a_1 + \frac{1}{a_2}, \dots, c_k = a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots + \frac{1}{a_k}}}$$

ففي المثال (2) يمكن أن نكتب :

$$c_1 = 1, c_2 = 1 + \frac{1}{1} = 2, c_3 = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{5}{3}$$

$$c_4 = \langle 1, 1, 2, 6 \rangle = \frac{32}{19}$$

4-2-2 مبرهنة : إذا كان لدينا الكسر المستمر المنتهي $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ وأدخلنا الرموز التالية :

$$q_1 = 1, \quad p_1 = a_1$$

$$q_2 = a_2, \quad p_2 = a_1 a_2 + 1$$

$$q_3 = a_3 q_2 + q_1, \quad p_3 = a_3 p_2 + p_1$$

.....

.....

$$q_i = a_i q_{i-1} + q_{i-2}, \quad p_i = a_i p_{i-1} + p_{i-2}$$

فإن التقريب من المرتبة n أي c_n للكسر يساوي : $c_n = \frac{p_n}{q_n}$ عندما $n \geq 1$

الإثبات : نتبع طريقة الاستقراء الرياضي :

1- الخطوة الأساسية : نلاحظ أن

$$c_2 = \frac{p_2}{q_2} = \frac{a_2 a_1 + 1}{a_2}, \quad c_1 = \frac{p_1}{q_1} = \frac{a_1}{1}$$

2- لنفترض أن العلاقة صحيحة من أجل $n = k$

$$c_k = \frac{p_k}{q_k} \quad \text{أي لنفترض أن}$$

ولنثبت صحتها من أجل $n = k + 1$ أي لنثبت أن : $c_{k+1} = \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}}$

$$c_k = \frac{a_k p_{k-1} + p_{k-2}}{a_k q_{k-1} + q_{k-2}} = a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots + a_k}}$$

نعلم أن :

$$c_{k+1} = a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots + a_k + \frac{1}{a_{k+1}}}}$$

و

أي أن c_{k+1} يختلف عن c_k بأن الحد الأخير في الكسر هو $a_k + \frac{1}{a_{k+1}}$ بدلاً عن a_k لذا نعوض في عبارة c_k كل a_k بـ $a_k + \frac{1}{a_{k+1}}$ فنجد :

$$c_{k+1} = \frac{\left(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}\right)p_{k-1} + p_{k-2}}{\left(a_k + \frac{1}{a_{k+1}}\right)q_{k-1} + q_{k-2}} = \frac{\{(a_k \cdot a_{k+1} + 1)p_{k-1} + a_{k+1}p_{k-2}\} / a_{k+1}}{\{(a_k \cdot a_{k+1} + 1)q_{k-1} + a_{k+1}q_{k-2}\} / a_{k+1}}$$

$$c_{k+1} = \frac{a_{k+1}(a_k p_{k-1} + p_{k-2}) + p_{k-1}}{a_{k+1}(a_k q_{k-1} + q_{k-2}) + q_{k-1}} = \frac{a_{k+1}p_k + p_{k-1}}{a_{k+1}q_k + q_{k-1}} = \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}}$$

أي أنه إذا كانت المبرهنة صحيحة من أجل $n = k$ فهي صحيحة من أجل $n = k + 1$ وبالتالي فهي صحيحة من أجل الأعداد الصحيحة الموجبة

$$5-2-2 \text{ مبرهنة : من أجل } n \geq 2 \text{ فإن } p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^n$$

البرهان : بالاستقراء الرياضي :

$$\text{الخطوة الأساسية : لما كان : } p_2 = a_2 a_1 + 1, p_1 = a_1, q_1 = 1, q_2 = a_2$$

فإننا نلاحظ أن المبرهنة صحيحة من أجل $n = 2$ لأن :

$$p_2 q_1 - p_1 q_2 = (a_2 a_1 + 1)(1) - a_1 a_2 = 1 = (-1)^2$$

خطوة الاستقراء : لنفترض أن المبرهنة صحيحة من أجل $n = k \geq 2$ ولنثبت صحتها من أجل $n = k + 1$

لذا نكتب :

$$\begin{aligned} p_{k+1} q_k - p_k q_{k+1} &= (a_{k+1} p_k + p_{k-1}) q_k - p_k (a_{k+1} q_k + q_{k-1}) \\ &= -(p_k q_{k-1} + p_{k-1} q_k) = -(-1)^k = (-1)^{k+1} \end{aligned}$$

أي أن المبرهنة صحيحة من أجل $n \geq 2$.

نتيجة : إن p_n و q_n أوليان نسبياً .

الإثبات : إذا كان $(p_n, q_n) = d > 1$ أي إذا كان : $d | p_n \wedge d | q_n$

فإن $d | p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n$ أي $d | 1$ وبالتالي $d = 1$

- سنوضح عملياً كيفية الاستفادة من الكسور البسيطة في إيجاد حلول التطابقات الخطية :

تمرين (1): لنوجد حل التطابق $79x \equiv 3 \pmod{103}$ بطريقة الكسور المستمرة .

إن إيجاد حلول التطابق يكافئ البحث عن حلول معادلة ديوفانتس التالية :

$$79x + 103y = 3$$

لذا نبعث أولاً عن حل المعادلة $79x + 103y = 1$ فنكتب الكسر $\frac{79}{103}$ على شكل كسر بسيط

مستمر :

$$\frac{79}{103} = 0 + \frac{1}{1+\frac{24}{79}} = 0 + \frac{1}{1+\frac{1}{3+\frac{7}{24}}} = 0 + \frac{1}{1+\frac{1}{3+\frac{1}{\frac{24}{7}}}} = 0 + \frac{1}{1+\frac{1}{3+\frac{1}{2+\frac{1}{3}}}}$$

$$\frac{79}{103} = \langle 0,1,3,3,2,3 \rangle \quad \text{أي أن}$$

$$a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 3, a_4 = 3, a_5 = 2, a_6 = 3 \quad \text{و}$$

$$p_1 = 0, p_2 = 1, q_1 = 1, q_2 = 1$$

$$c_1 = \frac{p_1}{p_2} = 0, c_2 = \frac{p_2}{q_2} = 1 \quad \text{و}$$

$$c_3 = \frac{a_3 p_2 + p_1}{a_3 q_2 + q_1} = \frac{3}{4} = \frac{p_3}{q_3}, \quad c_4 = \frac{a_4 p_3 + p_2}{a_4 q_3 + q_2} = \frac{10}{13} = \frac{p_4}{q_4}$$

$$c_5 = \frac{a_5 p_4 + p_3}{a_5 q_4 + q_3} = \frac{23}{30} = \frac{p_5}{q_5}, \quad c_6 = \frac{a_6 p_5 + p_4}{a_6 q_5 + q_4} = \frac{79}{103} = \frac{p_6}{q_6}$$

نطبق المبرهنة الثانية فنجد :

$$p_6 q_5 - p_5 q_6 = 79 \times 30 - 103 \times 23 = 1$$

$$79(90) + 103(-69) = 3 \Rightarrow x_0 = 90, y_0 = -69 \quad \text{أي}$$

$$x = x_0 + 103t = 90 + 103t \quad \text{والحل الكامل للتطابق هو:}$$

$$x \equiv 90 \pmod{103} \quad \text{أي:}$$

تمرين (2) : لنوجد حل التطابق : $187x \equiv 2 \pmod{503}$

$$\frac{187}{503} = \langle 0,2,1,2,4,2,6 \rangle \quad \text{فنجد } \frac{187}{503} \text{ الكسر البسيط المستمر للكسر}$$

نوجد التقريبات المتتالية :

$$c_1 = \frac{0}{1} = 0, \quad c_2 = \frac{1}{2}, \quad c_3 = \frac{1}{3}, c_4 = \frac{3}{8}$$

$$c_5 = \frac{13}{35} = \frac{p_5}{q_5}, \quad c_6 = \frac{29}{78} = \frac{p_6}{q_6}, \quad c_7 = \frac{187}{503} = \frac{p_7}{q_7}$$

$$p_7 q_6 - p_6 q_7 = (-1)^7 \Rightarrow 187(78) - 503(29) = -1 \quad \text{وبالتالي}$$

$$187(-156) + 503(58) = 2 \quad \text{أي}$$

$$x \equiv -156 \pmod{503} \equiv 347 \pmod{503} \quad \text{والحل المطلوب هو:}$$

6-2-2 النظرير الضربي

تعريف : نقول إن a^* هو النظرير الضربي للعدد الصحيح a بالمقاس m إذا كان $a \cdot a^* \equiv 1 \pmod{m}$. نلاحظ أنه ليس بالضرورة أن يوجد لكل عدد صحيح نظير ضربي بالمقاس m إذ مثلاً لا يوجد نظير ضربي للعدد 2 بالمقاس 4 لأن التطابق $2x \equiv 1 \pmod{4}$ ليس له حل لأن $(2,4) = 2$ و $2 \nmid 1$ وبشكل عام لا يوجد نظير ضربي لأي عدد زوجي إذا كان المقاس زوجياً .

7-2-2 مبرهنة : يكون للعدد a نظير ضربي بالمقاس m إذا وفقط إذا كان $(a, m) = 1$.

الإثبات : في الحقيقة نعلم أن الشرط اللازم والكافي كي يكون للتطابق $ax \equiv 1 \pmod{m}$ حل هو أن يكون d القاسم المشترك الأعظم للعدد a, m قاسماً للواحد وهذا لا يصح إلا عندما $d = 1$ أي $(a, m) = 1$.

تمرين (1) : عين النظرير الضربي للعدد 17 بالمقاس 25 :

الحل : لنوجد حل التطابق $17x \equiv 1 \pmod{25}$ فنجد

$$1 = 17(3) + 25(-2) \Rightarrow 17 \times 3 \equiv 1 \pmod{25}$$

والعدد 3 هو النظرير الضربي المطلوب .

تمرين (2) : أوجد النظرير الضربي للعدد 71 بالمقاس 55 :

الحل : لنوجد حل التطابق $71x \equiv 1 \pmod{55}$ بطريقة الكسور البسيطة المستمرة فنكتب :

$$\frac{71}{55} = 1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{2}}}}$$

ونحسب c_k فنجد :

$$c_1 = 1, c_2 = \frac{4}{3}, c_3 = \frac{9}{7}, c_4 = \frac{31}{24} = \frac{p_4}{q_4}, c_5 = \frac{71}{55} = \frac{p_5}{q_5}$$

$$\text{ومنه } 71(24) - 55(31) = -1 \Rightarrow 71(-24) + 55(31) = 1$$

والنظرير للعدد 71 بالمقاس 55 هو -24 أي $71^* \equiv -24 \pmod{55}$:

8-2-2 حل جملة تطابقات خطية :

تكتب جملة التطابقات الخطية على النحو : $b_i x \equiv a_i \pmod{m_i}$

نقول إن العدد الصحيح x هو حل مشترك لجملة التطابقات إذا حقق جميع هذه التطابقات معاً .

ونلاحظ ما يلي :

1- إذا لم يكن لأحد التطابقات ، حل فليس لجملة التطابقات حل .

2- إذا كان لكل من التطابقات حل فليس بالضرورة أن يكون لجملة التطابقات حل مشترك .

على سبيل المثال :

إن لكلٍ من التظابقين $3x \equiv 2 \pmod{4}$ و $9x \equiv 3 \pmod{12}$ حل ،
ونلاحظ أن $x \equiv 2 \pmod{4}$ يحقق التظابق الأول ولا يحقق التظابق الثاني كما أن $x \equiv 3 \pmod{4}$
يحقق التظابق الثاني $3x \equiv 1 \pmod{4}$ ولا يحقق التظابق الأول وليس للتظابقين حل مشترك .

2-2-9 مبرهنة الباقي الصينية : (*The Chinese remainder theorem*)

هي وسيلة لحل مسألة إيجاد عدد صحيح علمت بواقي قسمته على عدة أعداد معلومة وظهرت هذه
المسألة عند علماء الصين في الألف الأول قبل الميلاد كما وجدت في أعمال بعض اليونانيين من حوالي
100 قبل الميلاد ونص المبرهنة هو :

المبرهنة : إذا كانت المقاسات $m_1, m_2, \dots, m_k$ أولية نسبياً مثنى مثنى فإنه
يوجد لجملة التظابقات الخطية :

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

.....

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

حل وحيد بالمقاس $m = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k$

البرهان : نكتب $M_i = \frac{m}{m_i}, i = 1, 2, \dots, k$

إن $(M_i, m_i) = 1$ لذا يوجد للتظابق $M_i m'_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ حل من أجل $i = 1, 2, \dots, k$.
أي يوجد للعدد M_i نظير ضربى بالمقاس m_i نسميه m'_i .
لنكتب العدد x على النحو :

$$x = m'_1 M_1 a_1 + m'_2 M_2 a_2 + \dots + m'_k M_k a_k$$

إن العدد x هو حل لكل من التظابقات في الجملة المدروسة لأن $m_i | M_j$ عندما $i \neq j$ أي أن
 $M_j \equiv 0 \pmod{m_i}$ من أجل كل $i \neq j$ وبالتالي نجد :

$$x = m'_i M_i a_i \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad 1 \leq i \leq k$$

و x بالتالي هو حل مشترك لجملة التظابقات .

لنثبت الآن أن x هو الحل الوحيد بالمقاس m لذا نفترض أن x' و x حلان مختلفان لجملة التظابقات
أي أن :

$x \equiv x' \equiv a_i \pmod{m_i}$ من أجل كل i ، $1 \leq i \leq k$ ، أي أن $m_i | x - x'$ ولما كان m هو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد m_i فإن $m | x - x'$ و $x = x' \pmod{m}$.

مثال (1) : أوجد أصغر عدد صحيح باقي قسمته على 6 يساوي 2 وباقي قسمته على 5 يساوي 3 وباقي قسمته على 11 يساوي 7 .

الحل : إن العدد المطلوب هو الحل المشترك للتطابقات :

$$x \equiv 2 \pmod{6}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 7 \pmod{11}$$

نلاحظ أن المقاسات 6, 5, 11 أولية نسبياً فيما بينها مثني مثني ولجملة التطابقات حل وحيد .

نكتب

$$m = (6)(5)(11) = 330 \Rightarrow M_1 = (5)(11), M_2 = (6)(11), M_3 = (6)(5) = 30$$

نوجد النظائر الضريبية لـ M_1, M_2, M_3 بحل التطابقات .

$$55m'_1 \equiv 1 \pmod{6}, \quad 66m'_2 \equiv 1 \pmod{5}, \quad 30m'_3 \equiv 1 \pmod{11}$$

$$m'_1 \equiv 1 \pmod{6}, \quad m'_2 \equiv 1 \pmod{5}, \quad m'_3 \equiv -4 \pmod{11}$$

والحل المشترك لجملة التطابقات هو :

$$x \equiv 1(55)(2) + 1(66)(3) + (-4)(30)(7) \pmod{330}$$

$$x \equiv 128 \pmod{330}$$

مثال (2) : أوجد حل التطابق $19x \equiv 1 \pmod{140}$ باستخدام مبرهنة الباقي الصينية :

الحل : لما كان $x = 140 = (4)(5)(7)$ فإن التطابق المعطى يكافئ جملة التطابقات :

$$19x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$19x \equiv 1 \pmod{5}$$

$$19x \equiv 1 \pmod{7}$$

والمقاسات 4, 5, 7 أولية نسبياً مثني مثني ولهذه الجملة حل لإيجاده نكتب :

$$M_3 = 20, M_2 = 28, M_1 = 35$$

وحلول التطابقات :

$$35m'_1 \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow m'_1 = -1$$

$$28m'_2 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow m'_2 = 2$$

$$20m'_3 \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow m'_3 = -1$$

والحل المشترك :

$$x \equiv (35)(-1)(3) + (28)(2)(4) + (20)(-1)(3) \equiv 59 \pmod{140}$$

وهو حل التطابق المطلوب .

مثال (3) : المطلوب إيجاد الحل المشترك لجملة التطابقات التالية :

$$x \equiv 10 \pmod{24}$$

$$x \equiv 50 \pmod{88}$$

$$x \equiv 28 \pmod{99}$$

الحل : نلاحظ أن المقاسات غير أولية نسبياً ونلاحظ أن :

$$99 = (9)(11) , 88 = (8)(11) , 24 = (3)(8)$$

$$(88,99) = 11, (24,99) = 3, (24,88) = 8 \quad \text{أي}$$

إن حل التطابق الأول يكافئ حل جملة التطابقين (1) $x \equiv 10 \pmod{3}$

$$(2) \quad x \equiv 10 \pmod{8}$$

كما أن حل التطابق الثاني يكافئ حل جملة التطابقين (3) $x \equiv 50 \pmod{8}$

$$(4) \quad x \equiv 50 \pmod{11}$$

و حل التطابق الثالث يكافئ حل جملة التطابقين (5) $x \equiv 28 \pmod{9}$

$$(6) \quad x \equiv 28 \pmod{11}$$

وحل جملة التطابقات الأولى يكافئ حل جملة التطابقات الست الأخيرة ولكن نلاحظ :

$$\text{أن} \quad 2 \equiv 10 \equiv 50 \pmod{8} \quad \text{أي أن التطابق (2) هو ذات التطابق (3)}$$

$$\text{وأن} \quad 6 \equiv 50 \equiv 28 \pmod{11} \quad \text{أي أن التطابق (4) هو ذات التطابق (6)}$$

كما نلاحظ أن $1 \equiv 10 \equiv 28 \pmod{9}$. وكل حل للتطابق (5) يحقق التطابق (1) لأن $3|9$

أي أن إيجاد حل جملة التطابقات المعطاة يؤول إلى إيجاد حل جملة التطابقات الثلاث :

$$x \equiv 2 \pmod{8}$$

$$x \equiv 6 \pmod{11}$$

$$x \equiv 1 \pmod{9}$$

نلاحظ الآن أن 8 , 9 , 11 أولية نسبياً متنى متنى لذا يمكن إيجاد الحل الوحيد لجملة التطابقات فنجد :

$$m = (8)(11)(9) = 792 , \quad M_1 = 99, M_2 = 72, M_3 = 88$$

$$m'_1 \equiv 3 \pmod{8}, \quad m'_2 \equiv 2 \pmod{11}, \quad m'_3 \equiv 4 \pmod{9} \quad \text{ومنه}$$

والحل المشترك المطلوب :

$$x \equiv (3)(99)(2) + (2)(72)(6) + (4)(88)(1) \equiv 1810 \pmod{792}$$

$$x \equiv 226 \pmod{792}$$

وأخيراً سنورد المبرهنة التالية دون برهان

مبرهنة : يوجد لجملة التطابقات :

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

.....

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

حل مشترك إذا وفقط إذا كان : $a_i \equiv a_j \pmod{d_{ij}}$ حيث $d_{ij} = (m_i, m_j)$

و $i < j$ و $j = 1, 2, \dots, k, i = 1, 2, \dots, k$

وتسمى جملة التطابقات التي تحقق الشرط $a_i \equiv a_j \pmod{d_{ij}}$: جملة منسجمة .

10-2-2 مبرهنة فيرما الصغرى : ((*Fermat's theorem*))

لقد وضع فيرما ((*Pierre de Fermat* (1601-1665))) هذه المبرهنة عام 1640 و أول إثبات لها تم من قبل اولر بعد مئة عام .

نص المبرهنة : إذا كان p عدداً أولياً و $p \nmid a$ فإن $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

البرهان : لنكتب مضاعفات العدد الصحيح a التالية : $A_1 = \{1a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a\}$

نلاحظ أن هذه الأعداد غير متطابقة فيما بينها بالمقاس p ،

إذ لو كان : $ra \equiv sa \pmod{p}$, $1 \leq r < s \leq p-1$ لاستطعنا اختصار a لأن

$(a, p) = 1$ مما يؤدي إلى العلاقة $r \equiv s \pmod{p}$ وهذا مستحيل ، كما أن عناصر

المجموعة A_1 أولية نسبياً مع p لذا فإن كل عنصر من عناصر المجموعة A_1 يطابق بالمقاس p

عنصراً واحداً من عناصر المجموعة : $A = \{1, 2, 3, \dots, p-1\}$ مما يدل على أن جداء عناصر

A_1 يساوي جداء عناصر المجموعة A الأمر الذي يعطي :

$$a. 2a. 3a. \dots. (p-1)a \equiv 1.2.3. \dots. (p-1) \pmod{p}$$

ولما كان العدد الأولي p لا يقسم أيّاً من الأعداد $1, 2, \dots, (p-1)$ فهو لا يقسم جدها لذا يمكن

اختصار $(p-1)!$ من الطرفين لنحصل على : $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

- **نتيجة (1) :** يمكن صياغة المبرهنة السابقة كما يلي :

إذا كان p عدداً أولياً فإن $a^p \equiv a \pmod{p}$ من أجل أي عدد صحيح a .

الإثبات : إذا كان $p \nmid a$ فإن $(p, a) = 1$ ونختصر الطرفين على a لنحصل

على $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ والعلاقة صحيحة .

أما إذا كان $p \mid a$ فإن $a^p \equiv 0 \equiv a \pmod{p}$ والعلاقة صحيحة .

- ملاحظة : إن لمبرهنة فيرما هذه تطبيقات شتى وتعد أساساً لكثير من بحوث نظرية الأعداد .

تمرين : أثبت أن : $5^{38} \equiv 4 \pmod{11}$

الحل: لدينا : $38 = 10(3) + 20(4) \Rightarrow 5^{38} = (5^{10})^3(5^2)^4$

ولدينا : $5^2 \equiv 25 \equiv 3 \pmod{11}$ و $5^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

$$5^{38} \equiv (1)^3(3)^4 \equiv 81 \pmod{11} \equiv 4 \pmod{11}$$

- نتيجة (2) : إذا كان p, q عددين أوليين مختلفين وكان :

$a^p \equiv a \pmod{q}$ و $a^q \equiv a \pmod{p}$ و $(a, pq) = 1$ فإن :

$$a^{pq} \equiv a \pmod{pq}$$

البرهان : حسب مبرهنة فيرما نكتب : $(a^q)^p \equiv a^q \pmod{p}$

ولما كان $a^q \equiv a \pmod{p}$ فإن $(a^q)^p \equiv a \pmod{p}$

وبشكل مشابه نجد أن $(a^p)^q \equiv a \pmod{q}$ أي أن :

أي $pq | a^{pq} - a$ و $p | a^{pq} - a$ و $p | a^{pq} - a$ و $(p, q) = 1$ ومنه ينتج أن $pq | a^{pq} - a$ أي $a^{pq} \equiv a \pmod{pq}$.

تمرين : أثبت أن $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$

لنثبت صحة هذه العلاقة بطريقتين بعد ملاحظة أن $341 = (31)(11)$

طريقة أولى : بما أن $(2, 11) = 1$ فحسب فيرما نكتب $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

وحسب خواص التطابقات نجد:

$$2^{31} \equiv 2^{30} \cdot 2 \equiv (2^{10})^3 \cdot 2 \equiv 2 \pmod{11}$$

ومن جهة أخرى لدينا : $2^{10} \equiv (2^5)^2 \equiv (1)^2 \pmod{31}$

أي أن : $2^{11} \equiv 2 \pmod{31}$

فحسب النتيجة (2) السابقة نجد أن :

$$2^{31 \times 11} \equiv 2 \pmod{31 \times 11}$$

طريقة ثانية : كتبنا حسب فيرما $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ ويمكن أن نكتب

$$2^{340} \equiv (2^{10})^{34} \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow 11 | 2^{340} - 1$$

ولدينا أن $(31, 2) = 1$ لذا نكتب حسب فيرما : $2^{30} \equiv 1 \pmod{31}$

وحسب خواص التطابقات نكتب :

$$2^{340} \equiv (2^{30})^{11} \cdot 2^{10} \equiv 1 \pmod{31} \Rightarrow 31 | 2^{340} - 1$$

ولما كان $(31, 11) = 1$ فإن $341 = (31)(11) | 2^{340} - 1$ وهو المطلوب .

- **ملاحظة** : نلاحظ من التمرين السابق أن مبرهنة فيرما محققة من أجل العدد 341 غير أولي مما يدل عكس مبرهنة فيرما غير صحيح . أي إذا كان $a^n \equiv a \pmod{n}$ فليس بالضرورة أن يكون العدد n أولياً .

- **تعريف** : تسمى الأعداد الصحيحة غير الأولية n التي تحقق العلاقة

$$2^n \equiv 2 \pmod{n} \text{ أشباه الأوليات (Pseudoprimes) .}$$

وقد أثبت أنه يوجد عدد غير منته منها . وأصغر هذه الأعداد هو العدد 341 ويليه العدد 561 .

تمرين (1) : إذا كان $(a, 35) = 1$ أثبت أن $a^{12} \equiv 1 \pmod{35}$

الحل : لدينا

$$(a, 7) = 1, (a, 5) = 1 \Leftrightarrow (a, 35) = 1, 35 = (5)(7)$$

$$a^{12} \equiv 1 \pmod{7} \Leftrightarrow a^6 \equiv 1 \pmod{7} \text{ نطبق مبرهنة فيرما فنجد}$$

$$\text{أي } 7 | a^{12} - 1 \text{ ومن جهة أخرى :}$$

$$5 | a^{12} - 1 \Leftrightarrow a^{12} \equiv 1 \pmod{5} \Leftrightarrow a^4 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$\text{ولما كان } (5, 7) = 1 \text{ فإن } 5 \cdot 7 = 35 | a^{12} - 1$$

تمرين (2) : إذا كان $(a, b, 42) = 1$ أثبت أن $a^6 - b^6 \equiv 0 \pmod{168}$

الحل : لدينا

$$\text{وكذلك } (a, 3) = 1, (a, 7) = 1, (a, 8) = 1 \Leftrightarrow (a, b, 42) = 1, 168 = (3)(7)(8)$$

$$(b, 3) = 1, (b, 7) = 1, (b, 8) = 1 \text{ نطبق مبرهنة فيرما فنجد :}$$

$$a^6 \equiv 1 \pmod{7}, b^6 \equiv 1 \pmod{7}, a^2 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow a^6 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$\text{و } b^2 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow b^6 \equiv 1 \pmod{3} \text{ ولما كان } a, b \text{ فرديان لأن } (a, b, 8) = 1 \text{ يمكن}$$

$$\text{أن تكتب } a^2 \equiv 1 \pmod{8}, b^2 \equiv 1 \pmod{8}$$

$$a^{12} \equiv 1 \pmod{8}, b^{12} \equiv 1 \pmod{8} . \text{ أي أن كل من } 7, 8, 3 \text{ يقسم } a^6 - b^6 \text{ ولما كان}$$

$$(3, 7, 8) = 1 \text{ ينتج } 168 | a^6 - b^6 .$$

2-2-11 مبرهنة ويلسون : (Wilson's theorem)

$$\text{إذا كان } p \text{ عدداً أولياً فإن } p | (p-1)! + 1 \text{ أو } (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

البرهان : نلاحظ أنه إذا كان $p = 2$ فإن $2 | 1 + 1$ والعلاقة محققة

إذا كان $p = 3$ فإن $3 | 2 + 1$ والعلاقة محققة .

لنثبت صحة العلاقة من أجل $P > 3$

ليكن العدد a هو أحد عناصر المجموعة $A = \{2,3,\dots,(p-2)\}$ ، من الواضح أن $(a,p) = 1$ أي أن لكل عنصر a نظير ضربي واحد بالمقاس p يحقق العلاقة : $aa^* \equiv 1(modp)$ وينتمي إلى مجموعة البواقي التامة للعدد p : $A_1 = \{0,1,2,\dots,(p-1)\}$.

ولكن من الواضح أن $a^* \not\equiv 0(modp)$. كما أن $a^* \not\equiv \pm 1(modp)$ لأنه لو كان

$a^* \equiv \pm 1(modp)$ لنتج أن $a \equiv \pm 1(modp)$ وهذا غير ممكن لأن $a \in A$ وكلا العددين 1

و $-1 \equiv p-1(modp)$ لا ينتميان إلى A ، مما يبين أن a^* ينتمي إلى المجموعة A . ومن جهة

أخرى فإن $a \not\equiv a^*(modp)$ لأن هذا يقتضي أن يكون $a \cdot a^* \equiv a^2 \equiv 1(modp)$ الأمر الذي

يقود إلى العلاقة $a^2 - 1 \equiv (a-1)(a+1) \equiv 0(modp)$ التي تعطي $a \equiv \pm 1(modp)$

وهذا مستحيل كما ذكرنا . أي أن a^* هو أحد عناصر A ويختلف عن a ،

وبالتالي فإن عناصر المجموعة A والتي عددها $p-3$ ، وهو عدد زوجي ، يمكن أن تصنف مثني بـ

زوجاً ، $\frac{p-3}{2}$ جداء كل ثنائي منها يطابق الواحد بالمقاس p أي أن :

$$2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-2) \equiv 1(modp)$$

وبضرب طرفي التطابق بـ $p-1$ نجد :

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-2) \cdot (p-1) \equiv (p-1)! \equiv (p-1)(modp)$$

$$(p-1)! \equiv -1(modp) \quad \text{أي}$$

2-2-12 عكس مبرهنة ويلسون :

إذا كان $n \geq 2$ و $(n-1)! \equiv -1(modn)$ فإن n عدد أولي .

البرهان : إذا لم يكن n أولياً فله قاسم d حيث : $1 < d < n$ أي

$$(1) \quad 1 < d \leq n-1 \quad \text{أي أن } d \text{ هو أحد عوامل } (n-1)! \quad \text{و} \quad d | (n-1)! \quad (1)$$

$$(2) \quad d | n \quad \text{فإن} \quad d | n \quad \text{و} \quad d | p(p-1)! + 1 \quad \text{و} \quad d | (n-1)! + 1 \quad (2)$$

ومن العلاقتين (1) و (2) ينتج أن $d | 1$ أي $d = 1$ مما يدل على أن n عدد أولي .

- ملاحظة : يمكن صياغة مبرهنة ويلسون وعكسها معاً على النحو :

$$\text{يكون العدد الصحيح } n > 1 \text{ أولياً إذا كان } (n-1)! \equiv -1(modn) .$$

ولكن من سوء الحظ أن هذا المعيار للأعداد الأولية معيار نظري بسبب سرعة تزايد $(n-1)!$ عندما يكون n كبيراً .

تمرين (1) : أثبت أن $18! \equiv -1(mod437)$.

الحل : لدينا $437 = 19 \times 23$ وحسب مبرهنة ويلسون نكتب :

$$18! \equiv -1 \pmod{19}, 22! \equiv -1 \pmod{23}$$

$$22! = 18! (19)(20)(21)(22) \quad \text{ولكن}$$

$$22! \equiv 18! (-4)(-3)(-2)(-1) \pmod{23} \quad \text{أي :}$$

$$18! \equiv -1 \pmod{23} \quad \text{أو}$$

مما سبق يمكن أن تكتب : $19 | 18! + 1$ و $23 | 18! + 1$

$$\Leftrightarrow (19, 23) = 1(23)(19) = 437 | 18! + 1 \quad \text{و}$$

تمرين (2) : أثبت أن العدد 127 يقسم $7(125!) + 5!$

الحل : بما أن 127 عدد أولي فحسب ويلسون نكتب $126! \equiv -1 \pmod{127}$.

ولدينا

$$125! \equiv 1 \pmod{127} \quad \text{أي } 126 \equiv -1 \pmod{127} \text{ و } 126! \equiv 125! (126)$$

ومنه :

$$(125!)7 + 5! \equiv 127 \equiv 0 \pmod{127} \quad \text{وهو المطلوب .}$$

تمرين (3) : لنوضح مبرهنة ويلسون بالمثال التالي : ليكن $p = 13$ ولنعرف

المجموعة $A = \{2, 3, 4, \dots, 11\}$ ولنرتب عناصر A وفق ثنائيات عددها

$$\frac{13-3}{2} = 5 \quad \text{ف نجد :}$$

$$(4)(10) \equiv 1 \pmod{13}, (3)(9) \equiv 1 \pmod{13}, (2)(7) \equiv 1 \pmod{13}$$

$$(6)(11) \equiv 1 \pmod{13}, (5)(8) \equiv 1 \pmod{13}$$

وبالتالي فإن :

$$11! = (2 \times 7)(3 \times 9)(4 \times 10)(5 \times 8)(6 \times 11) \equiv 1 \pmod{13}$$

$$12! \equiv 12 \equiv -1 \pmod{13} \quad \text{و}$$

- **ملاحظة :** يمكن التعبير عن مبرهنة ويلسون أيضاً كما يلي :

$$(p-2)! \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{أو} \quad (p-1)! \equiv p-1 \pmod{p}$$

حيث p عدد أولي .

تمارين

- 1- أعط مثلاً يبين أنه إذا كان $a^2 \equiv b^2 \pmod{n}$ فليس من الضروري أن يكون $a \equiv b \pmod{n}$.
- 2- أعط مثلاً يبين أنه إذا كان $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ و $k \equiv j \pmod{n}$ فليس من الضروري أن يكون $a^j \equiv b^j \pmod{n}$.
- 3- أثبت أنه إذا كان $(a, n) = 1$ فإن الأعداد $c, c + a, c + 2a, \dots, c + (n - 1)a$ مؤلفة مجموعة بواقية تامة بالمقاس n مهما تكن $c \in \mathbb{Z}$.
- 4- أثبت بطريقة الاستقراء أنه إذا كان a عدداً صحيحاً فردياً فإن $a^{2^n} \equiv 1 \pmod{2^{n+2}}$.
- 5- إذا كان n عدداً صحيحاً فردياً لا يقبل القسمة على 3 فبرهن أن $72 \mid 5n^6 + 3n^4 - 3n^2 - 5$.
- 6- أثبت أنه إذا كان العدد الصحيح a لا يقبل القسمة على أي من الأعداد: 2, 3, 5, 7 : كان $840 \mid a^{12} - 1$.
- 7- إذا كان $(a, 35) = 1$ أثبت أن $n^{12} \equiv 1 \pmod{35}$.
- 8- أثبت أنه إذا كان k عدداً صحيحاً فردياً و $(k, 3) = 1$ فإن $k^2 \equiv 1 \pmod{24}$.
- 9- أوجد باقي قسمة الأعداد 2^{50} و 41^{65} على العدد 7.
- 10- أوجد باقي قسمة المجموع $100^5 + 99^5 + \dots + 3^5 + 2^5 + 1^5$ على العدد 4.
- 11- إذا كان $(n, 30) = 1$ أثبت أن 240 يقسم $n^4 + 239$.
- 12- إذا كان $(n, 42) = 1$ أثبت أن 504 يقسم $n^6 - 1$.
- 13- أثبت أن باقي قسمة $255!$ على الأولي 257 يساوي 1.
- 14- أوجد الكسور البسيطة المستمرة من أجل كل من الكسور التالية :
- $$\frac{119}{32}, \frac{118}{303}, \frac{503}{187}, \frac{125}{198}$$
- 15- أوجد الكسر المقابل لـ $\langle 3, 1, 1, 4, 1, 3 \rangle$
- 16- أوجد الحل الكامل لكل من :
- $18x \equiv 30 \pmod{42}$ ، $187x \equiv 2 \pmod{503}$
- $9x \equiv 21 \pmod{30}$ ، $79x \equiv 2 \pmod{153}$
- $17x \equiv 9 \pmod{276}$ ، $182x \equiv 7 \pmod{203}$

$$4x \equiv 9 \pmod{51} \quad , \quad 140x \equiv 133 \pmod{301}$$

17- أوجد أصغر عدد صحيح موجب باقي قسمته على 13 يساوي 5 وباقي قسمته على 12 يساوي 3 وباقي قسمته على 35 يساوي 2 .

18- أوجد الحل المشترك لكل من جمل التطابقات التالية :

$$x \equiv 1 \pmod{7} \quad , \quad x \equiv -1 \pmod{25} \quad , \quad x \equiv 3 \pmod{6} \quad (a)$$

$$x \equiv 7 \pmod{45} \quad , \quad x \equiv 13 \pmod{28} \quad , \quad x \equiv -2 \pmod{11} \quad (b)$$

$$x \equiv 2 \pmod{35} \quad , \quad 5x \equiv 2 \pmod{13} \quad (c)$$

$$x \equiv 7 \pmod{20} \quad , \quad 3x \equiv 13 \pmod{77}$$

$$17x \equiv 3 \pmod{5} \quad , \quad 17x \equiv 3 \pmod{7} \quad (d)$$

$$17x \equiv 3 \pmod{3} \quad , \quad 17x \equiv 3 \pmod{2}$$

19- أوجد أصغر عدد صحيح $a > 2$ بحيث تتحقق العلاقات :

$$2|a \quad , \quad 4|a+2 \quad , \quad 3|a+1 \quad , \quad 5|a+36|a+4$$

20- أوجد باقي قسمة $2(26!)$ على 29 .

21- رتب الأعداد 21, 4, 3, 2, ... وفق ثنائيات (a, b) بحيث $a \cdot b \equiv 1 \pmod{23}$.

22- أثبت أن $18! \equiv -1 \pmod{437}$.

23- إذا كان p عدداً أولياً أثبت أن :

$$p|(p-1)!a^p + a \quad \text{و} \quad p|a^p + (p-1)!a$$

24- أوجد العدد الصحيح x بحيث يكون :

$$3^2|x \quad , \quad 4^2|x+1 \quad , \quad 5^2|x+2$$

الفصل الثالث

الدوال العددية وبعض الدوال الخاصة

2-3 الدوال العددية وبعض الدوال الخاصة في نظرية الأعداد

2-3-1 تعريف : الدوال العددية أو الدوال الحسابية ((arithmetic functions))

هي الدوال التي مجال تعريفها الأعداد الصحيحة الموجبة ، ولهذه الدوال أهمية عظيمة في نظرية

الأعداد وسندرس في هذا الفصل عدداً من هذه الدوال التي قيمها أعداد صحيحة وندرس خواصها .

2-3-2 الدالة العددية الضربية : نقول إن الدالة العددية $f(n)$ دالة ضربية إذا حققت الشرطين :

$$-1 \quad f(n) \text{ غير صفرية}$$

$$-2 \quad \forall a, b \in \mathbb{Z}^+ \text{ و } (a, b) = 1 \text{ فإن } f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$$

ونقول إن الدالة $f(n)$ ضربية تماماً إذا حققت الشروط السابقة دون الشرط $(a, b) = 1$.

مثال : الدالة $f_\alpha(n) = n^\alpha$ (حيث $\alpha, n \in \mathbb{Z}^+$) ضربية تماماً ، لأن :

$$-1 \quad f(n) \neq 0 \text{ مهما تكن } n > 0$$

$$-2 \quad \text{إذا كان } n_1, n_2 \in \mathbb{Z}^+ \text{ فإن } f_\alpha(n_1 \cdot n_2) = (n_1 \cdot n_2)^\alpha = n_1^\alpha \cdot n_2^\alpha = f_\alpha(n_1) \cdot f_\alpha(n_2)$$

$$-2-3-3 \quad \text{مبرهنة : إذا كانت } f(n) \text{ دالة ضربية فإن } f(1) = 1$$

البرهان : بما أن الدالة $f(n)$ ضربية فإنها غير صفرية أي يوجد عدد n بحيث يكون .

$$f(n) \neq 0 \text{ ولما كان } (n, 1) = 1 \text{ و } f(n \cdot 1) = f(n) \cdot f(1) \Leftrightarrow f(1) = 1$$

- تعريف : يمكن أن نعرف الدالة العددية الضربية بأنها الدالة العددية التي تحقق الشرطين :

$$-1 \quad f(1) = 1$$

$$-2 \quad f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b) \text{ حيث } a, b \in \mathbb{Z}^+, (a, b) = 1$$

- نتيجة : إذا كانت الدالة $f(n)$ دالة عددية ضربية وكانت الأعداد $n_1, n_2, \dots, n_k$ أولية نسبياً

$$\text{متى متى ، فإن } f(n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_r) = f(n_1) \cdot f(n_2) \cdot \dots \cdot f(n_r)$$

البرهان : نبرهن صحة هذه النتيجة بطريقة الاستقراء :

$$-1 \quad \text{من أجل } r=2 \text{ نجد أن } (n_1, n_2) = 1 \text{ و } f(n_1 \cdot n_2) = f(n_1) \cdot f(n_2)$$

$$-2 \quad \text{لنفترض أن العبارة صحيحة عندما } r=k \text{ ولنثبت صحتها من أجل } r=k+1$$

بما أن $((n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k), n_{k+1}) = 1$ وبما أن :

$$f(n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k) = f(n_1) \cdot f(n_2) \cdot \dots \cdot f(n_k)$$

$$f((n_1 \cdot n_2 \dots n_k), n_{k+1}) = f(n_1 \cdot n_2 \dots n_k) \cdot f(n_{k+1}) \quad \text{نجد :}$$

$$= f(n_1) \cdot f(n_2) \dots f(n_k)$$

أي العبارة صحيحة من أجل $r > 1$

- **نتيجة** : إذا كانت f دالة ضربية و كانت العبارة القانونية للعدد n هي :

$$f(n) = f(p_1^{\alpha_1}) \cdot f(p_2^{\alpha_2}) \dots f(p_k^{\alpha_k}) \quad \text{فإن } n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$$

وذلك لأن $p_i^{\alpha_i}$ أولية نسبياً فيما بينها مثلى مثلى .

- **تعريف** : إن العبارة $\sum_{d|n}$ تعني أن المجموع مأخوذ على جميع قواسم العدد n الموجبة .

$$\text{مثال : } \sum_{d|15} f(d) = f(1) + f(3) + f(5) + f(15) \quad \text{تعني :}$$

4-3-2 تمهيدية (1) : إذا كانت f, g دالتين عدديتين فإن :

$$\sum_{d|m} f(d) g(e) = (\sum_{d|m} f(d)) (\sum_{e|n} g(e))$$

البرهان : لنفترض أن $d_1, d_2, \dots, d_s$ هي جميع قواسم العدد m الموجبة

و $e_1, e_2, \dots, e_t$ هي جميع قواسم العدد n الموجبة

$$\sum_{d|m} f(d) g(e) = \sum_{j=1, \dots, s} f(d_j) g(e_k) \quad \text{ونكتب :}$$

$$= \sum_{j=1}^s f(d_j) g(e_1) + \sum_{j=1}^s f(d_j) g(e_2) + \dots + \sum_{j=1}^s f(d_j) g(e_t)$$

$$= (\sum_{j=1}^s f(d_j)) (\sum_{k=1}^t g(e_k)) = \sum_{d|m} f(d) \cdot \sum_{e|n} g(e)$$

وهو المطلوب .

5-3-2 تمهيدية (2) : إذا كان m, n عددين صحيحين موجبين وكان $(m, n) = 1$ فإن أي

قاسم لـ $m \cdot n$ يكتب بشكل وحيد كجداء قاسم لـ m مثل d_1 وقاسم لـ n مثل d_2 حيث $(d_1, d_2) = 1$.

البرهان : لنحلل كلاً من m, n إلى عوامله الأولية ونكتب

$$m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s} \quad \text{و} \quad n = q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \dots q_r^{\beta_r}$$

نعلم أن الأوليات p_i و q_j مختلفة لأن $(m, n) = 1$

$$m \cdot n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_s^{\alpha_s} q_1^{\beta_1} q_2^{\beta_2} \dots q_r^{\beta_r} \quad \text{ونكتب :}$$

$$d = p_1^{c_1} p_2^{c_2} \dots p_s^{c_s} q_1^{t_1} q_2^{t_2} \dots q_r^{t_r} \quad \text{يكتب على النحو :}$$

$$d = d_1 \cdot d_2 \quad \text{حيث } 0 \leq c_i \leq \alpha_i, \quad 0 \leq t_i \leq \beta_i \quad \text{يمكن أن نكتب :}$$

$$d_1 = p_1^{c_1} p_2^{c_2} \dots p_s^{c_s}, \quad d_2 = q_1^{t_1} q_2^{t_2} \dots q_r^{t_r} \quad \text{حيث}$$

إن $d_2 | n, d_1 | m$ ولا يوجد أي عامل مشترك بين d_1 و d_2 أي أن $(d_1, d_2) = 1$.

2-3-6 مبرهنة : إذا كانت الدالة العددية f دالة ضربية وإذا عرفت الدالة العددية F على النحو :

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d) \quad \text{فإن } F \text{ هي دالة ضربية .}$$

البرهان : لنفترض m, n عدنان صحيحان موجبان وأن $(m, n) = 1$ ونكتب :

$$F(m.n) = \sum_{d|mn} f(d) = \sum_{\substack{d_1|m \\ d_2|n}} f(d_1 d_2)$$

لأن أي قاسم d للجداء $m.n$ يكتب بشكل وحيد كجداء قاسم $d_1:m$ وقاسم $d_2:n$ حيث

$$f(d_1.d_2) = f(d_1).f(d_2) \quad \text{فإن دالة ضربية فإن } (d_1, d_2) = 1$$

نعوض في عبارة $F(m.n)$ فنجد :

$$F(m.n) = \sum_{\substack{d_1|m \\ d_2|n}} f(d_1).f(d_2) = \left(\sum_{d_1|m} f(d_1) \right) \left(\sum_{d_2|n} f(d_2) \right)$$

$$F(m.n) = F(m)F(n)$$

مثال : لنوضح المبرهنة السابقة بالمثال التالي : حيث نأخذ $n = 3$ ، $m = 8$ ، و $m.n = 24$ ،

فتكون قواسم n هي $\{1, 3\}$ وقواسم m هي $\{1, 2, 4, 8\}$

$$F(8 \times 3) = \sum_{d|24} f(d)$$

$$F(8 \times 3) = f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(6) + f(8) + f(12) + f(24) \\ = [f(1) + f(2) + f(4) + f(8)][f(1) + f(3)]$$

تمرين : لتكن الدالة g المعرفة على النحو التالي :

$$g(n) = \begin{cases} 0 & \text{زوجي } n \\ 1 & \text{فردى } n \end{cases}$$

$$\text{ولتكن } G(n) = \sum_{d|n} g(d)$$

1- برهن أن g و G دالتان ضربيتان : إن $g(1) = 1$ و إذا كان $(m, n) = 1$ فإن

$$g(n.m) = g(n)g(m) \quad \text{أي } g(n.m) = \begin{cases} 0 & \text{أحدهما زوجي} \\ 1 & \text{كلاهما فردي} \end{cases}$$

و g دالة ضربية وكذلك G حسب المبرهنة السابقة .

2- أوجد قيمة $G(p^k)$ حيث p عدد أولي فردي : لدينا

$$G(p^k) = \sum_{d|p^k} g(d) = g(1) + g(p) + g(p^2) + \dots + g(p^k) = k + 1$$

لأن قوى أي عدد فردي هي أعداد فردية .

3- احسب $G(220): G(20)$

$$G(20) = \sum_{d|20} g(d) = g(1) + g(2) + g(4) + g(5) + g(10) + g(20) = 2$$

- إن القواسم الفردية لـ 220 هي 5, 11, 55 وبالتالي فإن $G(220) = 3$.

2-3-7 دالة الجزء الصحيح *The greatest integer function* أو *Floor*

تلعب دالة الجزء الصحيح أهمية كبرى في نظرية الأعداد لذا سنورد تعريفها وأهم خواصها فيما يلي:

- **تعريف** : تعرف دالة الجزء الصحيح للعدد الحقيقي α وترمز $[\alpha]$

بأنها أكبر عدد صحيح لا تتجاوز قيمته قيمة العدد α (يرمز أحياناً $[\alpha]$ ليتميز عن العدد الصحيح

الذي هو أكبر مباشرة من α والذي يرمز $[\alpha]$). ويمكن تمثيل هذه الدالة في المستوي على النحو :

شكل (1)

ينتج من تعريف هذه الدالة أن :

$$[\alpha] \leq \alpha < [\alpha] + 1$$

ويعبر عن هذه الدالة كما يلي :

$$\alpha = [\alpha] + \theta \quad 0 \leq \theta < 1$$

ويسمى العدد θ الجزء الكسري من α .

أمثلة :

$$[-\sqrt{10}] = -4, [2.5] = 2, \left[-\frac{12}{5}\right] = -3, [\sqrt{10}] = 3, [-0.5] = -1$$

2-3-8 خواص دالة الجزء الصحيح

$$(1) \quad [a + \alpha] = a + [\alpha] \quad \text{فإن } a \in \mathbb{Z}, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\text{البرهان : لدينا : } [a + \alpha] \leq a + \alpha < [a + \alpha] + 1$$

$$([a + \alpha] - a) \leq \alpha < ([a + \alpha] - a) + 1$$

$$\text{أي أن } [a + \alpha] = [\alpha] + a \quad \text{وبالتالي } [\alpha] = [a + \alpha] - a$$

$$(2) \quad \text{إذا كان } n \in \mathbb{Z}^+, \alpha \in \mathbb{R} \quad \text{فإن } \left[\frac{\alpha}{n}\right] = \frac{[\alpha]}{n}$$

البرهان : لدينا : $\frac{\alpha}{n} = \left[\frac{\alpha}{n} \right] + \theta : 0 \leq \theta < 1$

$$\alpha = n \left[\frac{\alpha}{n} \right] + n\theta \quad \text{ومنه}$$

$$[\alpha] = n \left[\frac{\alpha}{n} \right] + [n\theta] : 0 \leq n\theta < n$$

$$\frac{[\alpha]}{n} = \left[\frac{\alpha}{n} \right] + \frac{[n\theta]}{n} : 0 \leq [n\theta] < n\theta < n \quad \text{أي}$$

$$\left[\frac{[\alpha]}{n} \right] = \left[\frac{\alpha}{n} \right] + 0, \quad 0 \leq \frac{[n\theta]}{n} < 1 \quad \text{و منه}$$

- نتيجة : إن $\left[\frac{[a/n]}{m} \right] = \left[\frac{a}{n.m} \right]$ حيث $a, n, m \in \mathbb{Z}^+$

(3) إذا كان n عدداً صحيحاً أكبر من الواحد و α عدد حقيقي أكبر أو يساوي الواحد فإن : $[\alpha] > \left[\frac{\alpha}{n} \right]$

البرهان : نكتب : $\frac{\alpha}{n} = \left[\frac{\alpha}{n} \right] + \theta : 0 < \theta < 1$

$$\alpha = n \left[\frac{\alpha}{n} \right] + n\theta : 0 \leq n\theta < n \quad \text{ومنه :}$$

$$[\alpha] = n \left[\frac{\alpha}{n} \right] + [n\theta] \quad \text{ولما كان } n \left[\frac{\alpha}{n} \right] \text{ عدداً صحيحاً فإن :}$$

$$0 < [n\theta] \quad , \quad n > 1 \quad \text{و} \quad [\alpha] > \left[\frac{\alpha}{n} \right] \quad \text{لأن}$$

$$\left[\frac{ab}{n} \right] \geq a \left[\frac{b}{n} \right] \quad \text{فإن} \quad a, b, n \in \mathbb{Z}^+ \quad \text{(4) إذا كان}$$

البرهان : لدينا من تعريف دالة الجزء الصحيح :

$$\frac{b}{n} = \left[\frac{b}{n} \right] + \theta : 0 < \theta < 1$$

$$\frac{ab}{n} = a \left[\frac{b}{n} \right] + a\theta : 0 \leq a\theta < a$$

$$\left[\frac{ab}{n} \right] = a \left[\frac{b}{n} \right] + [a\theta] \geq a \left[\frac{b}{n} \right]$$

(5) إذا كانت الأعداد $\alpha_i \in \mathbb{R}$ و $\alpha = \sum_1^k [\alpha_i]$ فإن : $[\alpha] \geq \sum_1^k [\alpha_i]$

$$\alpha_1 = [\alpha_1] + \theta_1 : 0 \leq \theta_1 < 1 \quad \text{البرهان : نكتب}$$

$$\alpha_i = [\alpha_i] + \theta_i : 0 \leq \theta_i < 1$$

$$\alpha_n = [\alpha_n] + \theta_n : 0 \leq \theta_n < 1$$

$$\alpha = \sum_1^n [\alpha_i] + \sum_1^n \theta_i \Rightarrow [\alpha] = \sum_1^n [\alpha_i] + [\sum_1^n \theta_i] \quad \text{بالجمع نجد}$$

$$[\alpha] \geq \sum_1^n [\alpha_i] \quad \text{ولما كانت } \theta_i \text{ كلها أعداد موجبة فإن}$$

- نتيجة : ينتج من الخاصة الأخيرة مباشرة أن : $\left[\frac{n}{p} \right] \geq \left[\frac{n_1}{p} \right] + \left[\frac{n_2}{p} \right] + \dots + \left[\frac{n_k}{p} \right]$

حيث p عدد صحيح غير الصفر و n_i أعداد صحيحة و $n = \sum_1^k n_i$

2-3-9 مبرهنة : إذا كان $n \in \mathbb{Z}^+$ و p عدداً أولياً فإن أس أكبر قوة لـ p تقسم $n!$ وترمز

$$H_p(n!) = \left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \dots + \left[\frac{n}{p^k} \right] = \sum_{i=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^i} \right] \quad : H_p(n!) \text{ يساوي}$$

حيث $\left[\frac{n}{p^k} \right] \geq 1$ و $\left[\frac{n}{p^{k+1}} \right] = 0$ وبقيّة الحدود التالية معدومة .

البرهان :

لنرتب الأعداد من 1 إلى n أي نرتب مضاريب $n! = 1.2 \dots n$ كما يلي:

$$1, 2, \dots, p, p+1, \dots, 2p, \dots, 3p, \dots, pp, p^2+1, \dots, 2p^2, \dots, pp^2, \dots, n$$

لنفترض أن الأعداد التي تقبل القسمة على p من بين هذه الأعداد هي : $p, 2p, \dots, t_1 p$ حيث t_1

هو أكبر عدد صحيح يحقق العلاقة $t_1 p \leq n$ أي أن t_1 هو أكبر عدد صحيح أصغر أو يساوي $\frac{n}{p}$

أي $(t_1 + 1) < \frac{n}{p} \leq t_1$ ومنه $t_1 = \left[\frac{n}{p} \right]$ أي أن هناك $\left[\frac{n}{p} \right]$ مضاعفاً لـ p بين مضاريب $n!$

ألا وهي : $p, 2p, 3p, \dots, \left[\frac{n}{p} \right] p$.

وبمحاكمة شبيهة نجد أن عدد الأعداد التي تقبل القسمة على p^2 من بين مضاريب $n!$ هو

$$t_2 = \left[\frac{n}{p^2} \right] \text{ وهي : } p^2, 2p^2, \dots, \left[\frac{n}{p^2} \right] p^2$$

ومن بين هذه الأعداد يوجد $\left[\frac{n}{p^3} \right]$ عدداً يقبل القسمة ثانية على p أي يقبل القسمة على p^3 ،

وهكذا بعد تكرار هذه المحاكمة عدداً منتهياً من المرات نجد أن عدد المرات التي يقسم بها p العدد $n!$

هو :

$$\left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \dots + \left[\frac{n}{p^k} \right] = t_1 + t_2 + \dots + t_k$$

أي أن $n!$ تقبل القسمة على $p^{t_1+t_2+\dots+t_k}$ ومنه $H_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^i} \right]$

مثال (1) : لنوضح المبرهنة السابقة بالمثل التالي : إذا كان $p = 3$ و $n = 19$

$$19! = 1.2.3 \dots 6..9 \dots 12 \dots 15..18.19 \quad \text{فإن}$$

مضاعفات العدد 3 من بين مضاريب $19!$ هي $\{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$ و عددها $\left[\frac{19}{3} \right] = 6$.

مضاعفات العدد 3^2 هي $\{9, 18\}$ عددها $\left[\frac{19}{9} \right] = 2$ وعدد مضاعفات العدد $3^3 = 27$ صفر

أي $H_3(19!) = 6 + 2 = 8$ و $3^8 | 19!$ في حين $3^9 \nmid 19!$.

تمرين : ما هو عدد الأصفار في نهاية العدد $50!$

الحل : لتعيين عدد الأصفار في نهاية $50!$ نبحث عن أكبر قوة للعدد 10

تقسم $50!$ ولكن $10 = 2 \cdot 5$ لذا نبحث عن $H_2(50!)$ و $H_5(50!)$ فنجد :

$$H_2(50!) = \left[\frac{50}{2} \right] + \left[\frac{50}{4} \right] + \left[\frac{50}{8} \right] + \left[\frac{50}{16} \right] + \left[\frac{50}{32} \right] + \left[\frac{50}{64} \right]$$

$$= 25 + 12 + 6 + 3 + 1 + 0 = 47 \Rightarrow 2^{48} \nmid 50! \quad \text{و} \quad 2^{47} | 50!$$

$$H_5(50!) = \left[\frac{50}{5} \right] + \left[\frac{50}{25} \right] + 0 = 10 + 2 = 12 \Rightarrow 5^{13} \nmid 50! \quad \text{و} \quad 5^{12} | 50!$$

بما كان $(2,5) = 1$ فإن أس أكبر قوة للعدد 10 تقسم $50!$ هو 12 وعدد الأصفار في نهاية $50!$ هو 12.

10-3-2 مبرهنة: إذا كتب العدد الصحيح m بالنظام الذي أساسه العدد الأولي p فإن أس أكبر قوة

$$H_p(m!) = \frac{m - \sum_0^r a_i}{p-1} \quad \text{للعـد } p \text{ تقسم } m! \text{ هي}$$

$$m = \sum_{i=0}^r a_i p^i = a_r p^r + a_{r-1} p^{r-1} + \dots + a_1 p + a_0 \quad \text{حيث}$$

البرهان : نكتب حسب المبرهنة السابقة :

$$\begin{aligned} H_p(m!) &= \left[\frac{m}{p} \right] + \left[\frac{m}{p^2} \right] + \dots + \left[\frac{m}{p^r} \right] \\ &= a_r p^{r-1} + a_{r-1} p^{r-2} + \dots + a_1 + \\ &\quad + a_r p^{r-2} + a_{r-1} p^{r-3} + \dots + a_2 + \\ &\quad + \dots \\ &\quad + a_r p + a_{r-1} \\ &\quad + a_r \end{aligned}$$

ومنه

$$H_p(m!) = a_r(1 + p + p^2 + \dots + p^{r-1}) + a_{r-1}(1 + p + p^2 + \dots + p^{r-2}) + \dots + a_1$$

$$H_p(m!) = a_r \frac{p^r - 1}{p-1} + a_{r-1} \frac{p^{r-1} - 1}{p-1} + \dots + a_2 \frac{p^2 - 1}{p-1} + a_1$$

$$H_p(m!) = \frac{a_r p^r + a_{r-1} p^{r-1} + \dots + a_1 p + a_0 - (a_r + a_{r-1} + \dots + a_2 + a_1 + a_0)}{p-1}$$

$$H_p(m!) = \frac{m - \sum_0^r a_i}{p-1}$$

مثال : اكتب العدد 347 بنظام العد الذي أساسه 7 ثم احسب $H_7(347!)$

$$347 = 1(7^3) + 0(7^2) + 0(7) + 4 = (1004)_7 \quad \text{الحل :}$$

$$H_7(347!) = \frac{347 - (5)}{7-1} = 57 \quad \text{و بتطبيق المبرهنة الأخيرة نجد :}$$

11-3-2 مبرهنة : إذا كان n و r عددين صحيحين وكان $1 \leq r < n$

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad \text{فإن : هو عدد صحيح}$$

البرهان (غير مطلوب): من أجل البرهان يكفي أن نثبت أن أس أكبر قوة لأي عدد أولي p يقسم المقام أصغر أو يساوي أس أكبر قوة لهذا العدد الأولي p تقسم البسط لذا نكتب حسب الخاصة (5) من

$$\begin{aligned} \text{خواص دالة الجزء الصحيح نكتب : } & \left[\frac{n}{p^k} \right] \geq \left[\frac{r}{p^k} \right] + \left[\frac{n-r}{p^k} \right] \\ \text{وبالجمع على } k & \text{ نجد : } \sum_{k \geq 1} \left[\frac{n}{p^k} \right] \geq \sum_{k \geq 1} \left[\frac{r}{p^k} \right] + \sum_{k \geq 1} \left[\frac{n-r}{p^k} \right] \\ \text{ومنه} & H_p(n!) \geq H_p(r!(n-r)!) \end{aligned}$$

أي أن أي عامل للمقام يقسم البسط والنتيجة عدد صحيح .

- **نتيجة :** إن جداء n من الأعداد الصحيحة المتتالية الموجبة يقبل القسمة على $n!$

$$\text{البرهان : نجد أن : عدد صحيح} = \frac{(k+1)(k+2)\dots(k+n)}{n!} = \frac{k!(k+1)\dots(k+n)}{k!n!} = \frac{(k+n)!}{k!n!}$$

- **ملاحظة :** يمكن ببساطة إثبات العلاقة التالية

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k \quad \text{هو عدد صحيح علماً أن : } \frac{n!}{n_1!n_2!\dots n_k!}$$

$$\text{تمرين : أثبت أن إذا كان } m, n \in \mathbb{Z}^+ \text{ فإن } \frac{(2m)!(3n)!}{(m!)^2(n!)^3} \text{ هو}$$

عدد صحيح .

$$\text{الحل : لدينا } 2m = m + m \text{ و } 3n = n + n + n$$

$$\text{عددهما جداهما عدد صحيح . } \frac{(3n)!}{(n!)^3} \text{ و } \frac{(2m)!}{m!m!}$$

2-3-12 مبرهنة : إذا كانت f , F دالتين عدديتين وكان $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$

$$\text{فإن : } \left[\frac{N}{k} \right] \cdot \sum_{k=1}^N f(k) = \sum_{n=1}^N F(n) \text{ من أجل أي عدد صحيح موجب } N .$$

البرهان (غير مطلوب): بما أن $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$ فإن $\sum_{n=1}^N F(n) = \sum_{n=1}^N \sum_{d|n} f(d)$

لنجمع الحدود التي تحوي قيماً متساوية لـ $f(d)$ في المجموع المضاعف السابق . نلاحظ أنه إذا كان

العدد k عدداً صحيحاً $N \geq k$ فإن هذا العدد k يظهر في المجموع $\sum_{d|n} f(d)$ إذا وفقط إذا كان k قاسماً

لـ n (إن مجموعة الأعداد $\sum_{d|n} f(d)$ غير خالية لأن كل عدد هو قاسم لنفسه على الأقل) ، فاحساب

عدد المجاميع $\sum_{d|n} f(d)$ التي يظهر فيها الحد $f(k)$ ، يكفي أن نحسب عدد الأعداد الصحيحة

من بين الأعداد $1, 2, \dots, N$ التي تقبل القسمة على k . إن هذا العدد كما سبق ورأينا

يساوي $\left[\frac{N}{k} \right]$. وهذه الأعداد هي $k, 2k, 3k, \dots, \left[\frac{N}{k} \right] k$ وهكذا نجد أنه من أجل كل عدد k

حيث $1 \leq k \leq N$ فإن $f(k)$ هو حد في المجموع $\sum_{d|n} f(d)$ وذلك من أجل $\left[\frac{N}{k} \right]$ من

الأعداد الصحيحة الموجبة المختلفة والتي هي أصغر أو تساوي N مما يمكننا من كتابة المجموع

$$\text{المضاعف على النحو : } \sum_{n=1}^N \sum_{d|n} f(d) = \sum_{k=1}^N f(k) \left[\frac{N}{k} \right] \text{ وهو المطلوب .}$$

- **تعريف:** إذا كان $\alpha \in \mathbb{R}$ و $f(n)$ دالة عددية فإن: $\sum_{n=1}^{\alpha} f(n) = \sum_{n=1}^{[\alpha]} f(n)$
- **نتيجة:** ينتج من المبرهنة الأخيرة مباشرة أنه إذا كان f , F دالتين عدديتين وكان
- . $\sum_{n=1}^{\alpha} F(n) = \sum_{n=1}^{[\alpha]} \sum_{d|n} f(d)$ فإن $\alpha \in \mathbb{R}$ و $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$

2-3-13 تعريف مجموعة البواقي المختزلة

إذا كانت A مجموعة بواقي تامة بالمقاس m فإن المجموعة الجزئية T من A التي تحوي الأعداد الأولية نسبياً مع m تسمى مجموعة بواقي مختزلة بالمقاس m أي أن

$$T = \{a \in A : (a, m) = 1\} , \text{ حيث } A = \{0, 1, 2, \dots, m-1\}$$

مثال (1): إن المجموعة $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ هي مجموعة بواقي تامة بالمقاس 6 والمجموعة $T = \{1, 5\}$ هي مجموعة بواقي مختزلة بالمقاس 6 .

$$\text{مثال (2):} \text{ إن المجموعة } A(12) = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, 6\}$$

هي مجموعة بواقي تامة بالمقاس 12 والمجموعة $T(12) = \{\pm 1, \pm 5\}$ هي مجموعة بواقي مختزلة بالمقاس 12. ومن الواضح أن عدد عناصر أي مجموعتي بواقي مختزلة بالمقاس m متساوٍ.

2-3-14 دالة اولر . Euler's - Function ϕ

- **تعريف:** من أجل أي عدد صحيح موجب m فإن دالة اولر $\phi(m)$ هي عدد العناصر التي لا تتجاوز m وأولية نسبياً مع m ، أي هي عدد عناصر أي مجموعة بواقي مختزلة بالمقاس m .

$$\text{مثال : } \phi(1) = 1, \phi(2) = 1, \phi(3) = 2, \text{ لأن الأعداد التي هي } 3 \geq$$

والأولية نسبياً مع 3 هي 1 , 2 ، حيث : $T(3) = \{1, 2\}$ وعدد العناصر = $\phi(3) = 2$ ،

$$\text{لإيجاد } \phi(5) \text{ نكتب : } A(5) = \{0, 1, 2, 3, 4\} \text{ و } T(5) = \{1, 2, 3, 4\}$$

وعدد العناصر $T(5)$ هي 4 أي : $\phi(5) = 4$.

2-3-15 مبرهنة : إن دالة اولر دالة عددية ضربية .

البرهان (غير مطلوب) : -1 إن $\phi(1) = 1$ حسب تعريف الدالة .

- 2 إذا كان a, b عددين صحيحين موجبين وكان

$$(a, b) = 1 \text{ فعلينا أن نثبت أن } \phi(a.b) = \phi(a)\phi(b)$$

نلاحظ أنه إذا كان أحد العددين a أو b مساوياً للواحد فالمبرهنة صحيحة لذا لنفترض أن

$a > 1$ و $b > 1$ و لنرتب الأعداد من 1 إلى ab كما يلي :

$0.a + 1$	2	3		r		a
$1.a + 1$	$a + 2$	$a + 3$		$a + r$		$2a$
$2.a + 1$	$2a + 2$	$2a + 3$		$2a + r$		$3a$
....						
$qa + 1$	$qa + 2$			$qa + r$		$(q + 1)a$
....						
$(b - 1)a + 1$	$(b - 1)a + 2$			$(b - 1)a + r$		ba

نلاحظ أن عناصر كل سطر في هذه المصفوفة تشكل مجموعة بواق تامة بالمقاس a وأن عناصر

كل عمود تشكل مجموعة بواق تامة بالمقاس b إذ نلاحظ أن عدد عناصر كل سطر يساوي a وأن أي

عنصرين مختلفين غير متطابقين بالمقاس a لأنه لو كان: $qa + s \equiv qa + t \pmod{a}$ لنتج

$s \equiv t \pmod{a}$ وهذا غير ممكن إن كان العنصران مختلفين، وبشكل مشابه نجد أن عدد عناصر كل

عمود يساوي b وأنه لو كان: $qa + r \equiv q_1a + r \pmod{b}$

لنتج $qa \equiv q_1a \pmod{b}$ ولما كان $(a, b) = 1$ فإن هذا يؤدي إلى :

$q \equiv q_1 \pmod{b}$ وهذا غير ممكن من أجل أي عنصرين مختلفين من العمود .

ومن جهة أخرى نعلم أن عدد العناصر الأولية نسبياً مع a في كل سطر يساوي $\varphi(a)$ وأن العنصر

$(qa + r, a) = 1$ إذا وفقط إذا كان $(r, a) = 1$ لذا نأخذ أي عمود r يحقق الشرط

$(r, a) = 1$ ونلاحظ أن عدد عناصر هذا العمود الأولية نسبياً مع b يساوي $\varphi(b)$ مما يدل على أن

عدد العناصر من المصفوفة السابقة التي هي أولية نسبياً مع a ومع b بآن واحد أي التي هي أولية

نسبياً مع $a \cdot b$ يساوي $\varphi(a)\varphi(b)$ مما يثبت أخيراً أن $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a)\varphi(b)$.

مثال :

$$\varphi(12) = \varphi(3) \cdot \varphi(4) = (2)(2) = 4$$

$$\varphi(15) = \varphi(3) \cdot \varphi(5) = (2)(4) = 8$$

2-3-16 مبرهنة : إن $\varphi(p) = p - 1$ حيث p عدد أولي .

الإثبات: نعلم أن مجموعة البواق التامة الصغرى للعدد الأولي p هي: $A = \{0, 1, 2, 3, \dots, p - 1\}$

و مجموعة البواق المختزلة بالمقاس p هي: $T = \{1, 2, 3, \dots, p - 1\}$

وعدد عناصر $T(p)$ يساوي $p-1$ أي: $\varphi(p) = p - 1$

2-3-17 مبرهنة : إذا كان p عدداً أولياً فإن :

$$\alpha > 0 \quad \text{حيث} \quad \varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$$

البرهان : إن مجموعة البواقي التامة للعدد p^α هي :

$$A = \{1, 2, \dots, p, p+1, \dots, 2p, \dots, p^2, \dots, p^{\alpha-1}, 2p^{\alpha-1}, \dots, p \cdot p^{\alpha-1}\}$$

وعناصر A التي لها عامل مشترك مع p^α هي $p, 2p, \dots, p^{\alpha-1}p$ وعددها $p^{\alpha-1}$ أي أن عدد

العناصر من A الأولية نسبياً مع p^α هي :

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1}(p-1) = p^\alpha \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

$$\varphi(8) = \varphi(2^3) = 2^3(2-1) = 4 \quad \text{مثال :}$$

2-3-18 مبرهنة : إذا كان n عدداً صحيحاً موجباً $n > 1$ وكان $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$

حيث $p_1, p_2, \dots, p_r$ أوليات مختلفة فإن : $\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$

البرهان : بما أن أعداد أولية نسبياً متتى ومتى وبما أن دالة أولر دالة عددية ضربية فإن :

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \varphi(p_1^{\alpha_1}) \varphi(p_2^{\alpha_2}) \dots \varphi(p_r^{\alpha_r}) \\ &= p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) \end{aligned}$$

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right)$$

$$\varphi(360) = \varphi(2^3 \cdot 3^2 \cdot 5) = 360 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 96 \quad \text{مثال :}$$

2-3-19 مبرهنة أولر : إذا كان $(a, m) = 1$ فإن $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

البرهان : إذا كانت $T = \{a_1, a_2, \dots, a_{\varphi(m)}\}$ مجموعة بواقي مختزلة بالمقاس m ، فإن

$$T_1 = \{a_1 a, a_2 a, \dots, a_{\varphi(m)} \cdot a\} \quad \text{المجموعة}$$

هي أيضاً مجموعة بواقي مختزلة بالمقاس m ، إذ أن كل عنصر من T_1 أولي نسبياً مع m وضوحاً

كما أن أي عنصرين من T_1 غير متطابقين بالمقاس m ، لأنه لو كان $a_i \cdot a \equiv a_j \cdot a \pmod{m}$

لكان $a_i \equiv a_j \pmod{m}$ وهذا مستحيل لأنها عناصر من T . وبالتالي فإن كل عنصر من T يطابق

عنصر واحد فقط من T_1 الأمر الذي يؤدي إلى أن جداء عناصر T يطابق جداء عناصر T_1 بالمقاس

m ونكتب

$$a_1 \cdot a_2 \dots a_{\varphi(m)} \equiv a_1 \cdot a_2 \dots a_{\varphi(m)} \cdot a^{\varphi(m)} \pmod{m}$$

$$\text{ولما كان} \quad (a_1 \cdot a_2 \dots a_{\varphi(m)}, m) = 1 \quad \text{فإن} \quad a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

$$a^{\varphi(15)} \equiv 2^8 \equiv 1 \pmod{15} \quad \text{مثال :}$$

2-3-20 نتيجة : إن مبرهنة فيرما الصغرى هي حالة خاصة من مبرهنة أولر إذ لو كان المقاس m

$$\text{عدداً أولياً لحصلنا على : } a^{\varphi(p)} \equiv a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

تمرين : أوجد رقمي الأحاد والعشرات للعدد 2^{256} .

الحل : إن العدد المؤلف من رقمي الأحاد والعشرات يساوي باقي قسمة 2^{256} على العدد 100 ولما

$$\text{كان } (3, 100) = 1 \text{ فإن } 3^{\varphi(100)} \equiv 1 \pmod{100} \text{ نحسب } \varphi(100) \text{ فنجد :}$$

$$\varphi(100) = \varphi(2^2 \cdot 5^2) = 100 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 40$$

$$3^{40} \equiv 1 \pmod{100} \text{ أي :}$$

$$\text{ولدينا } 256 = (40)(6) + 16 \text{ لذا نكتب :}$$

$$3^{256} \equiv (3^{40})^6 \cdot 3^{16} \equiv 3^{16} \pmod{100} \equiv (81)^4 \equiv (-19)^4 \pmod{100}$$

$$3^{256} \equiv (361)^2 \equiv (61)^2 \equiv 21 \pmod{100}$$

والرقمين المطلوبين 21 .

2-3-21 تطبيق هام : يمكن استخدام مبرهنة أولر في إيجاد حلول التطابقات الخطية

$$\text{مثال (1) : لنوجد حلول التطابق } 6x \equiv 15 \pmod{21}$$

نلاحظ أن $3 | 15, (6, 21) = 3$ أي أن للتطابق ثلاثة حلول غير متطابقة بالمقاس 21 .

$$\text{نختصر طرفي التطابق على 3 فنجد : } 2x \equiv 5 \pmod{7}$$

$$\text{ولدينا } \varphi(7) = 6 \text{ ، نضرب طرفي التطابق بـ } 2^5 \text{ فنجد : } 2^6 \cdot x \equiv 5 \cdot 2^5 \pmod{7}$$

$$\text{وحسب مبرهنة أولر } 2^6 \equiv 1 \pmod{7} \text{ مما يعطي}$$

$$x \equiv 5 \cdot 2^5 \pmod{7} \equiv 5 \cdot 2^3 \cdot 2^2 \pmod{7} \equiv 5 \cdot 2^2 \pmod{7}$$

$$x \equiv 20 \pmod{7} \equiv 6 \pmod{7}$$

وجميع حلول التطابق غير المتطابقة بالمقاس 21 هي $x = 6 + 7t ; t = 0, 1, 2$

أي هي : 6 , 13 , 20 .

$$\text{مثال (2) : لنوجد حل التطابق } 6x \equiv 15 \pmod{29}$$

الحل : إن العدد 29 عدد أولي فالتطابق حل وحيد يعطى بالعلاقة : $x \equiv 15 \cdot 6^{\varphi(29)-1} \pmod{29}$

$$\text{ولما كان } \varphi(29) = 28 \text{ فالحل هو } x \equiv 6^{28} \cdot 15 \pmod{29}$$

$$x \equiv (36)^{14} \cdot 15 \pmod{29} \equiv (7)^{14} \cdot 15 \pmod{29} \equiv (49)^7 \cdot 15 \pmod{29}$$

$$\equiv (20)^7 \cdot 15 \pmod{29} \equiv 2^6 \cdot (2 \cdot 15) \cdot 10^7 \pmod{29} \equiv 2^6 \cdot 10^7 \pmod{29}$$

$$x \equiv 6 \cdot 10^7 \pmod{29} \equiv 2 \cdot 10^6 \pmod{29}$$

ما تجدر ملاحظته أن الحل بهذه الطريقة يصعب كلما كانت قيمة المقاس كبيرة .

- تمهيدية : إذا مسح العدد d جميع قواسم n فإن $\frac{n}{d}$ يسمح أيضاً بجميع قواسم n لأنه من أجل كل $d_1 = \frac{n}{d} | n, n = dd_1 \Leftrightarrow d | n$.

مثال : إن قواسم العدد 12 هي $\{1,2,3,4,6,12\}$ وقيم $\frac{n}{d}$ المقابلة لهذه القواسم هي : $\{12,6,4,3,2,1\}$ أي هي جميع قواسم n .

2-3-22 مبرهنة : إذا كان $n \geq 1$ فإن $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

البرهان (غير مطلوب) : لنوزع الأعداد من 1 إلى n إلى صفوف كما يلي : إذا كان d أحد قواسم n

فإن : $S_d = \{m: d = (m, n), 1 \leq m \leq n\}$

ونعلم أنه إذا كان $(m, n) = d$ فإن $m = m_0 d$, $n = n_0 d$, $(n_0, m_0) = 1$ ،

ويقابل كل قيمة لـ m قيمة واحدة d وقيمة واحدة m_0 لذا فإن عدد عناصر كل مجموعة من S_d

يساوي عدد الأعداد $m_0 = \frac{m}{d}$ الأولية نسبياً مع $n_0 = \frac{n}{d}$ التي لا تتجاوز n_0 أي أن عدد عناصر

المجموعة S_d يساوي عدد الأعداد الموجبة التي لا تتجاوز $\frac{n}{d}$ وأولية نسبياً معها أي يساوي $\varphi(\frac{n}{d})$.

ولما كان كل من الأعداد $\{1,2,\dots,n\}$ ينتمي إلى صف واحد فقط من الصفوف S_d فإننا نجد

$$n = \sum_{d|n} \varphi(\frac{n}{d}) = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

مثال (1) : لنوضح طريقة إثبات المبرهنة السابقة بالمثال التالي :

لتكن $n = 10$ إن قواسم n هي بالتالي $\{1,2,5,10\}$ لنحسب S_d :

$$S_1 = \{m: (m, 10) = 1, 1 \leq m \leq 10\} = \{1,3,7,9\}$$

$$\text{عدد عناصر } S_1 = \varphi(\frac{10}{1}) = \varphi(2 \times 5) = 1 \times 4 = 4$$

$$S_2 = \{m: (m, 10) = 2, 1 \leq m \leq 10\} = \{2,4,6,8\}$$

$$\text{عدد عناصر } S_2 = \varphi(\frac{10}{2}) = \varphi(5) = 4 = S_2$$

$$S_5 = \{m: (m, 10) = 5, 1 \leq m \leq 10\} = \{5\}$$

$$\text{عدد عناصر } S_5 = \varphi(\frac{10}{5}) = 1 = S_5$$

$$S_{10} = \{m: (m, 10) = 10, 1 \leq m \leq 10\} = \{10\}$$

$$\text{عدد عناصر } S_{10} = \varphi(\frac{10}{10}) = \varphi(1) = 1 = S_{10}$$

وبالتالي :

$$n = \varphi(10) + \varphi(5) + \varphi(2) + \varphi(1) = 4 + 4 + 1 + 1 = 10$$

مثال (2) : إذا كان $n = 25$ فإن قواسم العدد 25 هي $\{25,5,1\}$

$$S_1 = \{m: (m, 25) = 1, 1 \leq m \leq 25\} \Rightarrow \varphi(25) = \varphi(5^2)$$

$$= 5(5 - 1) = 20 = S_1 \text{ عدد عناصر}$$

$$S_5 = \{m: (m, 25) = 5, 1 \leq m \leq 25\} \Rightarrow \varphi\left(\frac{25}{5}\right) = \varphi(5) = 4$$

$$4 = S_5 \text{ عدد عناصر}$$

$$S_{25} = \{25\} \Rightarrow \varphi\left(\frac{25}{25}\right) = \varphi(1) = 1 = S_{25} \text{ عدد عناصر}$$

$$\varphi(25) + \varphi(5) + \varphi(1) = \sum_{d|25} \varphi(d) = 20 + 4 + 1 = 25$$

تمرين : أثبت أن $f(n) = 3^{10n+2} + 5^{10n+3} - 2$ يقبل القسمة على 22 علماً أن $n \geq 0$.

الحل: نلاحظ أن $(3, 22) = 1$ و $(5, 22) = 1$ فحسب مبرهنة أولر نكتب :

$$3\varphi(22) \equiv 5\varphi(22) \equiv 1 \pmod{22} \quad \text{و} \quad \varphi(22) = \varphi(11) \cdot \varphi(2) = 10$$

$$\text{ومنه : } (3^{10})^n \equiv 1 \pmod{22} \text{ و } (5^{10})^n \equiv 1 \pmod{22}$$

نعوض في عبارة $f(n)$ فنجد :

$$f(n) \equiv 3^{10n+2} + 5^{10n+3} - 2 \equiv 3^2 + 5^2 - 2 \equiv 132 \equiv 0 \pmod{22}$$

2-3-26 الدالتان $\sigma(n), \tau(n)$

- **تعريف :** الدالة $\tau(n)$ دالة عددية قيمتها عدد القواسم الموجبة المختلفة للعدد $n \in \mathbb{Z}^+$ ،

ومن تعريف الدالة $\tau(n)$ يمكن أن نكتب : $\tau(n) = \sum_{d|n} 1$

وعلى سبيل المثال فإن القواسم الموجبة للعدد 12 هي : 1, 2, 3, 4, 6, 12 وعددها $\tau(12) = 6$

مبرهنة : الدالة $\tau(n)$ دالة ضربية .

في الحقيقة إن الدالة $f(d)$ دالة ضربية لأن :

$$f(d_1 \cdot d_2) = f(d_1) \cdot f(d_2) = 1 \cdot 1 = 1 \quad \text{و} \quad f(1) = 1$$

ونعلم أنه إذا كانت f دالة ضربية فإن الدالة المعرفة بالمساواة $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$ هي دالة ضربية

أي الدالة المعرفة بالمساواة $\tau(n) = \sum_{d|n} 1$ هي دالة ضربية .

2-3-27 تعيين الدالة $\tau(n)$

(1) إذا كانت $n = p^a$ حيث p عدد أولي و $a \geq 1$ فإن قواسم n الموجبة

هي $1, p, p^2, \dots, p^a$ وعددها $a+1$ أي $\tau(p^a) = a+1$

(2) إذا كانت $n > 1$ و كتبت n بالشكل القانوني أي: $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$

فإن : $\tau(n) = (a_1+1)(a_2+1) \dots (a_k+1)$

الإثبات : بما أن دالة ضربية وبما أن أولية نسبياً متنى متنى فإن

$$\tau(n) = \tau(p_1^{a_1})\tau(p_2^{a_2})\dots\tau(p_k^{a_k})$$

$$\tau(n) = (a_1+1)(a_2+1) \dots (a_k+1) \quad \text{أي}$$

أمثلة :

(1) لنحسب $\tau(p)$ حيث p عدد أولي:

$$\tau(5) = \tau(11) = 2 \quad \text{وبالتالي} \quad \tau(p) = 1 + 1 = 2$$

(2) لنحسب $\tau(4), \tau(63)$

$$\tau(63) = \tau(3^2 \cdot 7) = (2+1)(2) = 6, \quad \tau(4) = \tau(2^2) = 2+1 = 3$$

2-3-28 : تعريف الدالة σ : هي دالة عددية قيمتها عند العدد n هي $\sigma(n)$ تساوي مجموع القواسم الموجبة المختلفة للعدد n حيث $n \in \mathbb{Z}^+$.

$$\text{فعلى سبيل المثال : } \sigma(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$$

$$\sigma(4) = 7, \quad \sigma(3) = 4, \quad \sigma(2) = 3, \quad \sigma(1) = 1$$

ينتج من تعريف الدالة $\sigma(n)$ أنه بالإمكان كتابتها على النحو : $\sigma(n) = \sum_{d|n} d$

2-3-29 : مبرهنة : الدالة σ هي دالة ضربية .

الإثبات : إن الدالة $f(d) = d$ لكل d هي دالة ضربية تماماً لأن :

$$f(d_1 \cdot d_2) = d_1 \cdot d_2 = f(d_1) \cdot f(d_2) \quad \text{و} \quad f(1) = 1$$

ولما كانت $\sigma(n) = \sum_{d|n} f(d)$ و $f(d)$ دالة ضربية فإن $\sigma(n)$ هي دالة ضربية .

2-3-30 : حساب قيمة الدالة $\sigma(n)$:

(1) إذا كان $n = p^a$ فإن جميع القواسم الموجبة لـ n هي $1, p, p^2, \dots, p^a$ ومجموعها

$$\sigma(n) = 1 + p + p^2 + \dots + p^a \quad \text{أي} \quad \sigma(n) = \frac{p^{a+1} - 1}{p - 1}$$

(2) إذا كان $n > 1$ و كتب بالشكل القانوني $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ بما أن دالة ضربية نجد :

$$\sigma(n) = \sigma(p_1^{a_1})\sigma(p_2^{a_2})\dots\sigma(p_k^{a_k}) = \frac{p_1^{a_1+1} - 1}{p_1 - 1} \dots \frac{p_k^{a_k+1} - 1}{p_k - 1}$$

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{a_i+1} - 1}{p_i - 1} \quad \text{ويمكن كتابة عبارة } \sigma(n) \text{ كما يلي :}$$

أمثلة : $\sigma(p) = \frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1$ حيث p عدد أولي ومنه :

$$\sigma(5) = 6, \sigma(11) = 12, \sigma(3) = 4$$

$$\sigma(180) = \sigma(2^2) \cdot \sigma(3^2) \cdot \sigma(5) = \frac{2^3-1}{1} \cdot \frac{3^3-1}{2} \cdot 6 = 546$$

- ملاحظة : إن الدالتين $\sigma(n), \tau(n)$ ليستا ضربيتين تماماً إذ نلاحظ أن:

$$\tau(2) \cdot \tau(10) = 2 \cdot 4 = 8, \quad \tau(20) = \tau(2^2 \cdot 5) = 3 \cdot 2 = 6$$

$$\tau(2 \cdot (10)) = \tau(20) \neq \tau(2) \cdot \tau(10) \quad \text{وبالتالي}$$

$$\sigma(20) = \sigma(2^2 \cdot 5) = 42 \quad \text{وكذلك فإن}$$

$$\sigma(2) \cdot \sigma(10) = 3 \cdot 18 = 54$$

$$\sigma(2 \cdot (10)) = \sigma(20) \neq \sigma(2) \cdot \sigma(10) \quad \text{أي أن}$$

2-3-31 : تمرين هام :

إن جداء القواسم الموجبة لعدد $n > 1$ يساوي $n^{\tau(n)/2}$

الحل : إذا كان d قاسماً ما لـ n فإن $n = d \cdot d'$

ولما كان عدد القواسم الموجبة لـ $n = \tau(n)$ فإنه لدينا $\tau(n)$ من العلاقات $n = d \cdot d'$ وحاصل

ضرب هذه العلاقات معاً يعطي :

$$n^{\tau(n)} = \prod_{d|n} d \prod_{d'|n} d'$$

ونعلم أنه إذا مسحت d جميع قواسم n فإن $d' = \frac{n}{d}$ تسمح أيضاً بجميع قواسم n مما يدل على

$$\prod_{d|n} d = \prod_{d'|n} d' \quad \text{أن}$$

$$n^{\tau(n)} = (\prod_{d|n} d)^2 \quad \text{الأمر الذي يعطي :}$$

$$n^{\tau(n)/2} = \prod_{d|n} d \quad \text{ومنه}$$

مثال (1) : إن قواسم العدد 16 هي $\{1, 2, 4, 8, 16\}$ و $\tau(16) = 5$

$$\prod_{d|16} d = 16^{\tau(16)/2} = (16)^{5/2} = (4)^5 = 1024 \quad \text{وجداء هذه القواسم :}$$

مثال (2) : أثبت أن $\frac{\sigma(n)}{n} = \sum_{d|n} \frac{1}{d}$

الحل : نعلم أن $\sigma(n) = \sum_{d|n} d$ وأن $\sum_{d|n} \frac{n}{d}$

فإذا كانت جميع قواسم n الموجبة هي $\{d_1, d_2, \dots, d_k\}$

$$\sigma(n) = \frac{n}{d_1} + \frac{n}{d_2} + \dots + \frac{n}{d_k} = n \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \dots + \frac{1}{d_k} \right) \quad \text{فإن}$$

$$\frac{\sigma(n)}{n} = \sum_{d|n} \frac{1}{d} \quad \text{أي}$$

مثال (3) : أوجد العدد الصحيح n الذي يحقق العلاقة :

$$\tau(10n) = 10$$

لدينا $2.5 = 10$ فهو جداء عددين أوليين فقط لذا فإن $10n$ يلزم أن تكون من الشكل

$$10n = 2^a \cdot 5^b \text{ وعندها يكون}$$

$$\tau(10n) = (a + 1)(b + 1) = 10$$

$$a = 1, b = 4 \Leftrightarrow b + 1 = 5, a + 1 = 2 \quad \text{ومنه نجد أنه إما}$$

$$n = 5^3 = 125 \Leftrightarrow 10n = 2.5^4 \quad \text{ومنه فإن}$$

$$b = 1, a = 4 \Leftrightarrow b + 1 = 2, a + 1 = 5 \quad \text{أو}$$

$$n = 2^3 = 8 \Leftrightarrow 10n = 2^4 \cdot 5 \quad \text{و}$$

2-3-32 : الأعداد التامة أو الأعداد الكاملة (Perfect Numbers)

- تعاريف :

• نقول إن العدد الصحيح n هو عدد كامل إذا كان $\sigma(n) = 2n$.

إن أصغر عددين كاملين معروفين هما $n = 6$ حيث $\sigma(6) = \sigma(2) \cdot \sigma(3)$

$$\sigma(6) = 12 = (2)(6) \quad \text{أي} \quad \sigma(6) = \frac{2^2-1}{2-1} \frac{3^2-1}{3-1} = \frac{3(8)}{2} = 12$$

والعدد $n = 28$ حيث $\sigma(28) = \sigma(2^2) \cdot \sigma(7) = (7)(8) = 56 = (2)(28)$

• ونقول إن العدد الصحيح n فوق الكامل إذا كان $\sigma(n) > 2n$.

مثال ذلك العدد 12 حيث $\sigma(12) = \sigma(2^2) \cdot \sigma(3) = 28 > (2)(12)$

• ونقول إن العدد الصحيح n تحت الكامل إذا كان $\sigma(n) < 2n$.

مثال ذلك العدد 8 إذ أن $\sigma(8) = \sigma(2^3) = 15 < (2)(8)$

• نقول إن العددين m, n عددان متحابان إذا كان:

$$\sigma(n) = \sigma(m) = n + m$$

$$\sigma(n) - n = m \wedge \sigma(m) - m = n \quad \text{أو إذا كان}$$

$$220 \quad \text{و} \quad 284 \quad \text{مثال ذلك :}$$

وقد وجد العلماء عدداً من الأعداد الكاملة وكلها زوجية ، هل يوجد عدد كامل فردي ؟ مسألة مفتوحة ،

هل يوجد عدد غير منته من الأعداد الكاملة ؟ لقد وجد أن العدد الخامس هو $p_5 = 33.550336$

وأن العدد السادس مؤلف من عشرة أرقام مما يدل على ندرة هذه الأعداد . ولم يعرف حتى عام 1968

سوى 23 عدداً كاملاً وكلها زوجية ، وقد تبين أنه إن وجد عدد كامل فردي فهو أكبر حتماً من العدد 10^{200} .

إن مسألة البحث عن صيغة للأعداد الكاملة مسألة قديمة وقد أثبت اقليدس أنه إذا كان المجموع $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k-1} = p$ عدداً أولياً فإن العدد $2^{k-1} \cdot p$ هو عدد كامل وعلى سبيل المثال إن : $1 + 2 + 4 = 7$ هو عدد أولي و $(7) (4) = 28$ هو عدد كامل ، وقد أثبت أولر بعد 2000 سنة أن جميع الأعداد الكاملة الزوجية لها هذا الشكل الأمر الذي سنوضحه في المبرهنة التالية:

33-3-2 مبرهنة : إذا كان العدد $2^k - 1$ حيث $k > 1$ أولياً فإن :

$n = 2^{k-1}(2^k - 1)$ هو عدد كامل وكل عدد كامل زوجي هو من الشكل السابق.

البرهان : لنفترض أن العدد $2^k - 1 = p$ عدد أولي ولنكتب $n = 2^{k-1} \cdot p$

نلاحظ أن $(2^k, p) = 1$ لأن p عدد فردي ولأن عوامل 2^{k-1} هي قوى العدد 2 حصراً

لذا يمكن أن نكتب :

$$\sigma(n) = \sigma(2^{k-1})\sigma(p) = (2^k - 1)(p + 1)$$

$$\sigma(n) = (2^k - 1)2^k = 2(2^k - 1)2^{k-1} = 2n$$

و n بالتالي هو عدد كامل .

العكس : لنفترض أن العدد n عدد كامل زوجي. إن أي عدد زوجي n يمكن أن يكتب على النحو

$n = 2^{k-1} \cdot q$ حيث q عدد فردي و $k \geq 2$ ولما كان $(2^{k-1}, q) = 1$ فإن :

$$\sigma(n) = \sigma(2^{k-1})\sigma(q) = (2^k - 1)\sigma(q)$$

$$\sigma(n) = 2n = 2^k q$$

ومن جهة أخرى فإن

$$2^k q = (2^k - 1)\sigma(q) \quad \text{تدل على أن} \quad 2^k - 1 | 2^k \cdot q$$

$$\text{ولما كان} \quad (2^k - 1, 2^k) = 1 \quad \text{فإن} \quad : \quad 2^k - 1 | q$$

لذا يمكن أن نكتب $q = (2^k - 1)M$ نعوض هذه القيمة لـ q في العلاقة

$$2^k q = (2^k - 1)\sigma(q) \quad \text{ونختصر على} \quad (2^k - 1) \quad \text{فنجد أن:} \quad 2^k M = \sigma(q)$$

وبما أن M و q كلاهما يقسم q و $M < q$ فإن : $\sigma(q) \geq q + M$

ولكن : $q + M = 2^k M$ أي أن $\sigma(q) = q + M$ مما يدل على أن للعدد q قاسمان فقط هما

M و q ينتج من ذلك أن q عدد أولي وأن $M = 1$. نعوض في قيمة q لنجد أخيراً أن :

$$q = 2^k - 1 \quad \text{وهو المطلوب .}$$

2-3-34 مبرهنة : إذا كان العدد $a^k - 1$ عدداً أولياً عندما $k \geq 2$, $a > 0$

فإن : $a = 2$ و k عدد أولي .

الإثبات : نعلم أن : $a^k - 1 = (a - 1)(a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1)$

ولما كان $a > 0$ و $k \geq 2$ فإن المقدار $a^{k-1} + a^{k-2} + \dots + a + 1 \geq a + 1 > 1$ وحسب الفرض فإن $a^k - 1$ عدد أولي أي أنّ العامل الثاني لـ $a^k - 1$ يجب أن يساوي الواحد ومنه $a - 1 = 1$ و $a = 2$

ومن جهة ثانية إذا كان k عدداً مؤلفاً لأمكن كتابته على النحو :

حيث $k = r \cdot s$ و $s > 1$ و $r > 1$ وبالتالي فإن :

$$a^k - 1 = (a^r)^s - 1 = (a^r - 1)(a^{r(s-1)} + a^{r(s-2)} + \dots + a^r + 1)$$

ولكن وجدنا أن $a = 2$ و $r > 1$ مما يدل على أن قيمة كل من العاملين في الطرف الثاني أكبر من الواحد وهذا يناقض كون $a^k - 1$ عدداً أولياً مما يثبت أن k لا بد وأن يكون أولياً .

- ملاحظة:

نلاحظ أنه من أجل $k = 2$ فإن $2^2 - 1 = 3$ عدد أولي والعدد $2(2^2 - 1) = 6$ عدد كامل .
ومن أجل $k = 3$ فإن $2^3 - 1 = 7$ عدد أولي والعدد $2^2(2^3 - 1) = 28$ عدد كامل
ومن أجل $k = 5$ فإن $2^5 - 1 = 31$ عدد أولي والعدد $2^4(2^5 - 1) = 496$ عدد كامل
ظن الرياضيون القدماء أن الصيغة $2^p - 1$ تعطي دوماً أعداداً أولية ، إلى أن تم في عام 1536 إثبات أن العدد $2^{11} - 1 = 2047 = (23)(89)$

- ملاحظة :

تسمى الأعداد $M_k = 2^k - 1$ حيث $k \geq 2$ أعداد ميرسن ((Mersenne numbers))

وتدعى الأعداد الأولية $M_p = 2^p - 1$ أوليات ميرسن ، وقد كتب ميرسن عام (1644) أن M_p أعداد أولية من أجل القيم : $p = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257$ ومؤلفة من أجل بقية الأوليات $p < 257$. وقد تحقق أولرعام 1772 من أن M_{31} عدد أولي . ثم أثبت لوكاس عام 1876 أن M_{67} عدد مؤلف ، مخالفا لتوقع ميرسن ، ولكن دون أن يعين عوامله الأولية التي عينها بعد ذلك الرياضي الأمريكي غريديريك نلسون كول عام 1903 .

2-3-35 دالة موبياس (Mobius - function) :

تعريف : نعرف الدالة $\mu(n)$ حيث n عدد صحيح موجب كما يلي :

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{عندما } n = 1 \\ 0 & \text{إذا وجد عدد أولي } p \text{ بحيث } p^2 | n \\ (-1)^r & \text{إذا كان } n = p_1 p_2 \dots p_r \text{ و } p_i \text{ مختلفة أوليات} \end{cases}$$

من التعريف ينتج أن $\mu(1) = 1, \mu(2) = -1, \mu(3) = -1$

$$\mu(4) = 0, \mu(5) = -1, \mu(6) = 1$$

لاحظ أن :

$$\mu(p) = -1 \quad \text{دوماً عندما } p \text{ عدد أولي}$$

$$\mu(p^k) = 0 \quad \text{من أجل } p \text{ عدد أولي و } k \geq 2$$

2-3-36 مبرهنة دالة موبياس ضربية :

الإثبات : إن $\mu(1) = 1$ كما مر معنا ولنتثبت أن $\mu(m.n) = \mu(m) \cdot \mu(n)$

عندما $(m, n) = 1$ نلاحظ أنه إذا كان p عدداً أولياً وكان

$p^2 | m$ أو $p^2 | n$ فإن $p^2 | m.n$ وبالتالي :

$$\mu(m.n) = 0 = \mu(m) \cdot \mu(n)$$

لنفترض الآن أن $m = p_1 p_2 \dots p_r$ وأن $n = q_1 q_2 \dots q_s$

حيث p_i, q_j أوليات مختلفة . فعندها نكتب

$$\mu(m.n) = \mu(p_1 p_2 \dots p_r q_1 q_2 \dots q_s) = (-1)^{r+s} = (-1)^r (-1)^s = \mu(m) \mu(n)$$

2-3-37 مبرهنة : من أجل أي عدد صحيح $n \geq 1$ فإن :

$$G(n) = \sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{عندما } n = 1 \\ 0 & \text{عندما } n > 1 \end{cases}$$

الإثبات (غير مطلوب) : نلاحظ أن $\sum_{d|1} \mu(d) = \mu(1) = 1$ لنفترض أن $n > 1$ ولنحسب $G(n)$

(1) إذا كان $n = p^k$ نكتب :

$$G(n) = G(p^k) = \sum_{d|n} \mu(d) = \mu(1) + \mu(p) + \mu(p^2) + \dots + \mu(p^k)$$

$$G(p^k) = \mu(1) + \mu(p) = 1 + (-1) = 0$$

(2) إذا كان $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$ فإن

$$G(n) = G(p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}) = G(p_1^{k_1}) \cdot G(p_2^{k_2}) \dots G(p_r^{k_r})$$

ولما كانت الدالة $\mu(d)$ ضربية فإن $G(n)$ دالة ضربية وينتج من ذلك أن : $G(n) = 0$

مثال : لتكن $n = 10$ ، إن قواسم n هي $1, 2, 5, 10$ ومنه

$$G(10) = \sum_{d|10} \mu(d) = \mu(1) + \mu(2) + \mu(5) + \mu(10) = 1 + (-1) + (-1) + 1 = 0$$

38-3-2 صيغة موبياس للتعكس (Mobius inversion formula)

إذا كانت : F, f دالتين عدديتين وكان :

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d)$$

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) F(d) \quad \text{فإن :}$$

الإثبات (غير مطلوب): نلاحظ أولاً أن الدالة $f(n)$ تتعين بشكل وحيد بدلالة $F(n)$ لأن :

$$f(2) = F(2) - F(1) \Leftrightarrow F(2) = f(2) + f(1) \quad , \quad F(1) = f(1)$$

$$f(3) = F(3) - F(1) \Leftrightarrow F(3) = f(1) + f(3)$$

وهكذا نوجد قيم f بشكل تدريجي بدلالة F . ولحساب المقدار $\sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right)$ نكتب من تعريف

$$F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{m|\frac{n}{d}} f(m) \quad \text{الدالة } F :$$

نضرب الطرفين بـ $\mu(d)$ ونجمع على قواسم n الموجبة فنجد :

$$* \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{m|\frac{n}{d}} f(m) = \sum_{d|n} \sum_{m|\frac{n}{d}} \mu(d) f(m)$$

ولكن القول إن d تسمح جميع قواسم n و m تسمح جميع قواسم $\frac{n}{d}$ يكافئ القول إن m تسمح

جميع قواسم n و d تسمح جميع قواسم $\frac{n}{m}$ لذا يمكن أن نكتب العلاقة * على النحو :

$$\sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{m|n} f(m) \sum_{d|\frac{n}{m}} \mu(d)$$

ولكن قيمة المجموع $\sum_{d|\frac{n}{m}} \mu(d)$ حسب المبرهنة 37-3-2 تساوي الواحد عندما $\frac{n}{m} = 1$

أي عندما $m = n$ وتساوي الصفر فيما عدا ذلك الأمر الذي يبين أن :

$$\sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{m=n} f(m) \cdot 1 = f(n)$$

- ملاحظة: نعلم أن إذا مسحت d جميع قواسم n فإن $\frac{n}{d}$ تسمح أيضاً قواسم n لذا يمكن أن نكتب :

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) F(d)$$

وعلى سبيل المثال نأخذ $n = 10$ فتكون قواسم n هي $1, 2, 5, 10$ ونكتب

$$\begin{aligned} \sum_{d|10} \sum_{m|\frac{10}{d}} \mu(d)f(m) &= \mu(1)[f(1) + f(2) + f(5) + f(10)] + \\ &+ \mu(2)[f(1) + f(5)] + \mu(5)[f(1) + f(2)] + \mu(10)f(1) \\ &= f(1)[\mu(1) + \mu(2) + \mu(5) + \mu(10)] + f(2)[\mu(1) + \mu(5)] + \\ &+ f(5)[\mu(1) + \mu(2)] + f(10)\mu(1) = \sum_{m|10} \sum_{d|\frac{10}{m}} f(m)\mu(d) \end{aligned}$$

39-3-2 تطبيقات

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d \quad \text{و} \quad \tau(n) = \sum_{d|n} 1 \quad -1 \quad \text{نعلم أن}$$

باستخدام صيغة موبياس للتعاكس نجد أن

$$1 = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right)\tau(d) \quad \text{و} \quad n = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right)\sigma(d)$$

عندما $n \geq 1$

40-3-2 مبرهنة : إذا كانت F, f دالتين عدديتين وكان $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$ وإذا كانت $F(n)$ دالة ضربية فإن f دالة ضربية .

البرهان (غير مطلوب)

ونهاية هذا الفصل سنورد تعريفاً لدالتين عدديتين دون التعرض لخواصهما

تعريف (1) : دالة ليوفيل ($Liouville's Function$) $\lambda(n)$

نعرف دالة ليوفيل كما يلي :

$$\lambda(n) = \begin{cases} 1 & \text{عندما } n = 1 \\ (-1)^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_r} & \text{عندما } n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r} \end{cases}$$

$$\lambda(1) = 1, \lambda(2) = \lambda(3) = \lambda(5) = -1$$

مما يدل على أن

$$\lambda(4) = \lambda(6) = 1, \lambda(7) = \lambda(8) = -1, \lambda(9) = \lambda(10) = 1$$

ويلاحظ مباشرة من التعريف أنها دالة ضربية .

تعريف (2) : دالة مانجولد $\Lambda(n)$ (Mangoldt Function)

نعرف دالة مانجولد كما يلي :

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p & \text{عندما } n = p^k \text{ و } p \text{ أولي و } k \geq 1 \\ 0 & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

تمرين : برهن أن

$$1. \sum_{d|n} \Lambda(n) = \log n$$

$$2. \Lambda(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \log d$$

تمارين

(1) أثبت أنه إذا كان $\alpha, \beta \in \mathfrak{R}$ فإن :

$$1) [4\alpha] + [4\beta] \geq 2[\alpha] + 2[\beta] + [\alpha + \beta]$$

$$2) [4\alpha] + [4\beta] \geq 3[\alpha] + 3[\beta] + [\alpha + \beta]$$

$$3) [3\alpha] + [3\beta] \geq [\alpha] + [\beta] + 2[\alpha + \beta]$$

(2) إذا كان n, m عددين صحيحين فأثبت أن :

$$1) \frac{(4m)!(4n)!}{(m!)^2(n!)^2[(m+n)!]^2}$$

هو عدد صحيح

$$2) \frac{(4m)!(4n)!}{(m!)^3(n!)^3(m+n)!}$$

هو عدد صحيح

$$3) \frac{(3m)!(3n)!}{m!n![(m+n)!]^2}$$

هو عدد صحيح

(3) أثبت أن أس أكبر قوة للعدد 7 تقسم $(7^n - 3)!$ هي $(7^n - 6n - 1)/6$

(4) أثبت أن أس أكبر قوة للعدد 5 تقسم $(5^n - 4)!$ هي $(5^n - 4n - 1)/4$

(5) أوجد أس أكبر قوة للعدد 3 تقسم $80!$

(6) أوجد أس أكبر قوة للعدد 7 تقسم $2400!$

(7) إذا كان n عدداً صحيحاً موجباً فأثبت أن : $\mu(n)\mu(n+1)\mu(n+2)\mu(n+3) = 0$

$$(8) \text{ إذا كان } n \geq 3 \text{ أثبت أن } \sum_{k=1}^n \mu(k!) = 1$$

(9) إذا كان $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$ حيث $p_1, p_2, \dots, p_r$ أوليات مختلفة وإذا كانت الدالة f دالة ضربية فأثبت أن :

$$1) \sum_{d|n} \mu(d) f(d) = (1 - f(p_1))(1 - f(p_2)) \dots (1 - f(p_r))$$

$$2) \sum_{d|n} \mu(d) \tau(d) = (-1)^r$$

$$3) \sum_{d|n} \mu(d) \sigma(d) = (-1)^r p_1 p_2 \dots p_r$$

$$4) \sum_{d|n} d \cdot \mu(d) = (1 - p_1)(1 - p_2) \dots (1 - p_r)$$

(10) إذا كان $\lambda(n)$ دالة ليوفيل و $n > 0$ فأثبت أن :

$$\sum_{d|n} \lambda(d) = \begin{cases} 1 & \text{إذا وجد عدد صحيح } m \text{ بحيث } n = m^2 \\ 0 & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases}$$

$$(11) \text{ إذا كان } (a, 30) = 1 \text{ أثبت أن } 240 | a^4 - 1$$

$$(12) \text{ إذا كان } n \geq 0 \text{ أثبت أن } 240 | f(n) \text{ حيث } f(n) = 6 \cdot 17^{4n} - 5 \cdot 13^{4n^2} - 1$$

$$(13) \text{ إذا كان } a \text{ عدداً فردياً و } (a, 3) = 1 \text{ أثبت أن } 192 | a^4 + 14a^2 - 96a + 81$$

$$(14) \text{ أثبت أن } \tau(n) \text{ يكون عدداً فردياً إذا وفقط إذا كان } n \text{ مربعاً كاملاً .}$$

$$(15) \text{ أثبت أن } \sigma(n) \text{ يكون عدداً فردياً إذا وفقط إذا كان } n = m^2 \text{ أو } n = 2m^2 \text{ من أجل عدد ما } m.$$

$$(16) \text{ أوجد صيغة } n \text{ حتى يكون } \tau(n) = 10 \text{ ، هل يوجد عدد } n \text{ يحقق العلاقة } \sigma(n) = 10 \text{ ؟}$$

$$(17) \text{ إذا كان } k \geq 0 \text{ أثبت ما يلي : } n = 2^{k-1} \Rightarrow \sigma(n) = 2n - 1$$

$$(18) \text{ احسب : (1) } \psi(3025) \text{ علماً أن } e_1 = 1, e_2 = 4, e_3 = 7$$

$$(2) \psi(50) \text{ علماً أن } e_1 = 0, e_2 = 3, e_3 = 4$$

$$(3) \psi(168) \text{ علماً أن } e_1 = 0, e_2 = 1, e_3 = 9$$

$$(19) \text{ أثبت أن قوة عدد أولي لا يمكن أن يكون عدداً كاملاً .}$$

$$(20) \text{ أثبت أن } n^2 \text{ لا يمكن أن يكون عدداً كاملاً .}$$

$$(21) \text{ جء أي عددين أوليين فرديين ليس عدداً كاملاً .}$$

$$(22) \text{ إذا كان } n \text{ عدداً كاملاً أثبت أن } \sum_{d|n} \frac{1}{2} = 2$$

$$(23) \text{ من أجل أي عدد كامل } n > 6 \text{ أثبت أن مجموع أرقام } n \text{ يطابق الواحد بالمقاس } 9$$

(24) أثبت أنه لا يمكن لأي قاسم لعدد كامل أن يكون كاملاً .

(25) استخدم مبرهنة اولر لإثبات ما يلي :

$$1) a^{37} \equiv a \pmod{1729}$$

$$2) a^{13} \equiv a \pmod{2730}$$

$$3) a^{33} \equiv a \pmod{4080} \quad \text{علماً أن } a \text{ عدد صحيح فردي}$$

(26) أثبت أنه إذا كان $(a, n) = (a - 1, n) = 1$ فإن :

$$1 + a + a^2 + \dots + a^{\varphi(n)-1} \equiv 0 \pmod{n}$$

(27) إذا كان $(m, n) = 1$ حيث n و m عدنان صحيحان موجبان

$$m^{\varphi(n)} + n^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{mn} \quad \text{فأثبت أن:}$$

(28) أثبت أن المجموعة $\{3, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6\}$ هي مجموعة بواقي مختزلة بالمقاس 14 .

(29) أثبت أن المجموعة $\{2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{16}\}$ هي مجموعة بواقي مختزلة بالمقاس 27 .

(30) إذا كان $n > 1$ لا يحوي عوامل أولية مكررة فأثبت أن $\tau(n^2) = n$ إذا

و فقط إذا كان $n = 3$.

(31) أثبت أن $3 | \sigma(3n + 2)$ و $4 | \sigma(4n + 3)$ من أجل أي عدد صحيح موجب n .

الفصل الرابع

المراتب والجزور الأولية والأدلة

1-4 المراتب والجزور الأولية والأدلة

1-2-4 تعريف المرتبة : إن مرتبة العدد a بالمقاس m (أو الأس الذي ينتمي إليه العدد الصحيح a بالمقاس m) حيث $(a, m) = 1$ هو أصغر عدد صحيح موجب e يحقق العلاقة $a^e \equiv 1 \pmod{m}$ ، ونقول إن e هو الدليل الذي ينتمي إليه العدد a بالمقاس m ونكتب $e \equiv \text{Ind}_a \pmod{m}$

مثال : نلاحظ أن :

- مرتبة العدد 2 بالمقاس 7 هي 3 لأن : $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$, $2^2 \equiv 4 \pmod{7}$, $2^1 \equiv 2 \pmod{7}$,
- مرتبة العدد 2 بالمقاس 6 هي 5 لأن : $2^5 \equiv 1 \pmod{6}$.
كذلك نقول إن 2 هو دليل العدد 5 بالمقاس 6 .

- مرتبة العدد 3 بالمقاس 14 هي 6 ذلك أن :

$$3^1 \equiv 3 \pmod{14}, 3^2 \equiv 9 \pmod{14}, 3^3 \equiv -1 \pmod{14}, \\ 3^4 \equiv 11 \pmod{14}, 3^5 \equiv 5 \pmod{14}, 3^6 \equiv 1 \pmod{14},$$

- **2-2-4 مبرهنة :** إذا كانت مرتبة العدد الصحيح a تساوي e بالمقاس m فإن

$$a^k \equiv 1 \pmod{m} \text{ إذا وفقط إذا كان } e|k$$

الإثبات : إذا كان $e|k$ فإن $k = ee_1$ وبالتالي

$$e^k = (e^e)^{e_1} \equiv (1)^{e_1} \equiv 1 \pmod{m} \text{ فإن}$$

وبالعكس إذا كان k عدداً صحيحاً موجباً يحقق العلاقة $a^k \equiv 1 \pmod{m}$

$$k = eq + r \quad 0 \leq r < e \text{ فحسب خوارزمية القسمة نكتب}$$

$$a^k \equiv (a^e)^q \cdot a^r \pmod{m}$$

ولما كان كل من a^e و a^k يطابق الواحد بالمقاس m فإن العلاقة الأخيرة تعطي $a^r \equiv 1 \pmod{m}$

ولكن حسب تعريف المرتبة فإن e هي أصغر عدد صحيح موجب يحقق التطابق السابق و $0 \leq r < e$

$$\text{إذاً } r=0, \quad k = eq, \quad \text{أي } e|k$$

- **نتيجة** : نعلم من مبرهنة أولر أن $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ مما يدل على أنه إذا كانت e مرتبة a بالمقاس m فإن e يجب أن تقسم $\varphi(m)$ وبالتالي يكفي أن تبحث عن مرتبة العدد a بالمقاس m بين قواسم $\varphi(m)$

فعلى سبيل المثال إذا أردنا البحث عن مرتبة العدد 2 بالمقاس 13 نحسب $\varphi(13) = 12$ ونبحث عن المرتبة بين قواسم العدد 12 أي بين الأعداد 1, 2, 3, 4, 6, 12 فنكتب

$$2^{12} \equiv 1 \pmod{13}, \quad 2^6 \equiv 12, \quad 2^4 \equiv 3, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 2^3 \equiv 8$$

أي أن مرتبة العدد 2 هي 12 بالمقاس 13

- **تمرين** : هل يوجد عدد a مرتبته بالمقاس $\varphi(12)$ بالمقاس 12 ؟ أي هل للمعادلة $a^4 \equiv 1 \pmod{12}$ حل؟

نعلم من التعريف أن العدد a إن وجد يجب أن يكون أولاً نسبياً مع 12 و يصغره لذا نبحث عن العدد a ضمن مجموعة البواقي المختزلة للعدد 12 أي ضمن المجموعة $\{1,5,7,11\}$ و هنا نرى أن :

$$1^2 = 5^2 = 7^2 = 11^2 \equiv 1 \pmod{12}$$

إذاً لا يوجد للمعادلة المعطاة حل.

3-2-4 مبرهنة : إذا كانت مرتبة a بالمقاس m هي e فإن $a^t \equiv a^s \pmod{m}$ إذا وفقط إذا كان $t \equiv s \pmod{e}$

الإثبات : لنفترض أولاً أن $a^t \equiv a^s \pmod{m}$ حيث $t \geq s$ و نعلم أن $(a, m) = 1$ لذا يمكن اختصار a^s من الطرفين لنجد : $a^{t-s} \equiv 1 \pmod{m}$ وحسب ماسبق فإن $e | t - s$ أي $t \equiv s \pmod{e}$ وبالعكس إذا كان $t \equiv s \pmod{e}$ لأمكننا أن نكتب : $t = s + qe$ ولدينا $a^e \equiv 1 \pmod{m}$ أي $a^t \equiv a^s \cdot (a^e)^q \equiv a^s \cdot 1^q \equiv a^s \pmod{m}$

- **نتيجة** : إذا كانت مرتبة a بالمقاس m هي e فإن الأعداد $a, a^2, \dots, a^e$ غير متطابقة بالمقاس m . **البرهان** : لو كان $a^t \equiv a^s \pmod{m}$ حيث $1 \leq s \leq t \leq e$

فإن المبرهنة السابقة تؤكد أن $t \equiv s \pmod{e}$ وهذا غير ممكن من أجل القوى المختلفة لـ a السابقة . **4-2-4 مبرهنة** : إذا كانت مرتبة العدد a تساوي e بالمقاس m وكان $k > 0$ فإن مرتبة a^k

بالمقاس m هي $\frac{e}{d}$ حيث $d = (k, e)$

الإثبات : لما كان $d = (k, e)$ فإن $k = k_0 d$, $e = e_0 d$ و $(k_0, e_0) = 1$

فإذا افترضنا أن r هي مرتبة a^k بالمقاس m لكان :

$$e|kr \Rightarrow e_0|k_0r(a^k)^r \equiv a^{kr} \equiv 1(\text{mod } m) \Rightarrow$$

ولما كان $(k_0, e_0) = 1$ ينتج أن $e_0|r$ (1)

ومن جهة أخرى نكتب : $e|kr \Rightarrow e_0|k_0r(a^e)^{k_0} \equiv a^{ek_0} \equiv a^{edk_0} \equiv (a^k)^{e_0} \equiv 1(\text{mod } m)$

ولما كانت r هي مرتبة a^k بالمقاس m فإن $r|e_0$ (2)

ومن العلاقتين (1) و(2) ينتج أن $r = e_0 = \frac{e}{d}$

- نتيجة : إذا كان $(k, e) = 1$ فإن مرتبة a^k تساوي مرتبة a بالمقاس m

تمرين : عين مراتب الأعداد من 1 إلى 12 بالمقاس 13

الحل : بالاعتماد على المبرهنات السابقة يمكن أن نرتب الجدول التالي :

العدد	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
المرتبة	1	12	3	6	4	12	12	4	3	6	12	2

يلاحظ من الجدول أن مرتبة العدد 2 بالمقاس 13 تساوي 12

$$\text{ومرتبة } 2^2 = 4 \text{ تساوي } \frac{12}{2} = 6$$

$$\text{ومرتبة } 2^3 = 8 \text{ تساوي } \frac{12}{3} = 4$$

$$\text{ومرتبة } 2^4 \equiv 3(\text{mod } 13) \text{ تساوي } \frac{12}{4} = 3$$

$$\bullet \text{ ومرتبة } 2^5 \equiv 6(\text{mod } 13) \text{ تساوي } 12 \text{ لأن } (5, 12) = 1$$

$$\text{ومرتبة } 2^6 \equiv 12(\text{mod } 13) \text{ تساوي } \frac{12}{6} = 2 \text{ لأن } (6, 12) = 6$$

$$\text{ومرتبة } 2^7 \equiv 11(\text{mod } 13) \text{ تساوي } 12 \text{ لأن } (7, 12) = 1$$

$$\text{ومرتبة } 2^8 \equiv 9(\text{mod } 13) \text{ تساوي } \frac{12}{4} = 3 \text{ ويمكن أن نكتب } 3^2 = 9, (2, 3) = 1 \text{ فمرتبة}$$

$$9 \text{ تساوي مرتبة } 3 \text{ بالمقاس } 13 \text{ أي } 3 =$$

$$\text{ومرتبة } 2^9 \equiv 5(\text{mod } 13) \text{ تساوي } \frac{12}{(9, 12)} = 4$$

$$\text{ومرتبة } 2^{10} \equiv 10(\text{mod } 13) \text{ تساوي } \frac{12}{(10, 12)} = 6$$

$$\text{ومرتبة } 2^{11} \equiv 7(\text{mod } 13) \text{ تساوي } \frac{12}{(11, 12)} = 12$$

4-2-5 مبرهنة : إذا كانت مرتبة العدد a تساوي e بالمقاس m ومرتبة العدد b تساوي f

بالمقاس m وكان $(e, f) = 1$ فإن مرتبة $a.b$ بالمقاس m تساوي $e.f$

الإثبات : لنفترض أن مرتبة $a . b$ بالمقاس m هي k أي أن

$$(a . b)^k \equiv 1 \pmod{m}$$

$$((ab)^k)^e \equiv (a^e)^k b^{ke} \equiv b^{ke} \equiv 1 \pmod{m}$$

ولما كانت مرتبة b هي f فإن $f|ke$ ولكن $(f, e) = 1$ الأمر الذي يعطي $f|k$

$$((ab)^k)^f \equiv a^{kf} . (b^f)^k \equiv a^{kf} \equiv 1 \pmod{m} \quad \text{وبمناقشة مماثلة يمكن أن نكتب :}$$

ولما كانت مرتبة a هي e بالمقاس m فإن $e|kf$ و $(f, e) = 1$ أي

$$(1) \quad e . f | k \quad \text{وبالتالي فإن}$$

$$(ab)^{e . f} \equiv (a^e)^f . (b^f)^e \equiv 1 \pmod{m} \quad \text{ومن جهة أخرى نجد أن}$$

ولما كانت مرتبة $a . b$ هي k فإن $k|e . f$ (2)

$$k = e . f \quad \text{من العلاقتين (1) و (2) نجد أن}$$

مثال : نلاحظ أن مرتبة العدد 2 بالمقاس 7 تساوي 3 ومرتبة العدد 6 بالمقاس 7 تساوي 2 و

$$(2, 3) = 1 \quad \text{، وبالتالي فإن مرتبة العدد الناتج عن ضربهما بالمقاس 7}$$

$$2 . 6 = 12 \equiv 5 \pmod{7} \quad \text{تساوي} \quad 3 . 2 = 6 \pmod{7} \quad \text{أي : } 5^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

والعدد 6 هو أصغر عدد يحقق هذا التطابق .

2-4 الجذور الأولية والأدلة ((Primitive roots , Indices))

1-2-4 تعريف الجذر الأولي : إذا كان $(a, m) = 1$ وكانت مرتبة a بالمقاس m تساوي $\varphi(m)$

فإن a يدعى الجذر الأولي للعدد m .

أي إذا كان العدد $\varphi(m)$ هو أصغر عدد صحيح موجب يحقق العلاقة $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ وكان

$$(a, m) = 1 \quad \text{فإن} \quad a \quad \text{هو جذر أولي للعدد} \quad m .$$

يمكن أن يكون لعدد ما عدة جذور أولية بالمقاس m وقد لا يوجد لعدد ما أي جذر أولي .

مثال : رأينا سابقاً أن مرتبة كل عدد من الأعداد $\{2, 6, 7, 11\}$ تساوي $\varphi(13) = 12$ فللعدد 13

$$a^{12} \equiv 1 \pmod{13} \quad \text{أربعة جذور أولية أو نقول أن للمعادلة}$$

كما رأينا أنه لا يوجد أي عدد مرتبته تساوي 4 بالمقاس 12 ونعلم أن $\varphi(12) = 4$ أي ليس للعدد 12

أي جذر أولي .

2-2-4 مبرهنة : إذا كان $(a, m) = 1$ وإذا كان a جذراً أولياً للعدد m فإن مجموعة

$$\{a, a^2, \dots, a^{\varphi(m)}\}$$

الأعداد هي بواقي مختزلة بالمقاس m .

الإثبات : بما أن a جذر أولي لـ m فإن $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ وحسب نتيجة المبرهنة 3-2-8 فإن الأعداد التالية التي عددها $\varphi(m)$: $a, a^2, \dots, a^{\varphi(m)}$ غير متطابقة بالمقاس m . ولدينا من جهة ثانية $(a, m) = 1$ مما يدل على أن قوى a هي أولية نسبياً أي أن المجموعة $T_m = \{a, a^2, \dots, a^{\varphi(m)}\}$ هي مجموعة بواقي مختزلة بالمقاس m .

3-2-4 مبرهنة : إذا وجد جذر أولي للعدد m وكان هذا الجذر هو a حيث $(a, m) = 1$ فإن العدد m يملك $\varphi(\varphi(m))$ جذراً أولياً .

الإثبات : لنفترض أن a هو جذر أولي للعدد m أي $(a, m) = 1$ ومرتبة $\varphi(m) = a$ بالمقاس m . إن أي جذر أولي لـ m يجب أن يكون أولياً نسبياً مع m فهو أحد عناصر مجموعة البواقي المختزلة بالمقاس m أي هو أحد عناصر المجموعة $T_m = \{a, a^2, \dots, a^{\varphi(m)}\}$. ونعلم أن مرتبة a^k بالمقاس m تساوي مرتبة a بالمقاس m إذا كان $(\varphi(m), k) = 1$ أي أن عدد العناصر التي مرتبتها هي $\varphi(m)$ من المجموعة $T(m)$ (أي عدد الجذور الأولية للعدد m) يساوي عدد العناصر الأولية نسبياً مع $\varphi(m)$ من بين عناصر $T(m)$ فهو يساوي $\varphi(\varphi(m))$.

- نتيجة : إذا كان p عدداً أولياً وإذا كان r جذراً أولياً لـ p أي إذا كانت مرتبة r هي $p - 1$ فإن عدد الجذور الأولية للعدد p يساوي $\phi(p - 1)$.

وعلى سبيل المثال إذا كان $p = 7$ فإن $\varphi(7) = 6$ و $\varphi(6) = 2$ فإنه يوجد للعدد 7 جذران أوليان هما 3, 5 , ذلك أن أصغر قوة للعدد 3 يحقق التطابق $3^e \equiv 1 \pmod{7}$ هو 6 أي أن العدد 3 هو الجذر أولي للعدد 7 و $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ كذلك نجد أن $3^e \equiv 1 \pmod{7}$ حيث $(e, 6) = 1$ يحقق $e = 5$ أي هو $3^5 \equiv 5 \pmod{7}$ ولدينا $3^5 \equiv 5 \pmod{7}$ ومنه $5^6 \equiv 1 \pmod{7}$ أي العدد 5 جذراً أولياً ثاني للعدد 7 . سنورد فيما يلي المبرهنة الهامة التالية دون سرد لإثباتها .

4-2-4 مبرهنة : يوجد للعدد m جذر أولي إذا وفقط إذا كان $m = 2$ أو $m = 4$ أو من الشكل $m = p^n$ أو $m = 2p^n$ حيث p عدد أولي فردي و n عدد صحيح موجب .

تمرين : أوجد الجذور الأولية للعدد 9 .

الحل : إن مجموعة البواقي المختزلة للعدد 9 هي : $T(9) = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$

والجذور الأولية إن وجدت تساوي قوى عناصر المجموعة $T(9)$.

ونلاحظ أن : $2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 \equiv 7 \pmod{9}, 2^5 \equiv 5 \pmod{9}, 2^6 \equiv 1 \pmod{9}$

أي أن العدد 2 هو جذر أولي للعدد 9 . ونعلم أن $\varphi(9) = \varphi(3^2) = 6$,

$\varphi(\varphi(9)) = \varphi(6) = 2$ أي أن عدد الجذور الأولية = 2

ولنبحث عن الجذر الأولي الثاني بين الأعداد 2^k بحيث يكون k أولياً نسبياً مع 6 . أي $k = 5$,
 $2^5 \equiv 5 \pmod{9}$ والعدد 5 هو الجذر الأولي الثاني . في الحقيقة فإن
 $5^2 \not\equiv 1 \pmod{9}$, $5^3 \equiv -1 \pmod{9} \Rightarrow 5^6 \equiv 1 \pmod{9}$

3-4 الأدلة (Indices):

1-3-4 تعريف الدليل : إذا كان r جذراً أولياً للعدد m وإذا كان b أولياً نسبياً مع m فإن أصغر عدد صحيح موجب k : $1 \leq k \leq \varphi(m)$ يحقق العلاقة $b \equiv r^k \pmod{m}$ يسمى دليل أولر للعدد b أو لغاريتيم أولر للعدد b أو اختصاراً دليل b بالأساس r والمقاس m ونكتب

$$k = \text{Ind}_r a \Leftrightarrow r^{\text{Ind}_r a} \equiv a \pmod{m}$$

مثال : بما أن $r = 2$ هو جذر أولي للعدد 5 و $\varphi(5) = 4$ و أن قوى العدد 2 فنجد :

$$2^1 \equiv 2 \pmod{5}, 2^2 \equiv 4 \pmod{5}, 2^3 \equiv 3 \pmod{5}, 2^4 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$\text{Ind}_2 2 = 1, \text{Ind}_2 4 = 2, \text{Ind}_2 3 = 3, \text{Ind}_2 1 = 4 \quad \text{لذا نقول إن}$$

ونلاحظ أن الدليل يلعب دور اللغارتيم وأن الجذر الأولي يلعب دور أساس اللغارتيم المعروفة لذا قد يقرأ في بعض الأحيان دليل عدد معطى لغاريتيم أولر لذلك العدد.

2-3-4 خواص الأدلة : إذا كان r جذراً أولياً للعدد m وإذا كان M, N عددين صحيحين وكان $(M.N, m) = 1$ فإن

$$\text{Ind}_r M = \text{Ind}_r N \pmod{\varphi(m)} \Leftrightarrow M \equiv N \pmod{m} \quad (1)$$

البرهان : من تعريف الأدلة نكتب

$$M = r^{\text{Ind}_r M} \pmod{m} \wedge N = r^{\text{Ind}_r N} \pmod{m}$$

$$M \equiv N \pmod{m} \Leftrightarrow r^{\text{Ind}_r M} \equiv r^{\text{Ind}_r N} \pmod{m}$$

وحسب المبرهنة 3-1-4 فإن :

$$r^{\text{Ind}_r M} \equiv r^{\text{Ind}_r N} \pmod{m} \Leftrightarrow \text{Ind}_r M \equiv \text{Ind}_r N \pmod{\varphi(m)}$$

$$\text{Ind}_r M.N \equiv (\text{Ind}_r M + \text{Ind}_r N) \pmod{\varphi(m)} \quad (2)$$

البرهان (غير مطلوب): لدينا

$$MN = r^{\text{Ind}_r MN}, \quad M = r^{\text{Ind}_r M}, \quad N = r^{\text{Ind}_r N} \Rightarrow M.N = r^{\text{Ind}_r M + \text{Ind}_r N}$$

$$r^{\text{Ind}_r MN} \equiv r^{\text{Ind}_r M + \text{Ind}_r N} \pmod{m} \Leftrightarrow \text{Ind}_r MN \equiv \text{Ind}_r M + \text{Ind}_r N \pmod{\varphi(m)}$$

$$\text{Ind}_r M^k \equiv k \text{Ind}_r M \pmod{\varphi(m)}, \quad k > 0 \quad (3)$$

$$M^k \equiv r^{\text{Ind}_r M^k} \pmod{m} \quad \text{البرهان (غير مطلوب):} \quad \text{لدينا}$$

ومن جهة أخرى $M^k \equiv (r_r^{IndM})^k \equiv r_r^{kIndM} (modm)$

ومنه فإن $Ind_r M^k \equiv k Ind_r M (mod\varphi(m))$

نتيجة لما سبق نلاحظ أن $Ind_r 1 \equiv 0 (mod\varphi(m))$

$Ind_r r \equiv 1 (mod\varphi(m))$

(4) إذا كان s, r جذرين أوليين مختلفين للعدد m فإن :

$Ind_r N \equiv (Ind_s N)(Ind_r S) (mod\varphi(m))$

البرهان (غير مطلوب): لدينا $N \equiv r_r^{IndN} = S_s^{IndN} (modm)$

ولكن $S \equiv r_r^{IndS} (modm)$

ومنه $N \equiv r_r^{IndN} \equiv r_r^{(IndS)IndN} (modm)$

الأمر الذي يكافئ :

$Ind_r N \equiv (Ind_s N)(Ind_r S) (mod\varphi(m))$

- نتيجة : إذا كان $N = r$ نجد :

$Ind_r r \equiv 1 \equiv (Ind_s r)(Ind_r S) \equiv 1 (mod\varphi(m))$

تمرين : لقد وجدنا أن العدد 2 هو جذر أولي للعدد $m = 13$ لذا فإن جدول

الأدلة بالنسبة للأساس 2 والمقاس 13 هو :

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ind_2	12	1	4	2	9	5	11	3	8	10	7	6

4-4 حل التطابقات غير الخطية باستخدام الأدلة :

تستخدم الأدلة في إيجاد حلول بعض التطابقات غير الخطية وسنبين ذلك في الأمثلة التالية :

تمرين (1) : لنوجد حلول التطابق : $7x^3 \equiv 3 (mod13)$

الحل : رأينا أن العدد 2 هو جذر أولي للعدد 13 ، لنأخذ الدليل لطرفي التطابق بالنسبة للأساس 2

فنجد حسب خواص الأدلة : حيث $\varphi(13) = 12$

$Ind_2 7 + 3 (Ind_2 x) \equiv Ind_2 3 (mod12)$

وباستخدام جدول الأدلة السابق للعدد 13 بالنسبة للأساس 2 نجد :

$$11 + 3(\text{Ind}_2 x) \equiv 4 \pmod{12}$$

وبفرض $\text{Ind}_2 x \equiv y$ نجد $3y \equiv 5 \pmod{12}$ ولما كان $(3,12) = 3 \nmid 5$ ،

فليس للتطابق الخطي الأخير حل مما يدل على أنه ليس للتطابق الأصلي حل .

تمرين (2) : لنوجد حلول التطابق : $7x^3 \equiv 4 \pmod{13}$

باستخدام الطريقة المستخدمة في التمرين (1) نجد أنه لحل التطابق يكفي إيجاد حلول التطابق

$$\text{الخطي : } 3y \equiv 3 \pmod{12}$$

لدينا هنا $(3,12) = 3 \mid 3$ ، أي يوجد للتطابق الخطي ثلاث حلول غير متطابقة بالمقاس 12 ،

ويمكن ببساطة التأكد أن حلول التطابق هي : $y = 1, 5, 9$

وبالعودة إلى الجدول السابق والبحث عن x التي تقابل قيم $y = \text{Ind}_2 x$

نجد أن حلول التطابق هي : $x \equiv 5 \pmod{13}, x \equiv 6 \pmod{13}, x \equiv 2 \pmod{13}$

تمارين

- 1- أوجد مراتب الأعداد 5 ، 3 ، 2 بالمقاسات التالية
 - أ - بالمقاس 17 ب - بالمقاس 19 ج - بالمقاس 23
- 2- أثبت أن مرتبة العدد 2 تساوي 3 بالمقاس 7 و أثبت أن مرتبة العدد 6 تساوي 2 بالمقاس 7 ثم أوجد مرتبة العدد 5 بالمقاس 7
- 3- أوجد مرتبة كل من العددين 19 ، 11 بالمقاس 36 .
- 4- أثبت أن 2 هو جذر أولي للعدد 19 وأنه ليس جذراً أولياً للعدد 17
- 5- أثبت أنه لا يوجد للعدد 15 أي جذر أولي .
- 6- أوجد جذرين أوليين للعدد 10 .
- 7- أوجد جميع الجذور الأولية للعدد 17 علماً أن 3 هو جذر أولي له .
- 8- أوجد حلول التطابقات

$$3x^6 \equiv 4 \pmod{11}, \quad x^8 \equiv 10 \pmod{11}, \quad 3x^3 \equiv 3 \pmod{11}$$
- 9- اكتب جدول الأدلة للعدد 17 بالنسبة للجذراًلأولي 3 ثم أوجد حلول التطابقات :

$$x^{12} \equiv 13 \pmod{17}, \quad 9x^8 \equiv 8 \pmod{17}, \quad 7^x \equiv 7 \pmod{17}$$